



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → [パパベリン](#)

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

## パパベリン

(pa pav'er een) と発音します

### なぜこの薬が処方されているのですか？

パパベリンは、循環器系の問題を抱える患者の血流を改善するために使用されます。血管を弛緩させることで機能し、血液が心臓や体をより簡単に流れるようにします。

この薬は他の用途に処方されることもあります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

### わあ、この薬を使うべきですか？

パパベリンは、経口摂取するための錠剤および徐放性（長時間作用型）カプセルとして提供されます。タブレットは通常、等間隔で1日3～5回服用します。徐放性カプセルは通常8～12時間ごとに服用します。徐放性カプセルを押しつぶしたり、噛んだり、分割したりしないでください。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにパパベリンを服用してください。

パパベリンは習慣を形成している可能性があります。医師の指示よりも多く服用したり、頻繁に服用したり、長期間服用したりしないでください。

パパベリンは高血圧を制御しますが、それを治しません。気分が良くてもパパベリンを服用し続けてください。医師に相談せずにパパベリンの服用をやめないでください。

### この薬の用途

パパベリンは、男性のインポテンスの治療にも使用されます。あなたの状態のためにこの薬を使用することの可能なリスクについてあなたの医者に相談してください。

### 特別な注意事項に従う必要がありますか？

パパベリンを服用する前に、

- パパベリンや他の薬にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。
- 医師と薬剤師に、服用している処方薬と非処方薬、特にレボドパ（ラロドパ、シネメット）とビタミンを伝えてください。

- 心臓病、房室ブロック（心調律障害）、または緑内障を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。パパベリンを服用中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、パパベリンを服用していることを医師または歯科医に伝えてください。
- この薬は眠気やめまいを引き起こす可能性があることを知っておく必要があります。自分への影響がわかるまでは、車を運転したり、機械を操作したりしないでください。
- パパベリンを服用している間、アルコールの安全な使用について医師に尋ねてください。アルコールはパパベリンの副作用を悪化させる可能性があります。

### 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えたらすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になっている場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

### この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

パパベリンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 潮紅（暖かさ）
- 発汗
- 頭痛
- 疲れ
- めまい
- 皮膚の発疹
- 胃のむかつき
- 食欲減少
- 下痢
- 便秘
- 胃痛

**次のいずれかの症状が出た場合は、すぐに医師に連絡してください。**

- 皮膚や目の黄変
- 不整脈

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

（（<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]）または電話（1-800-332-1088）。

## この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はあなたの肝機能を監視するために特定の検査を命じるかもしれません。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- パバコット®

最終改訂日-2017年9月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists、 Inc.免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。 ©Copyright、 2022. American Society of Health-System Pharmacists®、 4500 East-West Highway、 Suite 900、 ベセスダ、 メリーランド。 全著作権所有。 複製  
商用利用はASHPの承認が必要です。

---

国立医学図書館8600RockvillePike、 Bethesda、 MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日