



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[집](#) → [약물, 허브 및 보조제](#) → 파파베린

Source : U.S. National Library of Medicine

이 페이지의 URL: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

파파베린

(pa pav' er een)로 발음

이 약이 처방된 이유는 무엇입니까?

Papaverine은 순환 문제가 있는 환자의 혈류를 개선하는 데 사용됩니다. 그것은 혈액이 심장과 몸을 통해 더 쉽게 흐를 수 있도록 혈관을 이완시켜 작동합니다.

이 약은 때때로 다른 용도로 처방됩니다. 자세한 내용은 의사나 약사에게 문의하십시오.

이 약을 사용해야 합니까?

Papaverine은 입으로 복용하는 정제 및 연장 방출(지속형) 캡슐로 제공됩니다. 정제는 일반적으로 균등한 간격으로 하루에 3-5회 복용합니다. 서방형 캡슐은 일반적으로 8-12시간마다 복용합니다. 서방형 캡슐을 부수거나 씹거나 나누지 마십시오. 처방전 라벨의 지시 사항을 주의 깊게 따르고 의사나 약사에게 이해되지 않는 부분에 대한 설명을 요청하십시오. 지시대로 정확히 파파베린을 복용하십시오.

파파베린은 습관성일 수 있습니다. 의사가 지시한 것보다 더 많은 양을 복용하거나 더 자주 또는 더 오랜 기간 동안 복용하지 마십시오.

Papaverine은 고혈압을 조절하지만 치료하지는 않습니다. 기분이 좋아도 계속 파파베린을 복용하십시오. 의사와 상의하지 않고 파파베린 복용을 중단하지 마십시오.

이 약의 용도

Papaverine은 또한 남성의 발기 부전을 치료하는 데 사용됩니다. 귀하의 상태에 대해 이 약을 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 의사와 상담하십시오.

모자 특별 예방 조치를 따라야 합니까?

파파베린을 복용하기 전에,

- 파파베린 또는 다른 약물에 알레르기가 있는 경우 의사와 약사에게 알려십시오.
- 귀하가 복용하고 있는 처방약 및 비처방약, 특히 레보도파(라로도파, 시네메트) 및 비타민에 대해 의사와 약사에게 알려십시오.

- 심장 질환, AV 차단(심장 박동 장애) 또는 녹내장이 있거나 있었던 적이 있는지 의사에게 알려주세요.
- 임신 중이거나 임신 계획이 있거나 수유 중인 경우 의사에게 알려주세요. 파파베린을 복용하는 동안 임신하면 의사에게 연락하십시오.
- 치과 수술을 포함하여 수술을 받는 경우 의사나 치과 의사에게 파파베린을 복용하고 있다고 알려주세요.
- 이 약이 당신을 졸리거나 어지럽게 할 수 있다는 것을 알아야 합니다. 그것이 당신에게 어떤 영향을 미치는지 알기 전에는 자동차를 운전하거나 기계를 조작하지 마십시오.
- 파파베린을 복용하는 동안 알코올의 안전한 사용에 대해 의사에게 문의하십시오. 알코올은 파파베린의 부작용을 악화시킬 수 있습니다.

복용량을 잊은 경우 모자를 써야 하나요?

놓친 복용량을 기억하는 즉시 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 거의 다 되었다면 놓친 복용량을 건너뛰고 정기적인 복용 일정을 계속하십시오. 놓친 것을 보충하기 위해 두 번 복용하지 마십시오.

모자 부작용이 약물이 일으킬 수 있습니까?

파파베린은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 다음 증상 중 하나라도 심각하거나 사라지지 않으면 의사에게 알려주세요.

- 홍조(따뜻한 느낌)
- 발한
- 두통
- 피로
- 현기증
- 피부 발진
- 배탈
- 식욕 상실
- 설사
- 변비
- 복통

다음 증상 중 하나가 발생하면 즉시 의사에게 연락하십시오.

- 피부 또는 눈의 황변
- 불규칙한 심장박동

심각한 부작용이 발생하는 경우 귀하 또는 담당 의사가 온라인으로 FDA(Food and Drug Administration)의 MedWatch 유해 사례 보고 프로그램에 보고서를 보낼 수 있습니다.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 또는 전화 (1-800-332-1088).

이 약의 보관 및 폐기에 대해 알아야 합니까?

이 약은 들어 있던 용기에 단단히 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실온에서 보관하고 과도한 열과 습기를 피하십시오(화장실이 아님).

많은 용기(주간 알약 보관함 및 안약, 크림, 패치, 흡입기용 용기 등)는 어린이에게 내성이 없고 어린이가 쉽게 열 수 있으므로 모든 약을 어린이의 눈에 띄고 손이 닿지 않는 곳에 두는 것이 중요합니다. 어린 아이들을 중독으로부터 보호하려면 항상 안전 캡을 잠그고 즉시 약물을 안전한 장소에 보관하십시오.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

불필요한 약은 애완동물, 어린이 및 다른 사람이 섭취할 수 없도록 특별한 방법으로 폐기해야 합니다. 그러나 이 약을 번기에 버리면 안 됩니다. 대신, 약물을 폐기하는 가장 좋은 방법은 약물 회수 프로그램을 이용하는 것입니다. 약사와 상담하거나 지역 쓰레기/재활용 부서에 연락하여 지역 사회의 수거 프로그램에 대해 알아보십시오. FDA의 의약품 안전 폐기 웹사이트(<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 회수 프로그램에 대한 액세스 권한이 없는 경우 자세한 내용을 참조하십시오.

n 응급/과다복용의 경우

과다 복용의 경우 독극물 관리 헬프라인 1-800-222-1222로 전화하십시오. 정보는 온라인으로도 제공됩니다.<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 피해자가 쓰러졌거나, 발작을 일으켰거나, 호흡 곤란을 겪거나, 깨어나지 못하면 즉시 911로 응급 서비스에 전화하십시오.

모자 다른 정보를 알아야합니까?

의사 및 검사실과의 모든 약속을 지키십시오. 의사는 간 기능을 모니터링하기 위해 특정 검사를 지시할 수 있습니다.

다른 사람이 귀하의 약을 복용하게 하지 마십시오. 처방전을 다시 조제하는 것과 관련하여 궁금한 사항은 약사에게 문의하십시오.

귀하가 복용하고 있는 모든 처방약 및 비처방약(일반의약품)은 물론 비타민, 미네랄 또는 기타 식이 보조제와 같은 제품의 목록을 작성하는 것이 중요합니다. 의사를 방문하거나 병원에 입원할 때마다 이 목록을 지참해야 합니다. 비상시에 휴대하는 것도 중요한 정보입니다.

랜드 이름

- 파바콧®

최종 수정 - 2017년 9월 15일

[이 페이지를 인용하는 방법 알아보기](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 면책 조항](#)

AHFS®환자 투약 정보™. © 저작권, 2022. 미국 건강 시스템 약사 협회®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. 판권 소유. 복사

상업적 사용을 위해서는 ASHP의 승인을 받아야 합니다.

국립 의학 도서관 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 미국 보건 복지부

국립 보건원

페이지 마지막 업데이트: 2022년 3월 25일