



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Papaverina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

## Papaverina

pronunciado como (pa pav' er een)

### por que este medicamento é prescrito?

A papaverina é usada para melhorar o fluxo sanguíneo em pacientes com problemas de circulação. Funciona relaxando os vasos sanguíneos para que o sangue possa fluir mais facilmente para o coração e pelo corpo.

Este medicamento às vezes é prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

### como este medicamento deve ser usado?

A papaverina vem como um comprimido e uma cápsula de liberação prolongada (ação prolongada) para tomar por via oral. O comprimido geralmente é tomado três a cinco vezes ao dia em intervalos uniformemente espaçados. A cápsula de liberação prolongada geralmente é tomada a cada 8-12 horas. Não esmague, mastigue ou divida as cápsulas de liberação prolongada. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome papaverina exatamente como indicado.

A papaverina pode ser viciante. Não tome doses maiores, tome com mais frequência ou por um período mais longo do que o seu médico lhe diz.

A papaverina controla a pressão alta, mas não a cura. Continue a tomar papaverina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar papaverina sem falar com o seu médico.

### outros usos para este medicamento

A papaverina também é usada para tratar a impotência nos homens. Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

## Que precauções especiais devo seguir?

### Antes de tomar papaverina,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à papaverina ou a qualquer outro medicamento.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos você está tomando, especialmente levodopa (Larodopa, Sinemet) e vitaminas.

- informe o seu médico se tem ou já teve doença cardíaca, bloqueio AV (distúrbio do ritmo cardíaco) ou glaucoma.
- informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar papaverina, contacte o seu médico.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar papaverina.
- você deve saber que este medicamento pode deixá-lo sonolento ou tonto. Não dirija um carro ou opere máquinas até saber como isso o afeta.
- pergunte ao seu médico sobre o uso seguro de álcool enquanto estiver tomando papaverina. O álcool pode piorar os efeitos colaterais da papaverina.

### **o que devo fazer se me esquecer de uma dose?**

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

### **Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?**

**A papaverina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:**

- rubor (sensação de calor)
- sudorese
- dor de cabeça
- cansaço
- tontura
- erupção cutânea
- dor de estômago
- perda de apetite
- diarreia
- constipação
- dor de estômago

**Se sentir algum dos seguintes sintomas, contacte o seu médico imediatamente:**

- amarelecimento da pele ou dos olhos
- arritmia cardíaca

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

## o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazenar em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

## n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

## Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode pedir alguns testes para monitorar sua função hepática.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

### nomes de rands

- Pavacot®

Última revisão - 15/09/2017

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

---

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022