



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Papaverină

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

## Papaverină

pronunțat ca (pa pav' er een)

### de ce este prescris acest medicament?

Papaverina este utilizată pentru a îmbunătăți fluxul sanguin la pacienții cu probleme de circulație. Funcționează prin relaxarea vaselor de sânge, astfel încât sângele să poată curge mai ușor către inimă și prin corp.

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

### cum trebuie utilizat acest medicament?

Papaverina vine sub formă de tablete și capsulă cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) de administrat pe cale orală. Comprimatul se ia de obicei de trei până la cinci ori pe zi la intervale egale. Capsula cu eliberare prelungită se ia de obicei la fiecare 8-12 ore. Nu zdrobiți, mestecați sau împărțiți capsulele cu eliberare prelungită. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați papaverină exact așa cum este indicat.

Papaverina poate crea obiceiuri. Nu luați doze mai mari, luați-o mai des sau pentru o perioadă mai lungă decât vă spune medicul dumneavoastră.

Papaverina controlează hipertensiunea arterială, dar nu o vindecă. Continuați să luați papaverină chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați papaverină fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

### există utilizări pentru acest medicament

Papaverina este, de asemenea, utilizată pentru a trata impotența la bărbați. Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

### ce precauții speciale ar trebui să urmez?

#### Înainte de a lua papaverină,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la papaverină sau la orice alte medicamente.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală luați, în special levodopa (Larodopa, Sinemet) și vitamine.

- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o boală de inimă, un bloc AV (o tulburare a ritmului cardiac) sau glaucom.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați papaverină, sunați la medicul dumneavoastră.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați papaverină.
- trebuie să știți că acest medicament vă poate provoca somnolență sau amețeală. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează.
- întrebați medicul despre utilizarea în siguranță a alcoolului în timp ce luați papaverină. Alcoolul poate agrava efectele secundare ale papaverinei.

## ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

## ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

**Papaverina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:**

- înroșire (senzație de căldură)
- transpirație
- durere de cap
- oboseală
- amețeală
- erupții cutanate
- stomac deranjat
- pierderea poftei de mâncare
- diaree
- constipație
- dureri de stomac

**Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicul dumneavoastră:**

- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- bătăi neregulate ale inimii

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

## ce ar trebui să știi despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura camerei și ferit de surplusul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vedere și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vedere și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

## n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

## ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie anumite teste pentru a vă monitoriza funcția hepatică.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

## nume rand

- Pavacot®

Ultima revizuire - 15.09.2017

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

---

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022