



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Папаверин

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>.

Папаверин

произносится как (pa pav'er een)

зачем назначают это лекарство?

Папаверин используется для улучшения кровотока у пациентов с проблемами кровообращения. Он работает, расслабляя кровеносные сосуды, чтобы кровь могла легче течь к сердцу и через тело.

Это лекарство иногда назначают для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Как следует использовать это лекарство?

Папаверин выпускается в виде таблеток и капсул пролонгированного действия (длительного действия) для приема внутрь. Таблетку обычно принимают от трех до пяти раз в день через равные промежутки времени. Капсулы пролонгированного действия обычно принимают каждые 8-12 часов. Не раздавливайте, не жуйте и не делите капсулы с пролонгированным высвобождением. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте папаверин точно по назначению.

Папаверин может вызывать привыкание. Не принимайте большие дозы, принимайте их чаще или в течение более длительного периода времени, чем вам рекомендует врач.

Папаверин контролирует высокое кровяное давление, но не лечит его. Продолжайте принимать папаверин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием папаверина, не посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Папаверин также используется для лечения импотенции у мужчин. Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования этого препарата для вашего состояния.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать папаверин,

- сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на папаверин или какие-либо другие препараты.
- Расскажите своему врачу и фармацевту, какие лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, вы принимаете, особенно леводопа (лародоба, синемет) и витамины.

- сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были болезни сердца, AV-блокада (нарушение сердечного ритма) или глаукома.
- Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при приеме папаверина, позвоните своему врачу.
- Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете папаверин.
- Вы должны знать, что этот препарат может вызвать сонливость или головокружение. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это влияет на вас.
- спросите своего врача о безопасном употреблении алкоголя, пока вы принимаете папаверин. Алкоголь может усугубить побочные эффекты папаверина.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Папаверин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

- покраснение (чувство тепла)
- потливость
- Головная боль
- усталость
- головокружение
- кожная сыпь
- расстройство желудка
- потеря аппетита
- диарея
- запор
- боль в животе

Если вы испытываете любой из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

- пожелтение кожи или глаз
- аритмия

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

п экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные тесты для контроля функции печени.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

- Павакот®

Последняя редакция — 15.09.2017

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности](#)

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.