



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → Papaverina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

## Papaverina

pronunciado como (pa pav' er een)

### ¿Por qué se prescribe este medicamento?

La papaverina se usa para mejorar el flujo sanguíneo en pacientes con problemas de circulación. Actúa relajando los vasos sanguíneos para que la sangre pueda fluir más fácilmente al corazón ya través del cuerpo.

Este medicamento a veces se prescribe para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

### ¿Cómo se debe usar este medicamento?

La papaverina viene en forma de tabletas y cápsulas de liberación prolongada (acción prolongada) para tomar por vía oral. La tableta por lo general se toma de tres a cinco veces al día a intervalos igualmente espaciados. La cápsula de liberación prolongada por lo general se toma cada 8 a 12 horas. No triture, mastique ni divida las cápsulas de liberación prolongada. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la papaverina exactamente como se indica.

La papaverina puede crear hábito. No tome dosis más altas, ni las tome con más frecuencia ni durante un período más prolongado de lo que le indicó su médico.

La papaverina controla la presión arterial alta pero no la cura. Continúe tomando papaverina incluso si se siente bien. No deje de tomar papaverina sin hablar con su médico.

### Otros usos de este medicamento

La papaverina también se usa para tratar la impotencia en los hombres. Hable con su médico acerca de los posibles riesgos de usar este medicamento para su condición.

### ¿Qué precauciones especiales debo seguir?

#### Antes de tomar papaverina,

- Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la papaverina o a cualquier otro medicamento.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta está tomando, especialmente levodopa (Larodopa, Sinemet) y vitaminas.

- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad cardíaca, un bloqueo AV (un trastorno del ritmo cardíaco) o glaucoma.
- informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma papaverina, llame a su médico.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando papaverina.
- Debe saber que este medicamento puede provocar somnolencia o mareos. No conduzca un automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta.
- pregúntele a su médico sobre el consumo seguro de alcohol mientras toma papaverina. El alcohol puede empeorar los efectos secundarios de la papaverina.

## ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

## ¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

**La papaverina puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:**

- enrojecimiento (sensación de calor)
- transpiración
- dolor de cabeza
- cansancio
- mareo
- erupción cutánea
- malestar estomacal
- pérdida de apetito
- Diarrea
- constipación
- dolor de estómago

**Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato:**

- coloración amarillenta de la piel o los ojos
- arritmia

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

## ¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

## En caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

## ¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico puede ordenar ciertas pruebas para monitorear su función hepática.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

### nombres aleatorios

- Pavacot®

Última revisión - 15/09/2017

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA® Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

---

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022