

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Papaverin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

Papaverine

uttalas som (pa pav' er een)

hur är denna medicin utskriven?

Papaverine används för att förbättra blodflödet hos patienter med cirkulationsproblem. Det fungerar genom att slappna av blodkärlen så att blodet lättare kan flöda till hjärtat och genom kroppen.

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

hur ska detta läkemedel användas?

Papaverine kommer som en tablett och förlängd frisättning (långverkande) kapsel att ta genom munnen. Tabletten tas vanligtvis tre till fem gånger om dagen med jämnt fördelade intervall. Kapseln med förlängd frisättning tas vanligtvis var 8-12:e timme. Krossa, tugga eller dela inte kapslarna med förlängd frisättning. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta papaverin exakt enligt anvisningarna.

Papaverin kan vara vanebildande. Ta inte större doser, ta det oftare eller under en längre period än vad din läkare säger till dig.

Papaverine kontrollerar högt blodtryck men botar det inte. Fortsätt att ta papaverin även om du mår bra. Sluta inte ta papaverin utan att prata med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Papaverine används också för att behandla impotens hos män. Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda detta läkemedel för ditt tillstånd.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar papaverin,

- berätta för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot papaverin eller andra läkemedel.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel du tar, särskilt levodopa (Larodopa, Sinemet) och vitaminer.

- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärtsjukdom, ett AV-block (en hjärtrytmstörning) eller glaukom.
- berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar papaverin, kontakta din läkare.
- om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar papaverin.
- du bör veta att detta läkemedel kan göra dig dåsig eller yr. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur det påverkar dig.
- fråga din läkare om säker användning av alkohol när du tar papaverin. Alkohol kan göra biverkningarna av papaverin värre.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Papaverin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- rodnad (känsla av värme)
- svettas
- huvudvärk
- trötthet
- yrsel
- hudutslag
- orolig mage
- aptitlöshet
- diarre
- förstoppning
- magont

Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart:

- gulfärgning av huden eller ögonen
- oregelbunden hjärtrytm

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

Hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa vissa tester för att övervaka din leverfunktion.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Pavacot®

Senast reviderad - 2017-09-15

Lär dig hur du citerar den här sidan



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS® Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022