

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

بابافيرين تنطقك (pa pav 'er een)

لماذا يوصف هذا الدواء؟

يستخدم بابافيرين لتحسين تدفق الدم في المرضى الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية. وهو يعمل عن طريق استرخاء الأوعية الدموية حتى يتدفق الدم بسهولة أكبر إلى القلب وعبر الجسم.

يوصف هذا الدواء أحياناً لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Papaverine كجهاز لوجي وكبسولة ممتدة المفعول (طويلة المفعول) لأخذها عن طريق الفم. عادة ما يتم أخذ الجهاز اللوجي من ثلاث إلى خمس مرات في اليوم على فترات متباعدة بشكل متساوٍ عادة ما يتم تناول الكبسولة الممتدة المفعول كل 8-12 ساعة. لا تسحق أو تمضغ أو تقسم الكبسولات الممتدة المفعول. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ بابافيرين بالضبط حسب التوجيهات.

قديمون بابافيرين يتشكل عادة. لا تأخذ جرعات أكبر ، أو تأخذها أكثر من مرة ، أو لفترة أطول مما يخبرك طبيبك بذلك.

يتحكم Papaverine في ارتفاع ضغط الدم ولكنه لا يعالجها. استمر في تناول بابافيرين حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن تناول بابافيرين دون التحدث مع طبيبك.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يستخدم بابافيرين أيضاً لعلاج الضعف الجنسي لدى الرجال. تحدث إلى طبيبك حول المخاطر المحتملة لاستخدام هذا الدواء لحالتك.

قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل تناول بابافيرين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من بابافيرين أو أي أدوية أخرى.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة التي تتناولها ، وخاصة الليفودوبا (Sinemet ، Larodopa) والفيتامينات.

- أخبر طبيبك إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من مرض في القلب ، أو كتلة AV (اضطراب ضربات القلب) ، أو الجلوكوما.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول بابافيرين ، فاتصل بطبيبك.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول بابافيرين.
- يجب أن تعلم أن هذا الدواء قد يجعلك نعسان أو بالدوار. لا تقود السيارة أو تشغيل الآلات حتى تعرف كيف تؤثر عليك.
- اسأل طبيبك عن الاستخدام الآمن للكحول أثناء تناول بابافيرين. يمكن للكحول أن يجعل الآثار الجانبية للبابافيرين أسوأ.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة وتابع جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

بابافيرين قد يسبب آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- احمرار (الشعور بالدفء)
- التعرق
- صداع الراس
- تعب
- دوخة
- الطفح الجلدي
- معدة مضطربة
- فقدان الشهية
- إسهال
- إمساك
- آلام في المعدة

إذا واجهت أيّاً من الأعراض التالية ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- اصفرار الجلد أو العينين
- عدم انتظام ضربات القلب

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

قبعة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. يخزن في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. <http://www.upandaway.org>]<http://www.upandaway.org>

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراحيض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (<http://goo.gl/c4Rm4p>) لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على <https://www.poisonhelp.org/help>]<https://www.poisonhelp.org/help>. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قبعة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. قد يطلب طبيبك بعض الاختبارات لمراقبة وظائف الكبد.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب أن تحضر هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- بافاكوت®

آخر مراجعة - 2017/09/15

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



إخلاءالمسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS®معلومات الدواء المريض ™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي®كل الحقوق محفوظة.
الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland.
للاستخدامالتجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبةالوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهدالوطنية للصحة

آخرتحديث للصفحة: 25 مارس 2022