



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → ปาปาเวอริน

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

ปาปาเวอริน

ออกเสียงว่า (pa pav 'er een)

hy เป็นยานี้กำหนด?

Papaverine ใช้เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดในผู้ป่วยที่มีปัญหาการไหลเวียนโลหิต ทำงานโดยการผ่อนคลายหลอดเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียนไปยังหัวใจและร่างกายได้ง่ายขึ้น

ยานี้บางครั้งมีกำหนดสำหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Papaverine มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแคปซูลที่ออกฤทธิ์นาน (ออกฤทธิ์นาน) เพื่อใช้ทางปาก โดยปกติแท็บเล็ตจะใช้เวลาสามถึงห้าครั้งต่อวันในช่วงเวลาที่เท่ากัน แคปซูลแบบขยายออกมักใช้ทุกๆ 8-12 ชั่วโมง อย่างบด เคี้ยว หรือแบ่งแคปซูลที่คลายออก ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ปาปาเวอรินตามที่กำหนด

Papaverine อาจสร้างนิสัย อย่ากินยาในปริมาณมาก ให้กินบ่อยขึ้น หรือเป็นเวลานานกว่าที่แพทย์สั่ง

Papaverine ควบคุมความดันโลหิตสูงแต่ไม่สามารถรักษาได้ ทานปาปาเวอรินต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานปาปาเวอรินโดยไม่ได้รับการปรึกษาแพทย์

ใช้สำหรับยานี้

Papaverine ยังใช้ในการรักษาความอ่อนแอในผู้ชาย พุดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สำหรับสภาพของคุณ

หมวด ข้อควรระวังพิเศษ ฉันทควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานปาปาเวอริน

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ปาปาเวอรินหรือยาอื่นๆ
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ โดยเฉพาะเลโวโดปา (ลาโรโดปา, โซเนเมต) และวิตามิน

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ ภาวะหลอดเลือดอุดตัน (AV block) (ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ) หรือต่อหีน
- แจ้งแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานปาปาเวอร์ริน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ
- หากคุณกำลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทำให้ฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังใช้ยาปาปาเวอร์ริน
- คุณควรรู้ว่ายานี้อาจทำให้คุณง่วงหรือเวียนหัว อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ามันส่งผลต่อคุณอย่างไร
- ถ้ามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานปาปาเวอร์ริน แอลกอฮอล์สามารถทำให้ผลข้างเคียงจากปาปาเวอร์รินแย่ลงได้

ฉันทควรทำอย่างไรถ้าฉันทงึมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับกัณฑ์ที่คุณจำได้ อย่งไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมือต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

ปาปาเวอร์รินอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ฟลัซ (ความรู้สึกของความอบอุ่น)
- เหนือออก
- ปวดหัว
- เหน็ดเหนียวเมื่อยล้า
- อาการเวียนศีรษะ
- ผื่นที่ผิวหนัง
- ท้องเสีย
- เบื่ออาหาร
- ท้องเสีย
- ท้องผูก
- อาการปวดท้อง

หากคุณพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

- สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันทครุรู้เกียวกัการจั้เก็บและการกำจั้ดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นส่วนเกิน (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตาครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล๊อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ควรกำจั้ดยานี้ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจั้ดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ก กรณีนี้อุจเงิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ใช้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันทครุรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อติดตามการทำงานของตับ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- ปาวาคอต®

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2017

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้า](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบธesda, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022