



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Nhà](#) → [Thuốc, thảo mộc và chất bổ sung](#) → Papaverine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL của trang này: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

## Papaverine

phát âm là (pa pav 'er een)

### hy có thuốc này được kê đơn không?

Papaverine được sử dụng để cải thiện lưu lượng máu ở những bệnh nhân có vấn đề về tuần hoàn. Nó hoạt động bằng cách thư giãn các mạch máu để máu có thể lưu thông dễ dàng hơn đến tim và cơ thể.

Thuốc này đôi khi được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

### có nên sử dụng thuốc này không?

Papaverine có dạng viên nén và viên nang giải phóng kéo dài (tác dụng kéo dài) để uống. Máy tính bảng thường được dùng ba đến năm lần một ngày với các khoảng cách đều nhau. Viên nang giải phóng kéo dài thường được thực hiện sau mỗi 8-12 giờ. Không nghiền nát, nhai hoặc chia viên nang phóng thích kéo dài. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn một cách cẩn thận và yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ giải thích bất kỳ phần nào bạn không hiểu. Hãy dùng papaverine chính xác theo chỉ dẫn.

Papaverine có thể hình thành thói quen. Không dùng liều lượng lớn hơn, dùng thường xuyên hơn hoặc trong thời gian dài hơn bác sĩ yêu cầu.

Papaverine kiểm soát huyết áp cao nhưng không chữa khỏi nó. Tiếp tục dùng papaverine ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe. Đừng ngừng dùng papaverine mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn.

### nhật sử dụng cho thuốc này

Papaverine cũng được sử dụng để điều trị chứng bất lực ở nam giới. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro có thể có khi sử dụng thuốc này đối với tình trạng của bạn.

### tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

#### Trước khi dùng papaverine,

- cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với papaverine hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.
- cho bác sĩ và dược sĩ biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn bạn đang dùng, đặc biệt là levodopa (Larodopa, Sinemet) và vitamin.

- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng mắc bệnh tim, tắc nghẽn AV (rối loạn nhịp tim) hoặc bệnh tăng nhãn áp.
- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai trong khi dùng papaverine, hãy gọi cho bác sĩ.
- Nếu bạn đang phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật nha khoa, hãy nói với bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn đang dùng papaverine.
- bạn nên biết rằng thuốc này có thể làm cho bạn buồn ngủ hoặc chóng mặt. Đừng lái xe hơi hoặc vận hành máy móc cho đến khi bạn biết nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào.
- hỏi bác sĩ của bạn về việc sử dụng an toàn rượu khi bạn đang dùng papaverine. Rượu có thể làm cho các tác dụng phụ từ papaverine tồi tệ hơn.

### **Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?**

Dùng liều đã quên ngay khi bạn nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và tiếp tục lịch dùng thuốc thông thường của bạn. Đừng dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

### **hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?**

**Papaverine có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:**

- đỏ bừng (cảm giác ấm áp)
- đổ mồ hôi
- đau đầu
- mệt mỏi
- chóng mặt
- phát ban da
- đau bụng
- ăn mất ngon
- bệnh tiêu chảy
- táo bón
- đau bụng

**Nếu bạn gặp một trong các triệu chứng sau, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức:**

- vàng da hoặc mắt
- nhịp tim không đều

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) hoặc qua điện thoại (1-800-332-1088).

## **mũ tôi nên biết về cách bảo quản và tiêu hủy thuốc này?**

Giữ thuốc này trong hộp đựng, đậy kín và để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh nhiệt độ và độ ẩm quá cao (không để trong phòng tắm).

Điều quan trọng là để tất cả các loại thuốc tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em vì nhiều hộp đựng (chẳng hạn như hộp đựng thuốc hàng tuần và thuốc nhỏ mắt, kem, miếng dán và ống hít) không chống được trẻ em và trẻ nhỏ có thể mở chúng dễ dàng. Để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bị ngộ độc, hãy luôn khóa mũ an toàn và đặt thuốc ngay lập tức ở vị trí an toàn - nơi cao và xa, khuất tầm nhìn và tầm tay của trẻ.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Những loại thuốc không cần thiết nên được xử lý theo những cách đặc biệt để đảm bảo rằng vật nuôi, trẻ em và những người khác không thể tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, bạn không nên xả thuốc này xuống bồn cầu. Thay vào đó, cách tốt nhất để thải bỏ thuốc của bạn là thông qua chương trình thu hồi thuốc. Nói chuyện với dược sĩ của bạn hoặc liên hệ với bộ phận tái chế / rác thải địa phương của bạn để tìm hiểu về các chương trình thu hồi trong cộng đồng của bạn. Xem trang web Thải bỏ Thuốc An toàn của FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) để biết thêm thông tin nếu bạn không có quyền truy cập vào chương trình mua lại.

## **n trường hợp khẩn cấp / quá liều**

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin cũng có sẵn trực tuyến tại <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Nếu nạn nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

## **hat thông tin khác tôi nên biết?**

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ có thể yêu cầu một số xét nghiệm để theo dõi chức năng gan của bạn.

Đừng để ai khác dùng thuốc của bạn. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc nạp lại đơn thuốc của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

## **tên rand**

- Pavacot®

Sửa đổi lần cuối - 15/09/2017

[Tìm hiểu cách trích dẫn trang này](#)



[Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm](#)

AHFS® Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

---

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ  
Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022