



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[У дома](#) → [Лекарства, билки и добавки](#) → Папаверин

Source : U.S. National Library of Medicine

URL на тази страница: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

папаверин

произнася се като (pa pav' er een)

защо е предписано това лекарство?

Папаверинът се използва за подобряване на притока на кръв при пациенти с проблеми с кръвообращението. Действа чрез отпускане на кръвоносните съдове, така че кръвта да може да тече по-лесно към сърцето и през тялото.

Това лекарство понякога се предписва за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

как трябва да се използва това лекарство?

Папаверин се предлага като таблетка и капсула с удължено освобождаване (продължително действие), за да се приема през устата. Таблетката обикновено се приема три до пет пъти на ден на равни интервали. Капсулата с удължено освобождаване обикновено се приема на всеки 8-12 часа. Не смачквайте, дъвчете или разделяйте капсулите с удължено освобождаване. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете папаверин точно както е указано.

Папаверинът може да предизвика навик. Не приемайте по-големи дози, приемайте го по-често или за по-дълъг период, отколкото Ви е казал Вашият лекар.

Папаверинът контролира високото кръвно налягане, но не го лекува. Продължете да приемате папаверин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на папаверин, без да говорите с Вашия лекар.

други употреби на това лекарство

Папаверин се използва и за лечение на импотентност при мъжете. Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете папаверин,

- уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към папаверин или други лекарства.
- кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, приемате, особено леводопа (Larodopa, Sinemet) и витамини.

- уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечно заболяване, AV блок (нарушение на сърдечния ритъм) или глаукома.
- уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато приемате папаверин, обадете се на Вашия лекар.
- ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате папаверин.
- трябва да знаете, че това лекарство може да ви направи сънливи или замаяни. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе.
- попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохол, докато приемате папаверин. Алкохолът може да влоши страничните ефекти от папаверин.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Папаверинът може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

- зачервяване (усещане на топлина)
- изпотяване
- главоболие
- умора
- световъртеж
- кожен обрив
- разстроен стомах
- загуба на апетит
- диария
- запек
- стомашни болки

Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар:

- пожълтяване на кожата или очите
- неравномерен сърдечен ритъм

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре и далече, далеч от погледа им и обсега.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

п случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е достъпна и онлайн на адрес <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Ако жертвата е припаднала, има гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени изследвания за проследяване на чернодробната Ви функция.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

- Павакот®

Последна редакция - 15.09.2017 г

[Научете как да цитирате тази страница](#)



[Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc](#)

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г