

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Papaverine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

Papaverine

uitgesproken als (pa pav' er een)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Papaverine wordt gebruikt om de bloedstroom te verbeteren bij patiënten met problemen met de bloedsomloop. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen, zodat het bloed gemakkelijker naar het hart en door het lichaam kan stromen.

Dit medicijn wordt soms voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Papaverine wordt geleverd als tablet en capsule met verlengde afgifte (langwerkende werking) om via de mond in te nemen. De tablet wordt gewoonlijk drie tot vijf keer per dag met gelijkmatige tussenpozen ingenomen. De capsule met verlengde afgifte wordt gewoonlijk elke 8-12 uur ingenomen. De capsules met verlengde afgifte niet fijnmaken, kauwen of verdelen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem papaverine precies zoals voorgeschreven.

Papaverine kan verslavend zijn. Neem geen grotere doses, neem het vaker of voor een langere periode dan uw arts u heeft voorgeschreven.

Papaverine regelt hoge bloeddruk, maar geneest deze niet. Blijf papaverine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van papaverine zonder met uw arts te overleggen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Papaverine wordt ook gebruikt om impotentie bij mannen te behandelen. Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u papaverine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor papaverine of voor andere geneesmiddelen.
- vertel uw arts en apotheker welke geneesmiddelen op recept en zonder recept u gebruikt, met name levodopa (larodopa, sinemet) en vitamines.

- vertel het uw arts als u een hartaandoening, een AV-blok (een hartritmestoornis) of glaucoom heeft of ooit heeft gehad.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u papaverine gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
- als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u papaverine gebruikt.
- u moet weten dat dit medicijn u slaperig of duizelig kan maken. Bestuur geen auto en bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit op u heeft.
- vraag uw arts naar het veilige gebruik van alcohol terwijl u papaverine gebruikt. Alcohol kan de bijwerkingen van papaverine verergeren.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Papaverine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:

- blozen (gevoel van warmte)
- zweten
- hoofdpijn
- vermoeidheid
- duizeligheid
- huiduitslag
- maagklachten
- verlies van eetlust
- diarree
- constipatie
- buikpijn

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- geel worden van de huid of ogen
- onregelmatige hartslag

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaren bij kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts kan bepaalde tests bestellen om uw leverfunctie te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige (zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

- Pavacot®

Laatst herzien - 15-09-2017

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstututen

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022