



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Papaverine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

Papaverine

binibigkas bilang (pa pav' er een)

Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Papaverine ay ginagamit upang mapabuti ang daloy ng dugo sa mga pasyente na may mga problema sa sirkulasyon. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagrerelaks sa mga daluyan ng dugo upang mas madaling dumaloy ang dugo sa puso at sa pamamagitan ng katawan.

Ang gamot na ito ay minsan ay inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Papaverine ay nagmumula bilang isang tableta at extended-release (long-acting) na kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwang kinukuha ang tableta tatlo hanggang limang beses sa isang araw sa pantay na pagitan. Ang extended-release na kapsula ay karaniwang kinukuha tuwing 8-12 oras. Huwag durugin, nguyain, o hatiin ang mga pinahabang-release na kapsula. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang papaverine nang eksakto tulad ng itinuro.

Ang papaverine ay maaaring maging ugali. Huwag kumuha ng mas malalaking dosis, inumin ito nang mas madalas, o mas matagal kaysa sa sinasabi sa iyo ng iyong doktor.

Kinokontrol ng Papaverine ang mataas na presyon ng dugo ngunit hindi ito ginagamot. Ipagpatuloy ang pag-inom ng papaverine kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng papaverine nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din ang Papaverine upang gamutin ang kawalan ng lakas sa mga lalaki. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng papaverine,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa papaverine o anumang iba pang gamot.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot ang iyong iniinom, lalo na ang levodopa (Larodopa, Sinemet) at mga bitamina.

- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon ka na ng sakit sa puso, isang AV block (isang ritmo ng puso disturbance), o glaucoma.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung buntis ka habang umiinom ng papaverine, tawagan ang iyong doktor.
- kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng papaverine.
- dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng antok o pagkahilo. Huwag magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya hangga't hindi mo alam kung paano ito nakakaapekto sa iyo.
- tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng alkohol habang umiinom ka ng papaverine. Ang alkohol ay maaaring magpalala ng mga epekto mula sa papaverine.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyl ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang papaverine ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

- pamumula (pakiramdam ng init)
- pagpapawisan
- sakit ng ulo
- pagkapagod
- pagkahilo
- pantal sa balat
- masakit ang tiyan
- walang gana kumain
- pagtatae
- pagtitibi
- sakit sa tyan

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor:

- paninilaw ng balat o mata
- hindi regular na pagtibok ng puso

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Mag-iimbak sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga pagsusuri upang masubaybayan ang iyong paggana ng atay.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Pavacot®

Huling Binago - 09/15/2017

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022