



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Papavérine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682707.html>

Papavérine

prononcé comme (pa pav' er een)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La papavérine est utilisée pour améliorer la circulation sanguine chez les patients ayant des problèmes de circulation. Il agit en relaxant les vaisseaux sanguins afin que le sang puisse circuler plus facilement vers le cœur et à travers le corps.

Ce médicament est parfois prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La papavérine se présente sous la forme d'un comprimé et d'une capsule à libération prolongée (à action prolongée) à prendre par voie orale. Le comprimé est généralement pris trois à cinq fois par jour à intervalles réguliers. La capsule à libération prolongée est généralement prise toutes les 8 à 12 heures. Ne pas écraser, mâcher ou diviser les gélules à libération prolongée. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la papavérine exactement comme indiqué.

La papavérine peut créer une accoutumance. Ne prenez pas de doses plus importantes, prenez-le plus souvent ou pendant une période plus longue que ce que votre médecin vous a dit.

La papavérine contrôle l'hypertension artérielle mais ne la guérit pas. Continuez à prendre de la papavérine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre de la papavérine sans en parler à votre médecin.

autres utilisations de ce médicament

La papavérine est également utilisée pour traiter l'impuissance chez les hommes. Discutez avec votre médecin des risques possibles de l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre de la papavérine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la papavérine ou à tout autre médicament.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, en particulier de la lévodopa (Larodopa, Sinemet) et des vitamines.

- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie cardiaque, un bloc AV (trouble du rythme cardiaque) ou un glaucome.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de la papavérine, appelez votre médecin.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la papavérine.
- vous devez savoir que ce médicament peut vous rendre somnolent ou étourdi. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment cela vous affecte.
- demandez à votre médecin comment utiliser l'alcool en toute sécurité pendant que vous prenez de la papavérine. L'alcool peut aggraver les effets secondaires de la papavérine.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La papavérine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- bouffées de chaleur (sensation de chaleur)
- transpiration
- mal de crâne
- fatigue
- vertiges
- démangeaison de la peau
- maux d'estomac
- perte d'appétit
- diarrhée
- constipation
- Douleur d'estomac

Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, appelez immédiatement votre médecin :

- jaunissement de la peau ou des yeux
- rythme cardiaque irrégulier

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests pour surveiller votre fonction hépatique.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Pavacoté®

Dernière révision - 15/09/2017

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022