Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL của trang này: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692003.html

Fludarabine tiêm

phát âm là (floo dám 'a đã được)

CẢNH BÁO QUAN TRỌNG:

Thuốc tiêm fludarabine phải được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ có kinh nghiệm trong việc điều trị hóa chất điều trị ung thư.

Tiêm Fludarabine có thể làm giảm số lượng tế bào máu do tủy xương của bạn tạo ra. Sự sụt giảm này có thể khiến bạn xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm và có thể làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng nặng hoặc đe dọa tính mạng. Bác sĩ có thể kê đơn các loại thuốc khác để giảm nguy cơ bị nhiễm trùng nặng trong quá trình điều trị. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có hoặc đã từng có một số lượng thấp bất kỳ loại tế bào máu nào trong máu hoặc bất kỳ tình trạng nào ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn và nếu bạn đã từng bị nhiễm trùng do mức tế bào máu của bạn quá thấp. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy gọi cho bác sĩ ngay lập tức: khó thở; tim đập nhanh; đau đầu; chóng mặt; da nhợt nhạt; Cực kỳ mệt mỏi; chảy máu hoặc bầm tím bất thường; phân đen, hắc ín hoặc có máu; chất nôn có máu hoặc giống như bã cà phê; và sốt, ớn lạnh, ho, đau họng, đi tiểu khó, đau, hoặc thường xuyên, hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng khác.

Tiêm fludarabine cũng có thể gây tổn thương hệ thần kinh. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy gọi cho bác sĩ ngay lập tức: co giật, kích động, lú lẫn và hôn mê (mất ý thức trong một khoảng thời gian).

Tiêm Fludarabine có thể gây ra các tình trạng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng, trong đó cơ thể tấn công và phá hủy các tế bào máu của chính mình. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đã từng phát triển loại tình trạng này sau khi dùng fludarabine trong quá khứ. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy gọi cho bác sĩ ngay lập tức: nước tiểu sẫm màu, da vàng, chấm đỏ hoặc tím li ti trên da, chảy máu cam, kinh nguyệt ra nhiều, tiểu ra máu, ho ra máu hoặc khó thở do chảy máu Trong cổ họng.

Trong một nghiên cứu lâm sàng, những người bị bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính sử dụng tiêm fludarabine cùng với pentostatin (Nipent) có nguy cơ cao bị tổn thương phổi nghiêm trọng. Trong một số trường hợp, tổn thương phổi này gây ra tử vong. Do đó, bác sĩ sẽ không chỉ định tiêm fludarabine cùng với pentostatin (Nipent).

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ sẽ chỉ định một số xét nghiệm để kiểm tra phản ứng của cơ thể bạn với việc tiêm fludarabine.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro khi tiêm fludarabine.

hy có thuốc này được kê đơn không?

Thuốc tiêm Fludarabine được sử dụng để điều trị bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính (CLL; một loại ung thư bạch cầu) ở người lớn đã được điều trị bằng ít nhất một loại thuốc khác và không thuyên giảm. Thuốc tiêm fludarabine nằm trong nhóm thuốc được gọi là chất tương tự purine. Nó hoạt động bằng cách làm chậm hoặc ngừng sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể bạn.

có nên sử dụng thuốc này không?

Thuốc tiêm Fludarabine có dạng bột được thêm vào chất lỏng và được bác sĩ hoặc y tá tại phòng khám bệnh ngoại trú hoặc phòng khám ngoại trú của bệnh viện tiêm trong 30 phút vào tĩnh mạch (vào tĩnh mạch). Nó thường được tiêm mỗi ngày một lần trong 5 ngày liên tiếp. Giai đoạn điều trị này được gọi là chu kỳ, và chu kỳ này có thể lặp lại sau mỗi 28 ngày trong nhiều chu kỳ.

Bác sĩ của bạn có thể cần phải trì hoãn việc điều trị hoặc điều chỉnh liều lượng của bạn nếu bạn gặp một số tác dụng phụ nhất định. Hãy chắc chắn cho bác sĩ biết cảm giác của bạn trong quá trình điều trị bằng tiêm fludarabine.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc tiêm Fludarabine đôi khi cũng được sử dụng để điều trị ung thư hạch không Hodgkin (NHL; ung thư bắt đầu từ một loại tế bào bạch cầu thường chống lại nhiễm trùng) và thuốc diệt nấm mycosis (một loại ung thư hạch ảnh hưởng đến da). Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro khi sử dụng thuốc này đối với tình trạng của bạn.

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi tiêm fludarabine,

- Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với fludarabine, bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần nào trong thuốc tiêm fludarabine. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần.
- cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy nhớ đề cập đến loại thuốc được liệt kê trong phần CẢNH BÁO QUAN TRỌNG hoặc cytarabine (Cytosar-U, DepoCyt). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.
- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng bị bệnh thận, đồng thời cho bác sĩ biết về tất cả các loại thuốc hóa trị khác mà bạn đã nhận và nếu bạn đã từng được điều trị bằng xạ trị (phương pháp điều trị ung thư sử dụng sóng của các hạt năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư)). Trước khi bạn được hóa trị hoặc xạ trị trong tương lai, hãy cho bác sĩ biết rằng bạn đã được điều trị bằng fludarabine.

- bạn nên biết rằng tiêm fludarabine có thể cản trở chu kỳ kinh nguyệt bình thường (kỳ kinh) ở phụ nữ và có thể ngừng sản xuất tinh trùng ở nam giới. Tuy nhiên, bạn không nên cho rằng bạn hoặc đối tác của bạn không thể mang thai. Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, bạn nên nói với bác sĩ trước khi bắt đầu nhận thuốc này. Bạn không nên có kế hoạch có con khi đang tiêm fludarabine hoặc ít nhất 6 tháng sau khi điều trị. Sử dụng một phương pháp ngừa thai đáng tin cậy để tránh thai trong thời gian này. Nói chuyện với bác sĩ của bạn để biết thêm chi tiết. Thuốc tiêm fludarabine có thể gây hại cho thai nhi.

- Nếu bạn đang phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật nha khoa, hãy nói với bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn đang được tiêm fludarabine.
- bạn nên biết rằng tiêm fludarabine có thể gây mệt mỏi, suy nhược, lú lẫn, kích động, co giật và thay đổi thị lực. Không lái xe ô tô hoặc vận hành máy móc cho đến khi bạn biết thuốc này ảnh hưởng đến bạn như thế nào.
- nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi bạn nhận được bất kỳ loại vắc xin nào trong quá trình điều trị bằng tiêm fludarabine.
- bạn nên biết rằng bạn có thể phát triển một phản ứng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng nếu bạn cần được truyền máu trong quá trình điều trị bằng tiêm fludarabine hoặc bất kỳ lúc nào sau khi điều trị. Hãy chắc chắn cho bác sĩ của bạn biết rằng bạn đang nhận hoặc đã được tiêm fludarabine trước khi bạn được truyền máu.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Thuốc tiêm fludarabine có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

- ăn mất ngon
- buồn nôn
- nôn mửa
- táo bón
- bệnh tiêu chảy
- lở miệng
- rụng tóc
- tê, rát, đau hoặc ngứa ran ở bàn tay, cánh tay, bàn chân hoặc chân
- đau cơ hoặc khớp
- đau đầu
- Phiền muộn
- các vấn đề về giấc ngủ

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này hoặc những triệu chứng được liệt kê trong phần CẢNH BÁO QUAN TRỌNG, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức:

- đau ngực hoặc khó chịu
- nhịp tim nhanh hoặc không đều
- mất thính lực
- đau dọc theo một bên của cơ thể
- sưng cánh tay, bàn tay, bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân
- phát ban
- tổ ong
- khó thở hoặc nuốt
- da bong tróc hoặc phồng rộp

Thuốc tiêm Fludarabine có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào khi dùng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại (1-800-332-1088).

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm:

- bầm tím hoặc chảy máu bất thường
- sốt, ớn lạnh, ho, đau họng hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng khác
- trì hoãn sự mù lòa
- hôn mê

hat thông tin khác tôi nên biết?

Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tiêm fludarabine.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

- Fludara®

tên nhiệt

- 2-Fluoro-ara-A Monophosphate, 2-Fluoro-ara AMP, FAMP

Sửa đổi lần cuối - 07/01/2009

Tìm hiểu cách trích dẫn trang này

Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AHFS®Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân ™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp

để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022