Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697045.html

ฟลูตาไมด์

ออกเสียงว่า (floo' ta mide)

คำเตือนที่สำคัญ:

ฟลูตาไมด์อาจทำให้ตับถูกทำลายที่อาจร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: คลื่นไส้, อาเจียน, เบืออาหาร, เหนื่อยล้ามาก, อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่, ปวดกล้ามเนื้อ, ความรุนแรง, ปวดท้องด้านขวาบน, ผิวเหลืองหรือ ตาหรือปัสสาวะสีเข้ม

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจเลือดเพื่อตรวจดูว่าตับของคุณทำงานได้ดีเพียงใด ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ฟลูตาไมด์ ทุกเดือนในช่วง 4 เดือนแรกของการรักษา และเป็นระยะตราบเท่าที่การรักษาของคุณยังดำเนินต่อไป

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการรับประทานฟลูตาไมด์

hy เป็นยานี้กำหนด?

Flutamide ใช้ร่วมกับ luteinizing hormone-release agonist (LHRH; ประเภทของการฉีดฮอร์โมนเช่น leuprolide (Lupron, Eligard], goserelin [Zoladex] หรือ triptorelin [Trelstar]) เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากบางชนิด Flutamide อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า nonsteroidal antiandrogens มันทำงานโดยการปิดกั้นผลกระทบของแอนโดรเจน (ฮอร์โมนเพศชาย) เพื่อหยุดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

ฟลูตาไมด์มาในรูปแบบแคปซูลที่ต้องรับประทานทางปาก มักจะมีหรือไม่มีอาหารทุก 8 ชั่วโมง (สามครั้งต่อวัน) รับประทานฟลูตาไมด์ในเวลาเดียวกันทุกวัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจ ใช้ฟลูตาไมด์ตามที่กำหนดไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

ทานฟลูตาไมด์ร่วมกับการรักษา LHRH agonist ต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสำเนาข้อมูลของผู้ผลิตสำหรับผู้ป่วย

ใช้สำหรับยานี้

ยานี้อาจกำหนดให้ใช้อย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานฟลูตาไมด์

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ฟลูตาไมด์หรือยาอื่นๆ
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่หาซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่คุณกำลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาต้านการแข็งตัวของเลือด (''ทินเนอร์เลือด'') เช่น วาร์ฟาริน (คูมาดิน)
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณสูบบุหรี่ และหากคุณมีหรือเคยเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดที่สืบทอด เช่น การขาดกลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนส (G-6-PD) หรือโรคเฮโมโกลบินเอ็ม
- คุณควรรู้ว่าฟลูตาไมด์มีไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น หากสตรีมีครรภ์รับประทาน ฟลูตาไมด์อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรืออาจจะตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานฟลูตาไมด์ หากคุณใช้ฟลูตาไมด์ในขณะตั้งครรภ์ ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ
- ถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปลอดภัยในขณะที่คุณทานฟลูตาไมด์ ฟลูตาไมด์อาจทำให้หน้าแดง และการดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้อาการแย่ลงได้

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสำหรับมื้อต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

ฟลูตาไมด์อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- ท้องเสีย
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- เบืออาหาร
- ร้อนวูบวาบ
- ลดความสามารถทางเพศหรือความปรารถนา
- หน้าอกโตในผู้ชาย
- อาการง่วงนอน

- ความสับสน
- ภาวะซึมเศร้า
- ความวิตกกังวล
- อาการบวมที่มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง
- ปัสสาวะสีฟ้าสีเขียวหรือสีส้ม

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

แม้ว่าจะพบได้ยาก แต่ผู้ชายบางคนที่รับประทานฟลูตาไมด์ก็เป็นมะเร็งเต้านมได้ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

ฟลูตาไมด์อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่ใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์ (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยานี้?

เก็บยานี้ไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในสถานที่ปลอดภัยทันที โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่ลอยขึ้นและพ้นสายตาและเอื้อมถึงhttp://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยานี้ลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ท กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

- การขยายเต้านมและความอ่อนโยน

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อฟลูตาไมด์

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์) ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

- ยูเล็กซิน®¶

¶-สินค้าแบรนด์นี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว อาจมีทางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2018

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ
หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022