

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

פלובוקסמין מבוטא כ (floo vox' a meen)

אזהרה חשובה:

מספר קטן של ילדים, בני נוער ומבוגרים צעירים (עד גיל 24) שנטלו תרופות נוגדות דיכאון ('מעלות מצב רוח') כמו פלובוקסמין במהלך מחקרים קליניים הפכו לאובדניים (מחשבים על פגיעה או התאבדות או תכנון או ניסיון לעשות זאת). ילדים, בני נוער ומבוגרים צעירים הנוטלים תרופות נוגדות דיכאון לטיפול בדיכאון או במחלות נפש אחרות עשויים להיות בעלי סיכוי גבוה יותר להתאבד מאשר ילדים, בני נוער ומבוגרים צעירים שאינם נוטלים תרופות נוגדות דיכאון לטיפול במצבים אלו. עם זאת, מומחים אינם בטוחים עד כמה גדול הסיכון הזה ועד כמה יש לקחת בחשבון אם ילד או נער צריכים לקחת תרופה נוגדת דיכאון.

עליך לדעת שהבריאות הנפשית שלך עשויה להשתנות בדרכים בלתי צפויות כאשר אתה נוטל פלובוקסמין או תרופות נוגדות דיכאון אחרות גם אם אתה מבוגר מעל גיל 24. אתה עלול להפוך לאובדני, במיוחד בתחילת הטיפול ובכל זמן שהמינון שלך גדל או מופחת. אתה, משפחתך או המטפל שלך צריכים להתקשר לרופא שלך מיד אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים: דיכאון חדש או מחמיר; לחשוב על פגיעה או התאבדות, או תכנון או ניסיון לעשות זאת; דאגה קיצונית; תסיסה; התקפי חרדה; קושי להירדם או להישאר ישן; התנהגות אגרסיבית; נרגנות; פועל בלי לחשוב; אי שקט חמור; והתרגשות חריגה בטירוף.

הרופא שלך ירצה לראות אותך לעתים קרובות בזמן שאתה נוטל פלובוקסמין, במיוחד בתחילת הטיפול שלך. הקפד לקיים את כל התורים לביקורים במשרד עם הרופא שלך.

הרופא או הרוקח יתנו לך את דף המידע של היצרן למטופל (מדריך תרופות) כאשר תתחיל טיפול ב fluvoxamine. קרא את המידע בעיון ושאל את הרופא או הרוקח אם יש לך שאלות כלשהן. אתה יכול גם להשיג את מדריך התרופות מאתר ה-FDA: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]<http://www.fda.gov>

לא משנה גילך, לפני שאתה נוטל תרופה נוגדת דיכאון, אתה, הוריק או המטפל שלך צריכים לדבר עם הרופא שלך על הסיכונים והיתרונות של טיפול במצבך בתרופה נוגדת דיכאון או

עם טיפולים אחרים. כדאי גם לדבר על הסיכונים והיתרונות של אי טיפול במצבך. אתה צריך לדעת שדיכאון או מחלת נפש אחרת מגדילים מאוד את הסיכון שתהפוך לאובדני. סיכון זה גבוה יותר אם אתה או מישהו במשפחתך סבל מהפרעה דו קוטבית או סבלת אי פעם בהפרעה דו קוטבית (מצב רוח שמשתנה מדיכאון להתרגש בצורה לא נורמלית) או מאניה (מצב רוח מטורף, נרגש בצורה חריגה) או אם חשבת על או ניסית להתאבד. שוחח עם הרופא שלך על מצבך, הסימפטומים וההיסטוריה הרפואית האישית והמשפחתית שלך. אתה והרופא שלך תחליטו איזה סוג טיפול מתאים לכם.

היי האם נרשמה תרופה זו?

זה עובד על ידי הגדלת כמות הסרוטונין, חומר טבעי במוח שעוזר לשמור על איזון נפשי (SSRI). הוא בקבוצה של תרופות הנקראות מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין סלקטיביים Fluvoxamine. משמש לטיפול בהפרעה אובססיבית-קומפולסיבית (מחשבות טורדניות שלא נעלמו והצורך לבצע פעולות מסוימות שוב ושוב) ובהפרעת חרדה חברתית (פחד קיצוני מאינטראקציה עם אחרים או ביצועים מול אחרים שמפריעים לנורמה חיים) Fluvoxamine

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא. fluvoxamine מגיע כטבליה וככמוסה בשחרור מורחב לנטילה דרך הפה. הטבליה נלקחת בדרך כלל פעם ביום לפני השינה או פעמיים ביום, פעם אחת בבוקר ופעם אחת לפני השינה. הקפסולה בשחרור מורחב נלקחת בדרך כלל, עם או בלי אוכל, פעם ביום לפני השינה. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח Fluvoxamine

בלווע את הקפסולות בשחרור מורחב בשלמותן; אל תמעוך או תלעס אותם.

הרופא שלך עשוי להתחיל במינון נמוך של fluvoxamine ולהגדיל בהדרגה את המינון שלך, לא לעתים קרובות יותר מפעם בשבוע, בהתאם למידת היעילות של התרופה עבורך ולתופעות הלוואי שאתה חווה.

ייתכן שיחלפו מספר שבועות או יותר עד שתרגיש את התועלת המלאה של פלובוקסמין. המשך ליטול פלובוקמין גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול פלובוקמין מבלי לדבר עם הרופא שלך. אם תפסיק לפתע ליטול פלובוקמין, אתה עלול לחוות תסמיני גמילה כגון עצבנות; תסיסה; סחרחורת; דאגה קיצונית; אי שקט; בלבול; כאב ראש; עייפות; שינויים במצב הרוח; קושי להירדם או להישאר ישן; או תחושות כאב, צריבה, חוסר תחושה, עקצוץ או 'שוק חשמלי' בידיים או ברגליים. הרופא שלך כנראה יקטין את המינון שלך בהדרגה.

השימושים בתרופה זו

משמש גם לפעמים לטיפול בדיכאון. שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים האפשריים בשימוש בתרופה זו למצבך Fluvoxamine

תרופה זו נרשמה לפעמים לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת פלובוקמין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי ל-fluvoxamine, כל תרופה אחרת או כל אחד מהמרכיבים בטבליות fluvoxamine ובכמוסות בשחרור מורחב. שאל את הרופא או הרוקח שלך עבור רשימה של המרכיבים..
- ספר לרופא שלך אם אתה לוקח אלוסטרון (Lotronex), פמוזיד (Orap), זנאפלקס (Zanaflex), טיזנידין (Ramelteon) (Rozerem), או תיורידאזין (thioridazine). הרופא שלך כנראה יגיד לך לא לקחת פלובוקמין.
- ספר לרופא שלך אם אתה נוטל את התרופות הבאות או אם הפסקת ליטול אותן במהלך 14 הימים האחרונים: מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAO) כגון (Zyvox) (linezolid) (Marplan) (isocarboxazid), מתילן כחול (Emsam, Zelapar) (selegiline) (Azilect), (rasagiline) (Nardil) (-phenelzine) (Parnate) (tranylcypromine); הרופא שלך כנראה יגיד לך לא לקחת פלובוקמין. אם אתה מפסיק ליטול פלובוקמין, עליך להמתין לפחות 14 ימים לפני שתחיל ליטול מעכב MAO.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם או ללא מרשם, וויטמינים שאתה לוקח או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהדברים הבאים: אלפרזולם (קסנקס); אמפטמינים; נוגדי קרישה ('מדללי דם') כגון וורפרין (קומדין); אספירין או מוצרים המכילים אספירין ותרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות אחרות כגון איבופרופן (אדוויל, מוטרין) ונפרוקסן (Aleve, Naprosyn); חוסמי בטא כגון מטופרולול (לופרסור, טופרול) ופרופרנולול (המנג'ול, אינדרל, אינופראן); בוספירון; carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, אחרים); קלזופין (קלזריל, ורסקלוז); ציקלוספורין (Neoral, Sandimmune); dextromethorphan (בתרופות נגד שיעול); דיאזפאם (ואליום, ולטוקו); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, אחרים); משתנים ('כדורי מים'); פנטניל (אבסטרל, אקטיק, פנטורה, אונסוליס, אחרים); (Haldol) (haloperidol); קטוקונאזול; ליתיום (Lithobid); תרופות למיגרנה כמו אלמוטריפטן (אקסרט), אלטריפטן (רלפקס), פרובאטריפטן (פרובה), נראטריפטן, ריזאטריפטן (מקסלט), סומטריפטן (אימיטרקס) (זולמיטריפטן (זומיג); מתדון (מתאדוז); מקסילטין); (Seizalam) (metoclopramide; midazolam); אומפרזול (Prilosec, Zegerid); תרופות אחרות לחרדה, דיכאון או מחלת נפש; פניטואין (דילנטין, פניטק); טקרין (Cognex); תיאופילין (Theo-24, Theochron); tramadol (Conzip, Qdolo, Ultracet, ב-Ultracet); (Halcion) (triazolam); וקינידין. ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. תרופות רבות אחרות עשויות גם לקיים אינטראקציה עם פלובוקסמין, אז הקפידו לספר לרופא על כל התרופות שאתם נוטלים,
- ספר לרופא שלך אילו מוצרים צמחיים ותוספי תזונה אתה נוטל, במיוחד מוצרים המכילים סנט ג'ון וורט וטריפטופן.
- ספר לרופא שלך אם אתה שותה או שתית אי פעם כמויות גדולות של אלכוהול או השתמשת בסמי רחוב או השתמשת יתר על המידה בתרופות מרשם. ספר גם לרופא שלך אם עברת לאחרונה התקף לב, אם יש לך רמות נתון נמוכות בדם; או אם יש לך או היו לך אי פעם בעיות דימום; התקפים; או מחלת לב, כליות או כבד.
- ספר לרופא שלך אם אתה בהריון, במיוחד אם את בחודשים האחרונים להריון, או אם את מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם אתה נכנס להריון בזמן נטילת פלובוקמין, התקשר לרופא שלך. Fluvoxamine עלול לגרום לבעיות ביילודים לאחר הלידה אם הוא נלקח במהלך החודשים האחרונים של ההריון.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה נוטל פלובוקמין.
- עליך לדעת שתרופה זו עלולה לגרום לך לנמנם או להשפיע על כושר השיפוט, החשיבה או המוטוריקה שלך. אל תנהג במכונית או תפעיל מכונות עד שאתה יודע כיצד התרופה משפיעה עליך.
- זכרו שאלכוהול יכול להוסיף לנמנום הנגרמת על ידי תרופה זו. אתה לא צריך לשתות אלכוהול בזמן נטילת fluvoxamine.

- ספר לרופא שלך אם אתה משתמש במוצרי טבק. עישון סיגריות עשוי להפחית את היעילות של תרופה זו.
- אתה צריך לדעת כי fluvoxamine עלול לגרום לגלאוקומה עם סגירת זווית (מצב שבו הנוזל נחסם לפתע ואינו מסוגל לזרום החוצה מהעין מה שגורם לעלייה מהירה וחמורה בלחץ העין שעלול להוביל לאובדן ראייה). שוחח עם הרופא שלך לגבי בדיקת עיניים לפני שתתחיל ליטול תרופה זו. אם יש לך בחילות, כאבי עיניים, שינויים בראייה, כגון ראיית טבעות צבעוניות סביב האורות, ונפיחות או אדמומיות בעין או סביב העין, התקשר לרופא שלך או קבל טיפול רפואי חירום מיד.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

קח את המנה שנשכחה ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה שלך, דלג על המנה שהוחמצה והמשך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף
Fluvoxamine

- נומה
- פה יבש
- בחילה
- הקאה
- שלשול
- כאב בטן
- עצירות
- קלקול קבה
- גז
- שינוי בטעם
- האף סתום
- תיאבון מופחת
- מיוזע
- קושי להירדם או להישאר ישן
- ירידה במשקל
- עצבנות

- בעיות מיניות אצל גברים; ירידה בחשק המיני, חוסר יכולת לקבל או לשמור על זקפה, או שפיכה מאוחרת או נעדרת

- בעיות מיניות אצל נשים; ירידה בחשק המיני, או אורגזמה מאוחרת או חוסר יכולת לקבל אורגזמה

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, או אלה המפורטים בסעיפים 'אזהרה חשובה' או 'אמצעי זהירות מיוחדים', התקשר לרופא מיד או קבל טיפול רפואי חירום:

- סחרחורת

- חום, הזעה, בלבול, דופק מהיר או לא סדיר, ונוקשות שרירים או עוויתות חמורות, תסיסה, הזיות, אובדן קואורדינציה, בחילות, הקאות או שלשולים

- כאב, צריבה, חוסר תחושה או עקצוץ בידיים או ברגליים

- רעד של חלק בגוף שאינך יכול לשלוט בו

- כאב ראש

- קושי בריכוז

- קשיי ריכוז, בעיות זיכרון או בלבול

- חולשה

- חוסר יציבות

- פריחה

- כוורות

- נפיחות של העיניים, הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון

- נשימה מואטת או קשה

- התקפים

- אובדן ההכרה

- דימום או חבורות חריגות

- אף מדמם

- הקאות דם או חומר שנראה כמו שאריות קפה

- דם אדום בצואה או צואה שחורה וזפתית

עשוי להפחית את התיאבון ולגרום לירידה במשקל בילדים. הרופא של ילדך יצפה בגדילה שלו בקפידה. שוחח עם הרופא של ילדך אם יש לך חששות לגבי הגדילה או המשקל של ילדך בזמן שהוא או היא נוטלים תרופה זו. שוחח עם הרופא של ילדך על הסיכונים במתן פלובוקמין לילדך Fluvoxamine

עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן שאתה נוטל תרופה זו.
Fluvoxamine

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA)

או בטלפון 1-800-332- (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]http://www.fda.gov/Safety/MedWatch[
(1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאפים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.

[http://www.upandaway.org]http://www.upandaway.org[

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (/c4Rm4p]http://goo.gl/c4Rm4p]http://goo.gl) למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת [https://www.poisohelp.org/help]https://www.poisohelp.org/help[. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול:

- נומה
- תסיסה, הזיות, חום, הזעה, בלבול, דופק מהיר, רעד, נוקשות שרירים או עוויתות חמורות, אובדן קואורדינציה, בחילות, הקאות או שלשולים
- עייפות יתר
- סתְחֹרֶת
- תסיסה
- מְנִיָה
- התקפים
- אובדן ההכרה

צריך לדעת מידע אחר?

חשוב לקיים את כל הפגישות עם הרופא והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובתך ל-fluvoxamine.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

• Luvox®

• Luvox CR®

מתוקן לאחרונה - 15/01/2022

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. נשכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 8600 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022