

[家](#) → [薬](#)、[ハーブ](#)、[サプリメント](#) → フルボキサミン

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

## フルボキサミン

(floo vox'a meen) と発音されます

### 重要な警告 :

臨床研究中にフルボキサミンなどの抗うつ薬（「気分上昇薬」）を服用した少数の子供、10代の若者、および若い成人（24歳まで）は自殺傾向になりました（自分を傷つけたり殺したりすることを考えたり、計画したりしようとしたりすることを考えています）。うつ病やその他の精神疾患を治療するために抗うつ薬を服用している子供、10代の若者、および若い成人は、これらの状態を治療するために抗うつ薬を服用していない子供、10代の若者、および若い成人よりも自殺する可能性が高くなります。しかし、専門家は、このリスクがどれほど大きいのか、そして子供またはティーンエイジャーが抗うつ薬を服用すべきかどうかを決定する際にどれだけ考慮すべきかについて確信がありません。

フルボキサミンやその他の抗うつ薬を服用すると、24歳以上の成人であっても、メンタルヘルスが予期せぬ形で変化する可能性があることを知っておく必要があります。特に治療の開始時や投与量を増減したときはいつでも自殺する可能性があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、あなた、あなたの家族、またはあなたの介護者はすぐに医師に連絡する必要があります。自分を傷つけたり殺したりすることを考えたり、そうすることを計画したり試みたりすること。極度の心配; 攪拌; パニック発作; 眠りにつくまたは眠り続けるのが難しい; 攻撃的な行動; 過敏性; 考えずに行動する; 重度の落ち着きのなさ; そして熱狂的な異常な興奮。

フルボキサミンを服用している間、特に治療の開始時に、医療提供者は頻繁にあなたに会いたいと思うでしょう。必ず医師との診察の予約をすべて取ってください。

フルボキサミンによる治療を開始すると、医師または薬剤師から製造元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または薬剤師に尋ねてください。また、FDAのWebサイトから投薬ガイドを入手することもできます。<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>]。

年齢に関係なく、抗うつ薬を服用する前に、あなた、あなたの親、またはあなたの介護者は、抗うつ薬であなたの状態を治療することのリスクと利点について医師に相談する必要があります。

他の治療法で。また、自分の状態を治療しないことのリスクと利点についても話し合う必要があります。うつ病やその他の精神疾患があると、自殺するリスクが大幅に高まることを知っておく必要があります。このリスクは、あなたまたはあなたの家族の誰かが双極性障害（落ち込んだ気分から異常に興奮した気分）または躁病（熱狂した、異常に興奮した気分）を持っているか、または持っていた場合、または自殺を考えた、または試みた場合に高くなります。あなたの状態、症状、個人および家族の病歴について医師に相談してください。あなたとあなたの医師は、あなたに適した治療の種類を決定します。

## なぜこの薬が処方されているのですか？

フルボキサミンは、強迫性障害（消えない厄介な考えと特定の行動を何度も繰り返す必要性）および社交不安障害（他者との相互作用または他者の前で行動することへの極度の恐怖が正常を妨げる）を治療するために使用されます（生活）。フルボキサミンは、選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは、精神的なバランスを維持するのを助ける脳内の天然物質であるセロトニンの量を増やすことによって機能します。

## わあ、この薬を使うべきですか？

フルボキサミンは、錠剤と徐放性カプセルとして経口摂取できます。タブレットは通常、就寝時に1日1回、または1日2回、朝に1回、就寝時に1回服用します。徐放性カプセルは通常、食事の有無にかかわらず、就寝時に1日1回服用します。処方箋の指示に注意深く従って、あなたが理解していない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指示通りにフルボキサミンを服用してください。多かれ少なかれ服用したり、医師の処方よりも頻繁に服用したりしないでください。

徐放性カプセル全体を飲み込みます。それらを押しつぶしたり噛んだりしないでください。

医師は、低用量のフルボキサミンから始めて、薬の効果と経験する副作用に応じて、週に1回以下の頻度で、徐々に用量を増やしていく場合があります。

フルボキサミンの効果を十分に実感できるようになるまでには、数週間以上かかる場合があります。気分が良くてもフルボキサミンを服用し続けてください。医師に相談せずにフルボキサミンの服用を中止しないでください。フルボキサミンの服用を突然やめると、神経過敏などの禁断症状が現れることがあります。攪拌; めまい; 極度の心配; 不安; 錯乱; 頭痛; 疲れ; 気分が変わる; 眠りにつくまたは眠り続けるのが難しい; または手や足の痛み、灼熱感、しびれ、うずき、または「感電」感覚。あなたの医者はおそらくあなたの用量を徐々に減らします。

## この薬の用途

フルボキサミンは、うつ病の治療にも使用されることがあります。あなたの状態にこの薬を使用することの潜在的なリスクについて医師に相談してください。

この薬は他の用途に処方されることもあります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

## 特別な注意事項に従う必要がありますか？

### フルボキサミンを服用する前に、

- フルボキサミン、他の薬、またはフルボキサミン錠剤や徐放性カプセルの成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、医師または薬剤師にご相談ください。
- アロセトロン (Lotronex)、ピモジド (Orap)、ラメルテオン (Rozerem)、チザニジン (Zanaflex)、またはチオリダジンを服用しているかどうかを医師に伝えてください。あなたの医者はおそらくフルボキサミンを服用しないようにあなたに言うでしょう。
- 次の薬を服用しているのか、過去14日以内に服用を中止したのかを医師に伝えてください。イソカルボキサジド (Marplan)、リネゾリド (Zyvox)、メチレンブルーなどのモノアミン酸化酵素 (MAO) 阻害剤。フェネルジン (Nardil)、ラサギリン (Azilect)、セレギリン (Emsam、Zelapar)、およびトラニルシプロミン (Parnate)。あなたの医者はおそらくフルボキサミンを服用しないようにあなたに言うでしょう。フルボキサミンの服用を中止する場合は、MAO阻害剤の服用を開始する前に少なくとも14日待つ必要があります。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、および服用中または服用予定のビタミンを伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。アルプラゾラム (Xanax) ; アンフェタミン; ワルファリン (クマディン) などの抗凝固剤 (「血液希釈剤」)。アスピリンまたはアスピリン含有製品、およびイブプロフェン (Advil、Motrin) やナプロキセン (Aleve、Naprosyn) などの他の非ステロイド性抗炎症薬。メトプロロール (Lopressor、Toprol) やプロプラノロール (Hemangeol、Inderal、Innopran) などのベータ遮断薬。ブスピロン; カルバマゼピン (カルバマゼピン、エクエトロ、テグレート、その他) ; クロザピン (Clozaril、Versacloz) ; シクロスポリン (Neoral、Sandimmune) ; デキストロメトルファン (咳止め薬) ; ジアゼパム (バリウム、バルトコ) ; ジルチアゼム (Cardizem、Cartia、Tiazac、その他) ; 利尿薬 (「水の丸薬」) ; フェンタニル (Abstral、Actiq、Fentora、Onsolis、その他) ; ハロペリドール (ハルドール) ; ケトコナゾール; リチウム (Lithobid) ; アルモトリプタン (Axert)、エレトリプタン (Relpax)、フロバトリプタン (Frova)、ナラトリプタン、リザトリプタン (Maxalt)、スマトリプタン (Imitrex)、ゾルミトリプタン (Zomig) などの片頭痛の薬。メタドン (メタドーン) ; メキシレチン; メトクロプラミド; ミダゾラム (セイザラム) ; オメプラゾール (Prilosec、Zegerid) ; 不安神経症、うつ病、または精神疾患のための他の薬; フェニトイン (Dilantin、Phenytek) ; タクリン (コグネックス) ; テオフィリン (Theo-24、Theochron) ; ترامドール (Conzip、Qdolo、Ultram、Ultracet) ; トリアゾラム (ハルシオン) ; とキニジン。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。他の多くの薬もフルボキサミンと相互作用する可能性があるため、服用しているすべての薬について医師に必ず伝えてください。
- あなたが服用しているハーブ製品と栄養補助食品、特にセントジョンズワートとトリプトファンを含む製品を医師に伝えてください。
- 大量のアルコールを飲んだり飲んだりしたことがあるか、街頭の薬を使用したことがあるか、処方薬を使いすぎたことがあるかどうかを医師に伝えてください。また、最近心臓発作を起こした場合、血中のナトリウム濃度が低い場合は、医師に相談してください。または、出血の問題が発生した、または発生したことがある場合。発作; または心臓、腎臓、または肝臓の病気。
- 妊娠しているかどうか、特に妊娠の最後の数か月にいる場合、または妊娠を計画している場合や授乳中の場合は、医師に相談してください。フルボキサミンを服用中に妊娠した場合は、医師に連絡してください。フルボキサミンは、妊娠の最後の数か月間に服用した場合、出産後の新生児に問題を引き起こす可能性があります。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、フルボキサミンを服用していることを医師または歯科医に伝えてください。
- この薬は眠気を催したり、判断力、思考力、運動能力に影響を与える可能性があることを知っておく必要があります。この薬があなたにどのような影響を与えるかがわかるまで、車を運転したり機械を操作したりしないでください。
- アルコールは、この薬によって引き起こされる眠気を増す可能性があることを忘れないでください。フルボキサミンを服用している間はアルコールを飲まないでください。

- タバコ製品を使用するかどうかを医師に伝えてください。喫煙はこの薬の効果を低下させる可能性があります。
- フルボキサミンは閉塞隅角緑内障を引き起こす可能性があることを知っておく必要があります（液体が突然遮断されて眼から流出できなくなり、眼圧が急速に大幅に上昇し、視力低下につながる可能性があります）。この薬の服用を開始する前に、目の検査を受けることについて医師に相談してください。吐き気、目の痛み、ライトの周りに色のついたリングが見えるなどの視力の変化、目の中や周りの腫れや赤みがある場合は、医師に連絡するか、すぐに緊急治療を受けてください。

## 特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

## 服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

忘れた分は、覚えてからすぐに飲んでください。ただし、次の通常の服用時間になったら、忘れた分は飲まないで1回分を飛ばして、通常の服用時間に1回分を飲んでください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

## この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

フルボキサミンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 眠気
- 口渇
- 吐き気
- 嘔吐
- 下痢
- 胃痛
- 便秘
- 消化不良
- ガス
- 味の変化
- 鼻づまり
- 食欲不振
- 発汗
- 眠りにつくことや眠り続けることの難しさ
- 減量
- 緊張感

- 男性の性的問題; 性欲の低下、勃起を維持または維持できない、または射精の遅延または欠如
- 女性の性的問題; 性欲の低下、オルガスムの遅延、またはオルガスムを持ってない

**いくつかの副作用は深刻な場合があります。次の症状のいずれか、または重要な警告または特別な注意事項のセクションに記載されている症状が発生した場合は、すぐに医師に連絡するか、緊急治療を受けてください。**

- めまい
- 発熱、発汗、錯乱、速いまたは不規則な心拍、および重度の筋肉のこわばりまたはけいれん、興奮、幻覚、協調性の喪失、吐き気、嘔吐、または下痢
- 手や足の痛み、灼熱感、しびれ、またはうずき
- 体のコントロールできない部分の揺れ
- 頭痛
- 集中力の低下
- 集中力の低下、記憶の問題、または混乱
- 弱点
- 不安定さ
- 発疹
- じんましん
- 目、顔、唇、舌、喉の腫れ
- 呼吸が遅い、または呼吸が困難
- 発作
- 意識の喪失
- 異常な出血またはあざ
- 血が出ている鼻
- 吐血またはコーヒーかすのように見える物質
- 便中の赤い血または黒とタールの便

フルボキサミンは食欲を減退させ、子供の体重減少を引き起こす可能性があります。あなたの子供の医者は彼または彼女の成長を注意深く見守っています。この薬を服用している間の子供の成長や体重について懸念がある場合は、子供の医師に相談してください。フルボキサミンを子供に与えるリスクについては、子供の医師に相談してください。

フルボキサミンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬を服用しているときに異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。

( (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) または電話 (1-800-332-1088) )。

## この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。 <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

## n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。 <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

**過剰摂取の症状には次のものがあります。**

- 眠気
- 興奮、幻覚、発熱、発汗、混乱、速い心拍、震え、重度の筋肉のこわばりまたはけいれん、協調性の喪失、吐き気、嘔吐、または下痢
- 過度の倦怠感
- めまい
- 攪拌
- マニア
- 発作
- 意識の喪失

## 他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ることが重要です。あなたの医者はフルボキサミンへのあなたの反応をチェックするために特定の臨床検査を命じます。

他の人にあなたの薬を服用させないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

## ランド名

- Luvox®
- Luvox®CR

最終改訂日-2022年1月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製商用利用はASHPの承認が必要です。

---

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日