



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

집 → [약물](#), [허브 및 보조제](#) → 플루복사민

Source : U.S. National Library of Medicine

이 페이지의 URL: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

플루복사민 (floo vox' meen)으로 발음

중요 경고:

임상 연구 중에 플루복사민과 같은 항우울제('기분 조절제')를 복용한 소수의 어린이, 십대 및 젊은 성인(24세 이하)이 자살 충동(자해 또는 살해에 대해 생각하거나 그렇게 할 계획 또는 시도). 우울증이나 기타 정신 질환을 치료하기 위해 항우울제를 복용하는 어린이, 십대 및 청년은 이러한 상태를 치료하기 위해 항우울제를 복용하지 않는 어린이, 십대 및 청년보다 자살할 가능성이 더 높을 수 있습니다. 그러나 전문가들은 이 위험이 얼마나 큰지, 어린이나 십대가 항우울제를 복용해야 하는지를 결정할 때 얼마나 고려해야 하는지에 대해 확신하지 못합니다.

24세 이상의 성인이라도 플루복사민 또는 기타 항우울제를 복용하면 정신 건강이 예상치 못한 방식으로 바뀔 수 있음을 알아야 합니다. 특히 치료 초기와 복용량을 늘리거나 줄일 때마다 자살 충동이 생길 수 있습니다. 귀하, 귀하의 가족 또는 간병인은 다음 증상 중 하나가 발생하면 즉시 의사에게 연락해야 합니다. 우울증이 새로 생기거나 악화됨; 자신을 해치거나 죽이는 것에 대해 생각하거나 그렇게 할 계획 또는 시도; 극도의 걱정; 동요; 공황 발작; 잠들기 어렵거나 잠을 자지 못하는 것; 공격적인 행동; 과민성; 생각 없이 행동하는 것; 심한 안절부절; 그리고 미친듯한 비정상적인 흥분.

귀하의 의료 제공자는 귀하가 플루복사민을 복용하는 동안, 특히 치료 초기에 귀하를 자주 만나기를 원할 것입니다. 의사와 진료실 방문에 대한 모든 약속을 지키십시오.

의사나 약사는 플루복사민 치료를 시작할 때 제조업체의 환자 정보 시트(약물 가이드)를 줄 것입니다. 정보를 주의 깊게 읽고 질문이 있는 경우 의사 또는 약사에게 문의하십시오. FDA 웹사이트에서 Medication Guide를 얻을 수도 있습니다.<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

연령에 관계없이 항우울제를 복용하기 전에 귀하, 귀하의 부모 또는 간병인은 항우울제 또는

다른 치료법과 함께. 또한 자신의 상태를 치료하지 않을 때의 위험과 이점에 대해서도 이야기해야 합니다. 우울증이나 다른 정신 질환이 있으면 자살 충동이 생길 위험이 크게 증가한다는 사실을 알아야 합니다. 이 위험은 귀하 또는 귀하의 가족 중 양극성 장애(우울증에서 비정상적으로 흥분된 기분으로 변하는 기분) 또는 조증(광란, 비정상적으로 흥분된 기분)을 가졌거나 겪은 적이 있거나 자살을 생각했거나 시도한 적이 있는 경우 더 높습니다. 귀하의 상태, 증상, 개인 및 가족 병력에 대해 의사와 상담하십시오. 귀하와 귀하의 의사는 귀하에게 적합한 치료 유형을 결정할 것입니다.

이 약이 처방된 이유는 무엇입니까?

Fluvoxamine은 강박 장애(지나가지 않는 성가신 생각과 특정 행동을 반복적으로 수행해야 하는 필요성) 및 사회 불안 장애(다른 사람과 상호 작용하거나 정상적인 행동을 방해하는 다른 사람 앞에서 수행하는 것에 대한 극도의 두려움)을 치료하는 데 사용됩니다. ³). Fluvoxamine은 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI)라고 하는 약물 종류에 속합니다. 그것은 정신 균형을 유지하는 데 도움이 되는 뇌의 천연 물질인 세로토닌의 양을 증가시켜 작동합니다.

오 이 약을 사용해야합니까?

Fluvoxamine은 입으로 복용하는 정제 및 연장 방출 캡슐로 제공됩니다. 정제는 일반적으로 취침 시간에 1일 1회 또는 1일 2회, 아침에 1회, 취침 시간에 1회 복용합니다. 서방형 캡슐은 일반적으로 음식과 관계없이 하루에 한 번 취침 시간에 복용합니다. 처방전 라벨의 지시 사항을 주의 깊게 따르고 의사나 약사에게 이해되지 않는 부분에 대한 설명을 요청하십시오. 지시대로 정확하게 플루복사민을 복용하십시오. 의사가 처방한 것보다 많거나 적게 복용하거나 더 자주 복용하지 마십시오.

서방형 캡슐을 통째로 삼키십시오. 부수거나 씹지 마십시오.

의사는 저용량의 플루복사민으로 시작하여 약이 귀하에게 얼마나 잘 작용하고 경험하는 부작용에 따라 일주일에 한 번 이하로 점진적으로 용량을 늘릴 수 있습니다.

fluvoxamine의 완전한 이점을 느끼려면 몇 주 또는 그 이상이 걸릴 수 있습니다. 기분이 좋아도 플루복사민을 계속 복용하십시오. 의사와 상의하지 않고 플루복사민 복용을 중단하지 마십시오. 갑자기 fluvoxamine 복용을 중단하면 과민성과 같은 금단 증상이 나타날 수 있습니다. 동요; 현기증; 극도의 걱정; 불안; 착란; 두통; 피로감; 기분 변화; 잠들기 어렵거나 잠을 자지 못하는 것; 또는 손이나 발의 통증, 작열감, 무감각, 따끔거림 또는 '감전' 감각. 의사는 아마도 복용량을 점차적으로 줄일 것입니다.

이 약의 용도

Fluvoxamine은 때때로 우울증 치료에 사용됩니다. 귀하의 상태에 대해 이 약을 사용할 때 발생할 수 있는 위험에 대해 의사와 상담하십시오.

이 약은 때때로 다른 용도로 처방됩니다. 자세한 내용은 의사나 약사에게 문의하십시오.

모자 특별 예방 조치를 따라야 합니까?

플루복사민을 복용하기 전,

- 플루복사민, 다른 약물 또는 플루복사민 정제 및 연장 방출 캡슐의 성분에 알레르기가 있는 경우 의사와 약사에게 알려주세요. 성분 목록은 의사나 약사에게 문의하십시오..
- 알로세트론(Lotronex), 피모자이드(Orap), 라멜테온(Rozerem), 티자니딘(Zanaflex) 또는 티오리다진을 복용 중인 경우 의사에게 알려주세요. 의사는 플루복사민을 복용하지 말라고 말할 것입니다.
- 다음 약물을 복용 중이거나 지난 14일 이내에 복용을 중단한 경우 의사에게 알려주세요. phenelzine(Nardil), rasagiline(Azilect), selegiline(Emsam, Zelapar) 및 tranylcypromine(Parnate). 의사는 플루복사민을 복용하지 말라고 말할 것입니다. 플루복사민 복용을 중단하는 경우 MAO 억제제 복용을 시작하기 전에 최소 14일을 기다려야 합니다.
- 의사와 약사에게 어떤 처방약과 비처방약, 비타민을 복용 중이거나 복용할 계획인지 알려주세요. 다음 중 하나를 반드시 언급하십시오: alprazolam(Xanax); 암페타민; 와파린(Coumadin)과 같은 항응고제('혈액 희석제'); 아스피린 또는 아스피린 함유 제품 및 이부프로펜(Advil, Motrin) 및 나프록센(Aleve, Naprosyn)과 같은 기타 비스테로이드성 항염증제; 메토프롤롤(로프레서, 토프롤) 및 프로프라놀롤(헤만걸, 인더랄, 이노프란)과 같은 베타 차단제; 부스피론; 카르바마제핀(Carbatrol, Equetro, Tegretol 등); 클로자핀(Clozaril, Versacloz); 사이클로스포린(Neoral, Sandimmune); 덱스트로메토르판(기침 치료제); 디아제팜(Valium, Valtoco); 딜티아젠펜(Cardizem, Cartia, Tiazac, 기타); 이노제('물약'); 펜타닐(Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, 기타); 할로페리돌(Haldol); 케토코나졸; 리튬(Lithobid); 알모트립탄(Axert), 엘레트립탄(Relpax), 프로바트립탄(Frova), 나라트립탄, 리자트립탄(Maxalt), 수마트립탄(Imitrex) 및 졸미트립탄(Zomig)과 같은 편두통용 약물; 메타돈(메타도즈); 맥실레틴; 메토클로프라미드; 미다졸람(Seizalam); 오메프라졸(Prilosec, Zegerid); 불안, 우울증 또는 정신 질환에 대한 기타 약물; 페니토인(Dilantin, Phenytek); 타크린(Cognex); 테오필린(Theo-24, Theochron); 트라마돌(Conzip, Qdolo, Ultram, Ultracet); 트리아졸람(할시온); 및 퀴니딘. 의사는 약물의 복용량을 변경하거나 부작용에 대해 주의 깊게 모니터링해야 할 수도 있습니다. 다른 많은 약물도 플루복사민과 상호 작용할 수 있으므로 복용 중인 모든 약물에 대해 의사에게 알려주세요.
- 어떤 약초 제품과 영양 보조제를 복용하고 있는지 의사에게 알려주세요. 특히 St. John's wort와 트립토판을 함유한 제품이 그렇습니다.
- 당신이 술을 마시거나 많은 양의 술을 마신 적이 있거나 길거리 마약을 사용했거나 처방약을 과용했다면 의사에게 알려주세요. 또한 최근에 심장마비를 겪은 적이 있는지, 혈중 나트륨 수치가 낮으면 의사에게 알려주세요. 또는 출혈 문제가 있거나 있었던 적이 있는 경우; 발작; 또는 심장, 신장 또는 간 질환.
- 임신한 경우, 특히 임신 마지막 몇 개월 동안이거나 임신을 계획 중이거나 모유 수유 중인 경우 의사에게 알려주세요. 플루복사민을 복용하는 동안 임신하면 의사에게 연락하십시오. Fluvoxamine을 임신 마지막 달에 복용하면 분만 후 신생아에게 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 치과 수술을 포함하여 수술을 받는 경우 의사나 치과 의사에게 플루복사민을 복용하고 있다고 알려주세요.
- 이 약이 졸리거나 판단력, 사고력 또는 운동 능력에 영향을 줄 수 있음을 알아야 합니다. 이 약이 당신에게 어떤 영향을 미치는지 알기 전에는 자동차를 운전하거나 기계를 조작하지 마십시오.
- 알코올은 이 약으로 인한 졸음을 더할 수 있음을 기억하십시오. Fluvoxamine을 복용하는 동안 술을 마시지 마십시오.

- 담배 제품을 사용하는 경우 의사에게 알려주세요. 흡연은 이 약의 효과를 감소시킬 수 있습니다.
- 플루복사민이 폐쇄각 녹내장(액체가 갑자기 막혀 눈에서 흘러나오지 못해 빠르고 심각한 안압 상승을 일으켜 시력 상실을 유발할 수 있는 상태)을 유발할 수 있음을 알아야 합니다. 이 약을 복용하기 전에 눈 검사에 대해 의사와 상담하십시오. 메스꺼움, 눈의 통증, 조명 주변의 색 고리가 보이는 등의 시력 변화, 눈 또는 눈 주위가 부어 오르거나 붉어지면 즉시 의사에게 연락하거나 응급 치료를 받으십시오.

모자 특별 식단 지침을 따라야 하나요?

의사가 달리 지시하지 않는 한 정상적인 식단을 계속하십시오.

복용량을 잊은 경우 모자를 써야 하나요?

놓친 복용량을 기억하는 즉시 복용하십시오. 그러나 다음 복용 시간이 거의 다 되었다면 놓친 복용량을 건너뛰고 정기적인 복용 일정을 계속하십시오. 놓친 것을 보충하기 위해 두 번 복용하지 마십시오.

모자 부작용이 약물이 일으킬 수 있습니까?

Fluvoxamine은 부작용을 일으킬 수 있습니다. 다음 증상 중 하나라도 심각하거나 사라지지 않으면 의사에게 알려주세요.

- 졸음
- 마른 입
- 메스꺼움
- 구토
- 설사
- 복통
- 변비
- 체
- 가스
- 맛의 변화
- 코막힘
- 식욕 감소
- 발한
- 잠들기 어렵거나 잠들지 못함
- 체중 감량
- 신경질

- 남성의 성 문제; 성욕 감소, 발기를 얻거나 유지할 수 없거나 사정이 지연되거나 결석
- 여성의 성 문제; 성욕 감소 또는 오르가즘 지연 또는 오르가즘을 가질 수 없음

일부 부작용은 심각할 수 있습니다. 다음 증상 중 하나가 발생하거나 중요 경고 또는 특별 예방 조치 섹션에 나열된 증상이 나타나면 즉시 의사에게 연락하거나 응급 치료를 받으십시오.

- 현기증
- 열, 발한, 착란, 빠르거나 불규칙한 심장 박동, 심한 근육 경직 또는 경련, 동요, 환각, 조정 상실, 메스꺼움, 구토 또는 설사
- 손이나 발의 통증, 작열감, 마비 또는 따끔거림
- 통제할 수 없는 신체 부위의 떨림
- 두통
- 집중하기 어려움
- 집중력 장애, 기억력 문제 또는 혼란
- 약점
- 불안정
- 발진
- 두드러기
- 눈, 얼굴, 입술, 혀 또는 목의 붓기
- 느려지거나 어려운 호흡
- 발작
- 의식 소실
- 비정상적인 출혈 또는 타박상
- 코피
- 토하는 피 또는 커피 찌꺼기처럼 보이는 물질
- 대변의 적혈구 또는 검은색 및 타르색 대변

Fluvoxamine은 식욕을 감소시키고 소아에서 체중 감소를 유발할 수 있습니다. 자녀의 의사는 자녀의 성장을 주의 깊게 관찰할 것입니다. 아이가 이 약을 복용하는 동안 아이의 성장이나 체중이 걱정된다면 담당 의사와 상의하십시오. 자녀에게 플루복사민을 투여할 때의 위험에 대해 자녀의 의사와 상담하십시오.

Fluvoxamine은 다른 부작용을 일으킬 수 있습니다. 이 약을 복용하는 동안 비정상적인 문제가 발생하면 의사에게 연락하십시오.

심각한 부작용이 발생하는 경우 귀하 또는 담당 의사가 온라인으로 FDA(Food and Drug Administration)의 MedWatch 유해 사례 보고 프로그램에 보고서를 보낼 수 있습니다.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 또는 전화 (1-800-332-1088).

이 약의 보관 및 폐기에 대해 알아야 하나요?

이 약은 들어 있던 용기에 단단히 밀봉하여 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실온에서 보관하고 과도한 열과 습기가 없는 곳(화장실이 아님)에 보관하십시오.

많은 용기(주간 알약 관리, 점안약, 크림, 패치, 흡입기용 용기 등)는 어린이에게 내성이 없고 어린이가 쉽게 열 수 있으므로 모든 약은 어린이의 눈과 손이 닿지 않는 곳에 보관하는 것이 중요합니다. 어린 아이들을 중독으로부터 보호하려면 항상 안전 캡을 잠그고 즉시 약을 안전한 장소에 두십시오.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

불필요한 약은 애완동물, 어린이 및 다른 사람이 섭취할 수 없도록 특별한 방법으로 폐기해야 합니다. 그러나 이 약을 변기에 버리면 안 됩니다. 대신, 약물을 폐기하는 가장 좋은 방법은 약물 회수 프로그램을 이용하는 것입니다. 약사와 상담하거나 지역 쓰레기/재활용 부서에 연락하여 지역 사회의 수거 프로그램에 대해 알아보십시오. FDA의 약품 안전 폐기 웹사이트(<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 회수 프로그램에 대한 액세스 권한이 없는 경우 자세한 내용을 참조하십시오.

n 응급/과다복용의 경우

과다 복용의 경우 독극물 관리 헬프라인 1-800-222-1222로 전화하십시오. 정보는 온라인으로도 제공됩니다. <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 피해자가 쓰러졌거나, 발작을 일으켰거나, 호흡 곤란을 겪거나, 깨어나지 못하면 즉시 911로 응급 서비스에 전화하십시오.

과다 복용의 증상은 다음과 같습니다.

- 졸음
- 초조, 환각, 발열, 발한, 착란, 빠른 심장 박동, 떨림, 심한 근육 경직 또는 경련, 조정 상실, 메스꺼움, 구토 또는 설사
- 과도한 피로
- 현기증
- 동요
- 열광
- 발작
- 의식 소실

모자 다른 정보를 알아야 하나요?

의사 및 검사실과의 모든 약속을 지키는 것이 중요합니다. 의사는 플루복사민에 대한 반응을 확인하기 위해 특정 실험실 검사를 지시할 것입니다.

다른 사람이 귀하의 약을 복용하게 하지 마십시오. 처방전을 다시 조제하는 것과 관련하여 궁금한 사항은 약사에게 문의하십시오.

귀하가 복용하고 있는 모든 처방약 및 비처방약(일반의약품)은 물론 비타민, 미네랄 또는 기타 식이 보조제와 같은 제품의 목록을 작성하는 것이 중요합니다. 의사를 방문하거나 병원에 입원할 때마다 이 목록을 지참해야 합니다. 비상시에 휴대하는 것도 중요한 정보입니다.

랜드 이름

- 루복스®
- 루복스®CR

최종 수정 - 2022년 1월 15일

[이 페이지를 인용하는 방법 알아보기](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 면책 조항](#)

AHFS®환자 투약 정보™. © 저작권, 2022. 미국 건강 시스템 약사 협회®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. 판권 소유. 복사

상업적 사용을 위해서는 ASHP의 승인을 받아야 합니다.

국립 의학 도서관 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 미국 보건 복지부

국립 보건원

페이지 마지막 업데이트: 2022년 3월 25일