



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Fluvoxamina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

## Fluvoxamina

pronunciado como (floo vox' a meen)

### AVISO IMPORTANTE:

Um pequeno número de crianças, adolescentes e adultos jovens (até 24 anos de idade) que tomaram antidepressivos ('elevadores de humor') como a fluvoxamina durante os estudos clínicos tornaram-se suicidas (pensando em se machucar ou se matar ou planejar ou tentar fazê-lo). Crianças, adolescentes e adultos jovens que tomam antidepressivos para tratar a depressão ou outras doenças mentais podem ter maior probabilidade de se tornarem suicidas do que crianças, adolescentes e adultos jovens que não tomam antidepressivos para tratar essas condições. No entanto, os especialistas não têm certeza de quão grande é esse risco e quanto deve ser considerado ao decidir se uma criança ou adolescente deve tomar um antidepressivo.

Você deve saber que sua saúde mental pode mudar de maneiras inesperadas quando você toma fluvoxamina ou outros antidepressivos, mesmo se for um adulto com mais de 24 anos de idade. Pode tornar-se suicida, especialmente no início do seu tratamento e sempre que a sua dose for aumentada ou diminuída. Você, sua família ou seu cuidador devem ligar para seu médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas: depressão nova ou agravada; pensar em se machucar ou se matar, ou planejar ou tentar fazê-lo; preocupação extrema; agitação; ataques de pânico; dificuldade em adormecer ou manter o sono; comportamento agressivo; irritabilidade; agir sem pensar; inquietação grave; e excitação anormal frenética.

O seu médico irá querer vê-lo com frequência enquanto estiver a tomar fluvoxamina, especialmente no início do seu tratamento. Certifique-se de manter todos os compromissos para visitas ao consultório com seu médico.

O médico ou farmacêutico fornecerá a folha de informações do fabricante do paciente (Guia de Medicação) quando você iniciar o tratamento com fluvoxamina. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode obter o Guia de Medicação no site da FDA: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

Não importa sua idade, antes de tomar um antidepressivo, você, seus pais ou seu cuidador devem conversar com seu médico sobre os riscos e benefícios de tratar sua condição com um antidepressivo ou

com outros tratamentos. Você também deve falar sobre os riscos e benefícios de não tratar sua condição. Você deve saber que ter depressão ou outra doença mental aumenta muito o risco de você se tornar suicida. Este risco é maior se você ou alguém da sua família tem ou já teve transtorno bipolar (humor que muda de deprimido para anormalmente excitado) ou mania (humor frenético, anormalmente excitado) ou pensou ou tentou suicídio. Converse com seu médico sobre sua condição, sintomas e histórico médico pessoal e familiar. Você e seu médico decidirão que tipo de tratamento é adequado para você.

## por que este medicamento é prescrito?

A fluvoxamina é usada para tratar o transtorno obsessivo-compulsivo (pensamentos incômodos que não desaparecem e a necessidade de realizar certas ações repetidamente) e transtorno de ansiedade social (medo extremo de interagir com outras pessoas ou de se apresentar na frente de outras pessoas que interfere no normal vida). A fluvoxamina está em uma classe de medicamentos chamados inibidores seletivos da recaptção da serotonina (ISRSs). Funciona aumentando a quantidade de serotonina, uma substância natural do cérebro que ajuda a manter o equilíbrio mental.

## como este medicamento deve ser usado?

A fluvoxamina vem como um comprimido e uma cápsula de liberação prolongada para tomar por via oral. O comprimido geralmente é tomado uma vez ao dia ao deitar ou duas vezes ao dia, uma vez de manhã e outra ao deitar. A cápsula de liberação prolongada geralmente é tomada, com ou sem alimentos, uma vez ao dia na hora de dormir. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome fluvoxamina exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Engula as cápsulas de liberação prolongada inteiras; não os esmague ou mastigue.

Seu médico pode começar com uma dose baixa de fluvoxamina e aumentar gradualmente sua dose, não mais do que uma vez por semana, dependendo de quão bem o medicamento funciona para você e dos efeitos colaterais que você experimenta.

Pode levar várias semanas ou mais para você sentir todos os benefícios da fluvoxamina. Continue a tomar fluvoxamina mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar fluvoxamina sem falar com o seu médico. Se você parar de tomar fluvoxamina repentinamente, poderá sentir sintomas de abstinência, como irritabilidade; agitação; tontura; preocupação extrema; inquietação; confusão; dor de cabeça; cansaço; mudança de humor; dificuldade em adormecer ou manter o sono; ou sensação de dor, queimação, dormência, formigamento ou 'choque elétrico' nas mãos ou pés. O seu médico provavelmente irá diminuir a sua dose gradualmente.

## outros usos para este medicamento

A fluvoxamina também é usada às vezes para tratar a depressão. Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

Este medicamento às vezes é prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

## Que precauções especiais devo seguir?

### Antes de tomar fluvoxamina,

- informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à fluvoxamina, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes dos comprimidos de fluvoxamina e cápsulas de liberação prolongada. Peça ao seu médico ou farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe o seu médico se estiver tomando alosetrona (Lotronex), pimozida (Orap), ramelteon (Rozerem), tizanidina (Zanaflex) ou tioridazina. O seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar fluvoxamina.
- informe o seu médico se estiver tomando os seguintes medicamentos ou se parou de tomá-los nos últimos 14 dias: inibidores da monoamina oxidase (MAO), como isocarboxazida (Marplan), linezolida (Zyvox), azul de metileno; fenelzina (Nardil), rasagilina (Azilect), selegilina (Emsam, Zelapar) e tranilcipromina (Parnate). O seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar fluvoxamina. Se você parar de tomar fluvoxamina, deve esperar pelo menos 14 dias antes de começar a tomar um inibidor da MAO.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos e vitaminas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: alprazolam (Xanax); anfetaminas; anticoagulantes ("diluente do sangue"), como varfarina (Coumadin); aspirina ou produtos contendo aspirina e outras drogas anti-inflamatórias não esteróides como ibuprofeno (Advil, Motrin) e naproxeno (Aleve, Naprosyn); betabloqueadores como metoprolol (Lopressor, Toprol) e propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); buspirona; carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol, outros); clozapina (Clozaril, Versacloz); ciclosporina (Neoral, Sandimmune); dextrometorfano (em medicamentos para tosse); diazepam (Valium, Valtoco); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, outros); diuréticos ('pílulas de água'); fentanil (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, outros); haloperidol (Haldol); cetozonazol; lítio (Lithobid); medicamentos para enxaquecas, como almotriptano (Axert), eletriptano (Relpax), frovatriptano (Frova), naratriptano, rizatriptano (Maxalt), sumatriptano (Imitrex) e zolmitriptano (Zomig); metadona (Metadose); mexiletina; metoclopramida; midazolam (Seizalam); omeprazole (Prilosec, Zegerid); outros medicamentos para ansiedade, depressão ou doença mental; fenitoína (Dilantin, Phenytek); tacrina (Cognex); teofilina (Theo-24, Theochron); tramadol (Conzip, Qdolo, Ultram, em Ultracet); triazolam (Halcion); e quinidina. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com a fluvoxamina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando,
- informe ao seu médico quais produtos fitoterápicos e suplementos nutricionais você está tomando, especialmente produtos que contenham erva de São João e triptofano.
- informe o seu médico se você bebe ou já bebeu grandes quantidades de álcool ou usou drogas de rua ou usou medicamentos prescritos em excesso. Informe também o seu médico se teve recentemente um ataque cardíaco, se tem níveis baixos de sódio no sangue; ou se você tem ou já teve problemas de sangramento; convulsões; ou doença cardíaca, renal ou hepática.
- Informe o seu médico se estiver grávida, especialmente se estiver nos últimos meses de gravidez, ou se planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar fluvoxamina, contacte o seu médico. A fluvoxamina pode causar problemas em recém-nascidos após o parto se for tomada durante os últimos meses de gravidez.
- se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar fluvoxamina.
- você deve saber que este medicamento pode deixá-lo sonolento ou afetar seu julgamento, pensamento ou habilidades motoras. Não conduza um carro ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.
- lembre-se que o álcool pode aumentar a sonolência causada por este medicamento. Você não deve beber álcool enquanto estiver tomando fluvoxamina.

- informe o seu médico se você usa produtos de tabaco. O tabagismo pode diminuir a eficácia deste medicamento.
- você deve saber que a fluvoxamina pode causar glaucoma de ângulo fechado (uma condição em que o fluido é repentinamente bloqueado e incapaz de fluir para fora do olho, causando um aumento rápido e grave da pressão ocular que pode levar à perda de visão). Converse com seu médico sobre fazer um exame oftalmológico antes de começar a tomar este medicamento. Se você tiver náusea, dor nos olhos, alterações na visão, como ver anéis coloridos ao redor das luzes e inchaço ou vermelhidão no olho ou ao redor, ligue para o seu médico ou procure tratamento médico de emergência imediatamente.

## Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

### o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

### Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

**A fluvoxamina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for grave ou não desaparecer:**

- sonolência
- boca seca
- náusea
- vômito
- diarreia
- dor de estômago
- constipação
- indigestão
- gás
- mudança de gosto
- nariz entupido
- diminuição do apetite
- sudorese
- dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo
- perda de peso
- nervosismo

- problemas sexuais em homens; diminuição do desejo sexual, incapacidade de obter ou manter uma ereção ou ejaculação atrasada ou ausente
- problemas sexuais em mulheres; diminuição do desejo sexual ou orgasmo retardado ou incapaz de ter um orgasmo

**Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você apresentar algum dos seguintes sintomas, ou aqueles listados nas seções ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES ou PRECAUÇÕES ESPECIAIS, ligue para o seu médico imediatamente ou procure tratamento médico de emergência:**

- tontura
- febre, sudorese, confusão, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares e rigidez ou espasmos musculares graves, agitação, alucinações, perda de coordenação, náusea, vômito ou diarreia
- dor, queimação, dormência ou formigamento nas mãos ou pés
- agitação de uma parte do corpo que você não pode controlar
- dor de cabeça
- Dificuldade de concentração
- dificuldade de concentração, problemas de memória ou confusão
- fraqueza
- instabilidade
- irritação na pele
- urticária
- inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua ou garganta
- respiração lenta ou difícil
- convulsões
- perda de consciência
- sangramento ou hematomas incomuns
- nariz sangrento
- vomitando sangue ou um material que se parece com borra de café
- sangue vermelho nas fezes ou fezes pretas e alcatroadas

A fluvoxamina pode diminuir o apetite e causar perda de peso em crianças. O médico do seu filho observará cuidadosamente o seu crescimento. Fale com o médico do seu filho se tiver dúvidas sobre o crescimento ou peso do seu filho enquanto estiver a tomar este medicamento. Converse com o médico do seu filho sobre os riscos de dar fluvoxamina ao seu filho.

A fluvoxamina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

## **o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?**

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

## **n caso de emergência/sobredosagem**

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

### **Os sintomas de overdose podem incluir:**

- sonolência
- agitação, alucinações, febre, sudorese, confusão, batimentos cardíacos acelerados, calafrios, rigidez muscular grave ou espasmos, perda de coordenação, náuseas, vômitos ou diarreia
- cansaço excessivo
- tontura
- agitação
- mania
- convulsões
- perda de consciência

## **Quais outras informações devo saber?**

É importante manter todas as consultas com o seu médico e com o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais para verificar a sua resposta à fluvoxamina.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

### nomes de rands

- Luvox®
- Luvox®CR

Última revisão - 15/01/2022

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS® Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

---

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022