



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Дом](#) → [Лекарства, травы и добавки](#) → Флувоксамин

Source : U.S. National Library of Medicine

URL этой страницы: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

## флувоксамин

произносится как (floo vox' a meen)

### ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Небольшое количество детей, подростков и молодых людей (в возрасте до 24 лет), принимавших антидепрессанты («улучшающие настроение»), такие как флувоксамин, во время клинических исследований, стали склонными к суициду (думали о причинении себе вреда или самоубийстве, планировали или пытались это сделать). Дети, подростки и молодые люди, которые принимают антидепрессанты для лечения депрессии или других психических заболеваний, могут быть более склонны к суициду, чем дети, подростки и молодые люди, которые не принимают антидепрессанты для лечения этих состояний. Однако эксперты не уверены, насколько велик этот риск и насколько его следует учитывать при принятии решения о том, следует ли ребенку или подростку принимать антидепрессант.

Вы должны знать, что ваше психическое здоровье может измениться неожиданным образом, когда вы принимаете флувоксамин или другие антидепрессанты, даже если вы взрослый человек старше 24 лет. У вас могут возникнуть суицидальные мысли, особенно в начале лечения и в любое время, когда ваша доза увеличивается или уменьшается. Вы, ваша семья или ваш опекун должны немедленно позвонить своему врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов: новая или ухудшающаяся депрессия; мысли о том, чтобы причинить себе вред или убить себя, либо планирующие или пытающиеся это сделать; крайнее беспокойство; волнение; панические атаки; трудности с засыпанием или сном; агрессивное поведение; раздражительность; действовать не думая; тяжелое беспокойство; и бешеное ненормальное возбуждение.

Ваш лечащий врач захочет часто видеть вас, пока вы принимаете флувоксамин, особенно в начале лечения. Обязательно соблюдайте все назначенные визиты в офис с вашим врачом.

Врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начнете лечение флувоксамином. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете получить Руководство по лекарствам на веб-сайте FDA: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

Независимо от вашего возраста, прежде чем принимать антидепрессант, вы, ваш родитель или лицо, осуществляющее уход, должны поговорить со своим врачом о рисках и преимуществах лечения вашего состояния антидепрессантами или антидепрессантами.

с другими видами лечения. Вам также следует рассказать о рисках и преимуществах отказа от лечения вашего заболевания. Вы должны знать, что депрессия или другое психическое заболевание значительно увеличивает риск того, что вы станете склонны к суициду. Этот риск выше, если вы или кто-либо из членов вашей семьи страдает или когда-либо страдал биполярным расстройством (настроение, которое меняется с депрессивного на ненормально возбужденное) или манией (неистовое, ненормально возбужденное настроение), или если вы думали или пытались совершить самоубийство. Поговорите со своим врачом о своем состоянии, симптомах, личной и семейной истории болезни. Вы и ваш врач решите, какой тип лечения подходит именно вам.

## зачем назначают это лекарство?

Флувоксамин используется для лечения обсессивно-компульсивного расстройства (назойливые мысли, которые не исчезнут, и необходимость выполнять определенные действия снова и снова) и социального тревожного расстройства (крайний страх взаимодействия с другими или выступления перед другими, что мешает нормальной жизни). Флувоксамин относится к классу препаратов, называемых селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС). Он работает за счет увеличения количества серотонина, естественного вещества в мозге, которое помогает поддерживать душевное равновесие.

## Как следует использовать это лекарство?

Флувоксамин выпускается в виде таблеток и капсул с пролонгированным высвобождением для приема внутрь. Таблетку обычно принимают либо один раз в день перед сном, либо два раза в день, один раз утром и один раз перед сном. Капсулы с пролонгированным высвобождением обычно принимают один раз в день перед сном независимо от приема пищи. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же принимайте флувоксамин. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Проглотите капсулы пролонгированного действия целиком; не раздавить или жевать их.

Ваш врач может начать с низкой дозы флувоксамина и постепенно увеличивать дозу, не чаще одного раза в неделю, в зависимости от того, насколько хорошо лекарство действует на вас, и побочных эффектов, которые вы испытываете.

Вам может потребоваться несколько недель или больше, чтобы ощутить все преимущества флувоксамина. Продолжайте принимать флувоксамин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием флувоксамина, не посоветовавшись с врачом. Если вы внезапно перестанете принимать флувоксамин, у вас могут возникнуть симптомы отмены, такие как раздражительность; волнение; головокружение; крайнее беспокойство; беспокойство; путаница; Головная боль; усталость; изменения настроения; трудности с засыпанием или сном; или боль, жжение, онемение, покалывание или ощущение «электрического удара» в руках или ногах. Ваш врач, вероятно, будет постепенно уменьшать дозу.

## использование этого лекарства

Флувоксамин также иногда используется для лечения депрессии. Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

Это лекарство иногда назначают для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

## Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

### Прежде чем принимать флувоксамин,

- Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на флувоксамин, какие-либо другие лекарства или какие-либо ингредиенты в таблетках флувоксамина и капсулах с пролонгированным высвобождением. Спросите у своего врача или фармацевта список ингредиентов.
- Расскажите своему врачу, если вы принимаете алосетрон (Lotronex), пимозид (Orap), рамелтеон (Rozerem), тизанидин (Zanaflex) или тиоридазин. Ваш врач, вероятно, скажет вам не принимать флувоксамин.
- сообщите своему врачу, если вы принимаете следующие лекарства или прекратили их прием в течение последних 14 дней: ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), такие как изокарбоксазид (марплан), линезолид (зивокс), метиленовый синий; фенелзин (нардил), разагилин (азилект), селегилин (эмсам, зелапар) и транилципромин (парнат). Ваш врач, вероятно, скажет вам не принимать флувоксамин. Если вы прекратите принимать флувоксамин, вам следует подождать не менее 14 дней, прежде чем начинать принимать ингибитор МАО.
- сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, а также витамины вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: алпразолам (ксанакс); амфетамины; антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин); аспирин или продукты, содержащие аспирин, и другие нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); бета-адреноблокаторы, такие как метопролол (лопрессор, топрол) и пропранолол (гемангеол, индерал, иннопран); буспирон; карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, др.); клозапин (Клозарил, Версаклоз); циклоспорин (Неорал, Сандиммун); декстрометорфан (в препаратах от кашля); диазепам (валиум, валтоко); дилтиазем (Кардизем, Картия, Тиазак, др.); диуретики («мочегонные таблетки»); фентанил (Абстрал, Актик, Фентора, Онсолис, другие); галоперидол (Haldol); кетоконазол; литий (литобид); лекарства от мигрени, такие как алмотриптан (Axert), элетриптан (Relpax), фроватриптан (Frova), наратриптан, ризатриптан (Maxalt), суматриптан (Imitrex) и золмитриптан (Zomig); метадон (метадоза); мексилетин; метоклопрамид; мидазолам (Сейзалам); омепразол (Прилосек, Зегерид); другие лекарства от беспокойства, депрессии или психических заболеваний; фенитоин (Дилантин, Фенитек); такрин (Когнекс); теофиллин (Тео-24, Теохрон); трамадол (Conzip, Qdolo, Ultram, Ultracet); триазолам (Гальцион); и хинидин. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с флувоксамином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете.
- Расскажите своему врачу, какие растительные продукты и пищевые добавки вы принимаете, особенно продукты, содержащие зверобой и триптофан.
- сообщите своему врачу, если вы пьете или когда-либо употребляли большое количество алкоголя, употребляли уличные наркотики или злоупотребляли лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Также сообщите своему врачу, если у вас недавно был сердечный приступ, если у вас низкий уровень натрия в крови; или если у вас есть или когда-либо были проблемы с кровотечением; судороги; или болезни сердца, почек или печени.
- Расскажите своему врачу, если вы беременны, особенно если вы находитесь в последние несколько месяцев беременности, или если вы планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при приеме флувоксамина, позвоните своему врачу. Флувоксамин может вызвать проблемы у новорожденных после родов, если его принимать в течение последних месяцев беременности.
- Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете флувоксамин.
- Вы должны знать, что это лекарство может вызвать сонливость или повлиять на ваши суждения, мышление или двигательные навыки. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.
- помните, что алкоголь может усилить сонливость, вызванную этим лекарством. Вы не должны употреблять алкоголь во время приема флувоксамина.

- сообщите своему врачу, если вы употребляете табачные изделия. Курение сигарет может снизить эффективность этого лекарства.
- Вы должны знать, что флувоксамин может вызвать закрытоугольную глаукому (состояние, при котором жидкость внезапно блокируется и не может вытекать из глаза, вызывая быстрое и сильное повышение внутриглазного давления, что может привести к потере зрения). Поговорите со своим врачом о проверке зрения, прежде чем начать принимать это лекарство. Если у вас тошнота, боль в глазах, изменения зрения, например цветные кольца вокруг источников света, а также отек или покраснение глаз или вокруг них, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью.

### **какие специальные диетические указания я должен соблюдать?**

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

### **Что мне делать, если я забыл принять дозу?**

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

### **Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?**

**Флувоксамин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:**

- сонливость
- сухость во рту
- тошнота
- рвота
- диарея
- боль в животе
- запор
- расстройство желудка
- газ
- изменение вкуса
- заложенный нос
- снижение аппетита
- потливость
- трудности с засыпанием или сном
- потеря веса
- нервозность

- сексуальные проблемы у мужчин; снижение полового влечения, неспособность получить или сохранить эрекцию, задержка или отсутствие эякуляции
- сексуальные проблемы у женщин; снижение полового влечения, задержка оргазма или неспособность достичь оргазма

**Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов или симптомы, перечисленные в разделах ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:**

- головокружение
- лихорадка, потливость, спутанность сознания, быстрое или нерегулярное сердцебиение и сильная ригидность мышц или подергивания, возбуждение, галлюцинации, потеря координации, тошнота, рвота или диарея
- боль, жжение, онемение или покалывание в руках или ногах
- тряска части тела, которую вы не можете контролировать
- Головная боль
- трудности с концентрацией внимания
- трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью или спутанность сознания
- **слабость**
- неустойчивость
- **СЫПЬ**
- крапивница
- **отек глаз, лица, губ, языка или горла**
- замедленное или затрудненное дыхание
- припадки
- **потеря сознания**
- необычное кровотечение или кровоподтеки
- кровавый нос
- рвота кровью или материалом, похожим на кофейную гущу
- красная кровь в стуле или черный и дегтеобразный стул

Флувоксамин может снижать аппетит и вызывать потерю веса у детей. Врач вашего ребенка будет внимательно следить за его или ее ростом. Поговорите с врачом вашего ребенка, если у вас есть опасения по поводу роста или веса вашего ребенка, пока он или она принимает это лекарство. Поговорите с врачом вашего ребенка о рисках, связанных с введением флувоксамина вашему ребенку.

Флувоксамин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы во время приема этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефону (1-800-332-1088).

## Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте.

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — вверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

## п экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в Интернете по адресу <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

## Симптомы передозировки могут включать:

- сонливость
- возбуждение, галлюцинации, лихорадка, потливость, спутанность сознания, учащенное сердцебиение, озноб, сильная ригидность мышц или подергивания, потеря координации, тошнота, рвота или диарея
- чрезмерная усталость
- головокружение
- волнение
- мания
- припадки
- потеря сознания

## какую другую информацию я должен знать?

Важно соблюдать все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы проверить вашу реакцию на флувоксамин.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

## ранд имена

- Лувокс®
- Лувокс®CR

Последняя редакция — 15.01.2022

[Научитесь цитировать эту страницу](#)



[Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности](#)

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

---

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.