



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Medicamentos, hierbas y suplementos](#) → fluvoxamina

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de esta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

fluvoxamina

pronunciado como (floo vox' a meen)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Una pequeña cantidad de niños, adolescentes y adultos jóvenes (hasta 24 años de edad) que tomaron antidepresivos ("elevadores del estado de ánimo") como la fluvoxamina durante los estudios clínicos desarrollaron tendencias suicidas (pensar en lastimarse o suicidarse o planear o intentar hacerlo). Los niños, adolescentes y adultos jóvenes que toman antidepresivos para tratar la depresión u otras enfermedades mentales pueden tener más probabilidades de desarrollar tendencias suicidas que los niños, adolescentes y adultos jóvenes que no toman antidepresivos para tratar estas afecciones. Sin embargo, los expertos no están seguros de cuán grande es este riesgo y cuánto se debe considerar al decidir si un niño o adolescente debe tomar un antidepresivo.

Debe saber que su salud mental puede cambiar de manera inesperada cuando toma fluvoxamina u otros antidepresivos, incluso si es un adulto mayor de 24 años. Puede tener tendencias suicidas, especialmente al comienzo de su tratamiento y en cualquier momento en que aumente o disminuya su dosis. Usted, su familia o su cuidador deben llamar a su médico de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas: depresión nueva o que empeora; pensar en lastimarse o suicidarse, o planear o intentar hacerlo; preocupación extrema; agitación; ataques de pánico; dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido; comportamiento agresivo; irritabilidad; actuar sin pensar; inquietud severa; y frenética excitación anormal.

Su proveedor de atención médica querrá verlo con frecuencia mientras esté tomando fluvoxamina, especialmente al comienzo de su tratamiento. Asegúrese de asistir a todas las citas para las visitas al consultorio con su médico.

El médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando comience el tratamiento con fluvoxamina. Lea atentamente la información y consulte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda. También puede obtener la Guía del medicamento en el sitio web de la FDA: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

Independientemente de su edad, antes de tomar un antidepresivo, usted, sus padres o la persona a cargo de su cuidado deben hablar con su médico sobre los riesgos y beneficios de tratar su afección con un antidepresivo o

con otros tratamientos. También debe hablar sobre los riesgos y beneficios de no tratar su afección. Debe saber que tener depresión u otra enfermedad mental aumenta en gran medida el riesgo de que tenga tendencias suicidas. Este riesgo es mayor si usted o alguien de su familia tiene o alguna vez ha tenido trastorno bipolar (estado de ánimo que cambia de depresión a excitación anormal) o manía (estado de ánimo frenético, anormalmente excitado) o ha pensado o intentado suicidarse. Hable con su médico acerca de su condición, síntomas e historial médico personal y familiar. Usted y su médico decidirán qué tipo de tratamiento es adecuado para usted.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La fluvoxamina se usa para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo (pensamientos molestos que no desaparecen y la necesidad de realizar ciertas acciones una y otra vez) y el trastorno de ansiedad social (miedo extremo de interactuar con otros o actuar frente a otros que interfiere con el normal la vida). La fluvoxamina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Actúa aumentando la cantidad de serotonina, una sustancia natural del cerebro que ayuda a mantener el equilibrio mental.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La fluvoxamina viene envasada en tabletas y cápsulas de liberación prolongada para tomar por vía oral. La tableta generalmente se toma una vez al día a la hora de acostarse o dos veces al día, una por la mañana y otra a la hora de acostarse. La cápsula de liberación prolongada por lo general se toma, con o sin alimentos, una vez al día a la hora de acostarse. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la fluvoxamina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

Trague las cápsulas de liberación prolongada enteras; no los aplastes ni los mastique.

Su médico puede comenzar con una dosis baja de fluvoxamina y aumentar gradualmente su dosis, no más de una vez por semana, dependiendo de qué tan bien funcione el medicamento para usted y los efectos secundarios que experimente.

Puede tomar varias semanas o más para que sienta el beneficio completo de la fluvoxamina. Continúe tomando fluvoxamina incluso si se siente bien. No deje de tomar fluvoxamina sin consultar a su médico. Si deja de tomar fluvoxamina repentinamente, puede experimentar síntomas de abstinencia como irritabilidad; agitación; mareo; preocupación extrema; inquietud; confusión; dolor de cabeza; cansancio; cambios de humor; dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido; o dolor, ardor, entumecimiento, hormigueo o sensaciones de "descarga eléctrica" en las manos o los pies. Tu doctor probablemente te reduzca la dosis gradualmente.

Otros usos de este medicamento

La fluvoxamina también se usa a veces para tratar la depresión. Hable con su médico acerca de los posibles riesgos de usar este medicamento para su condición.

Este medicamento a veces se prescribe para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar fluvoxamina,

- informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la fluvoxamina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de las tabletas y cápsulas de liberación prolongada de fluvoxamina. Pídale a su médico o farmacéutico una lista de los ingredientes..
- Informe a su médico si está tomando alosetrón (Lotronex), pimozida (Orap), ramelteón (Rozerem), tizanidina (Zanaflex) o tioridazina. Su médico probablemente le indicará que no tome fluvoxamina.
- informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos o si dejó de tomarlos en los últimos 14 días: inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO) como isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), azul de metileno; fenelzina (Nardil), rasagilina (Azilect), selegilina (Emsam, Zelapar) y tranilcipromina (Parnate). Su médico probablemente le indicará que no tome fluvoxamina. Si deja de tomar fluvoxamina, debe esperar al menos 14 días antes de comenzar a tomar un inhibidor de la MAO.
- informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre y qué vitaminas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de los siguientes: alprazolam (Xanax); anfetaminas; anticoagulantes ('diluyentes de la sangre') como warfarina (Coumadin); aspirina o productos que contienen aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno (Advil, Motrin) y naproxeno (Aleve, Naprosyn); bloqueadores beta como metoprolol (Lopressor, Toprol) y propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); buspirona; carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol, otros); clozapina (Clozaril, Versacloz); ciclosporina (Neoral, Sandimmune); dextrometorfano (en medicamentos para la tos); diazepam (Valium, Valtoco); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, otros); diuréticos ('píldoras de agua'); fentanilo (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, otros); haloperidol (Haldol); ketoconazol; litio (Lithobid); medicamentos para las migrañas como almotriptán (Axert), eletriptán (Relpax), frovatriptán (Frova), naratriptán, rizatriptán (Maxalt), sumatriptán (Imitrex) y zolmitriptán (Zomig); metadona (Methadose); mexiletina; metoclopramida; midazolam (Seizalam); omeprazol (Prilosec, Zegerid); otros medicamentos para la ansiedad, depresión o enfermedad mental; fenitoína (Dilantin, Phenytek); tacrina (Cognex); teofilina (Theo-24, Theochron); tramadol (Conzip, Qdolo, Ultram, en Ultracet); triazolam (Halción); y quinidina. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con la fluvoxamina, así que asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando.
- dígame a su médico qué productos herbales y suplementos nutricionales está tomando, especialmente productos que contienen hierba de San Juan y triptófano.
- Informe a su médico si bebe o alguna vez ha bebido grandes cantidades de alcohol o ha consumido drogas ilegales o ha abusado de medicamentos recetados. Informe también a su médico si ha tenido recientemente un ataque al corazón, si tiene niveles bajos de sodio en la sangre; o si tiene o alguna vez ha tenido problemas de sangrado; convulsiones; o enfermedad cardíaca, renal o hepática.
- informe a su médico si está embarazada, especialmente si está en los últimos meses de su embarazo, o si planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada mientras toma fluvoxamina, llame a su médico. La fluvoxamina puede causar problemas en los recién nacidos después del parto si se toma durante los últimos meses del embarazo.
- Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando fluvoxamina.
- Debe saber que este medicamento puede causarle somnolencia o afectar su juicio, pensamiento o habilidades motoras. No conduzca un automóvil ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento.
- recuerde que el alcohol puede aumentar la somnolencia causada por este medicamento. No debe beber alcohol mientras toma fluvoxamina.

- Informe a su médico si usa productos de tabaco. Fumar cigarrillos puede disminuir la eficacia de este medicamento.
- Debe saber que la fluvoxamina puede causar glaucoma de ángulo cerrado (una afección en la que el líquido se bloquea repentinamente y no puede fluir fuera del ojo, lo que provoca un aumento rápido y grave de la presión ocular que puede conducir a la pérdida de la visión). Hable con su médico acerca de hacerse un examen de la vista antes de comenzar a tomar este medicamento. Si tiene náuseas, dolor en los ojos, cambios en la visión, como ver anillos de colores alrededor de las luces e hinchazón o enrojecimiento en o alrededor del ojo, llame a su médico o busque tratamiento médico de emergencia de inmediato.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es casi la hora de su próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario regular de dosificación. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La fluvoxamina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

- somnolencia
- boca seca
- náuseas
- vómitos
- Diarrea
- dolor de estómago
- constipación
- indigestión
- gas
- cambio de gusto
- congestión nasal
- disminución del apetito
- transpiración
- dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
- pérdida de peso
- nerviosismo

- problemas sexuales en los hombres; disminución del deseo sexual, incapacidad para lograr o mantener una erección, o eyaculación tardía o ausente
- problemas sexuales en las mujeres; disminución del deseo sexual, orgasmo retrasado o incapacidad para tener un orgasmo

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, o los enumerados en las secciones ADVERTENCIA IMPORTANTE o PRECAUCIONES ESPECIALES, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

- mareo
- fiebre, sudoración, confusión, latidos cardíacos rápidos o irregulares y rigidez o espasmos musculares severos, agitación, alucinaciones, pérdida de coordinación, náuseas, vómitos o diarrea
- dolor, ardor, entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies
- temblor de una parte del cuerpo que no puede controlar
- dolor de cabeza
- dificultad para concentrarse
- dificultad para concentrarse, problemas de memoria o confusión
- debilidad
- inestabilidad
- erupción
- urticaria
- hinchazón de los ojos, la cara, los labios, la lengua o la garganta
- respiración lenta o difícil
- convulsiones
- pérdida de consciencia
- sangrado o moretones inusuales
- nariz sangrante
- vomitar sangre o un material que parece café molido
- sangre roja en las heces o heces negras y alquitranadas

La fluvoxamina puede disminuir el apetito y causar pérdida de peso en los niños. El médico de su hijo observará atentamente su crecimiento. Hable con el médico de su hijo si tiene inquietudes sobre el crecimiento o el peso de su hijo mientras toma este medicamento. Hable con el médico de su hijo sobre los riesgos de darle fluvoxamina a su hijo.

La fluvoxamina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o por teléfono (1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a temperatura ambiente y lejos del exceso de calor y humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

En caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en línea en <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir:

- somnolencia
- agitación, alucinaciones, fiebre, sudoración, confusión, latidos cardíacos rápidos, escalofríos, rigidez o espasmos musculares severos, pérdida de coordinación, náuseas, vómitos o diarrea
- cansancio excesivo
- mareo
- agitación
- manía
- convulsiones
- pérdida de consciencia

¿Qué otra información debo saber?

Es importante asistir a todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar su respuesta a la fluvoxamina.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

- LUVOX®
- Luvox®RC

Última revisión - 15/01/2022

[Aprende a citar esta página](#)



[Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud, Inc. Descargo de responsabilidad](#)

SAIA®Información sobre la medicación del paciente™. © Copyright, 2022. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Reservados todos los derechos. Duplicación para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud

Última actualización de la página: 25 de marzo de 2022