



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Fluvoxamin

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

Fluvoxamin

uttalas som (floo vox' a meen)

VIKTIG VARNING:

Ett litet antal barn, tonåringar och unga vuxna (upp till 24 år) som tog antidepressiva läkemedel ("humörhöjningar") som fluvoxamin under kliniska studier blev suicidala (tänker på att skada eller ta livet av sig själv eller planera eller försöka göra det). Barn, tonåringar och unga vuxna som tar antidepressiva läkemedel för att behandla depression eller andra psykiska sjukdomar kan vara mer benägna att bli suicidala än barn, tonåringar och unga vuxna som inte tar antidepressiva medel för att behandla dessa tillstånd. Experter är dock inte säkra på hur stor denna risk är och hur mycket den bör beaktas när man beslutar om ett barn eller en tonåring ska ta ett antidepressivt läkemedel.

Du bör veta att din mentala hälsa kan förändras på oväntade sätt när du tar fluvoxamin eller andra antidepressiva medel även om du är vuxen över 24 år. Du kan bli självmordsbenägen, särskilt i början av din behandling och varje gång din dos ökas eller minskas. Du, din familj eller din vårdgivare bör kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom: ny eller förvärrad depression; tänker på att skada eller ta livet av dig själv, eller planerar eller försöker göra det; extrem oro; agitation; panikattacker; svårt att somna eller att sova; aggressivt beteende; irritabilitet; agerar utan att tänka; svår rastlöshet; och frenesi onormal spänning.

Din vårdgivare kommer att vilja träffa dig ofta medan du tar fluvoxamin, särskilt i början av din behandling. Var noga med att hålla alla möten för kontorsbesök med din läkare.

Läkaren eller apotekspersonalen kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när du påbörjar behandling med fluvoxamin. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också få medicinguiden från FDA:s webbplats:<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

Oavsett din ålder, innan du tar ett antidepressivt läkemedel bör du, din förälder eller din vårdgivare prata med din läkare om riskerna och fördelarna med att behandla ditt tillstånd med ett antidepressivt medel eller

med andra behandlingar. Du bör också prata om riskerna och fördelarna med att inte behandla ditt tillstånd. Du bör veta att att ha depression eller annan psykisk sjukdom ökar risken för att du blir självmordsbenägen avsevärt. Denna risk är högre om du eller någon i din familj har eller någonsin har haft bipolär sjukdom (humör som förändras från deprimerad till onormalt upphetsad) eller mani (frenziert, onormalt upphetsat humör) eller har funderat på eller försökt begå självmord. Tala med din läkare om ditt tillstånd, symtom och personlig och familjemedicinsk historia. Du och din läkare kommer att bestämma vilken typ av behandling som är rätt för dig.

hur är denna medicin utskriven?

Fluvoxamin används för att behandla tvångssyndrom (besvärande tankar som inte försvinner och behovet av att utföra vissa handlingar om och om igen) och social ångeststörning (extrem rädsla för att interagera med andra eller att prestera inför andra som stör det normala liv). Fluvoxamin är i en klass av läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det fungerar genom att öka mängden serotonin, ett naturligt ämne i hjärnan som hjälper till att upprätthålla mental balans.

hur ska detta läkemedel användas?

Fluvoxamin kommer som en tablett och en kapsel med förlängd frisättning att ta genom munnen. Tabletten tas vanligtvis antingen en gång dagligen vid sänggåendet eller två gånger dagligen, en gång på morgonen och en gång vid sänggåendet. Kapseln med förlängd frisättning tas vanligtvis, med eller utan mat, en gång dagligen vid sänggåendet. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta fluvoxamin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj kapslarna med förlängd frisättning hela; krossa eller tugga dem inte.

Din läkare kan börja med en låg dos av fluvoxamin och gradvis öka din dos, inte oftare än en gång i veckan, beroende på hur väl medicinen fungerar för dig och de biverkningar du upplever.

Det kan ta flera veckor eller längre för dig att känna full nytta av fluvoxamin. Fortsätt att ta fluvoxamin även om du mår bra. Sluta inte ta fluvoxamin utan att prata med din läkare. Om du plötsligt slutar ta fluvoxamin kan du uppleva abstinenssymtom som irritabilitet; agitation; yrsel; extrem oro; oro; förvirring; huvudvärk; trötthet; humörförändringar; svårt att somna eller att sova; eller smärta, sveda, domningar, stickningar eller "elektrisk chock"-känsla i händer eller fötter. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos gradvis.

användningsområdena för detta läkemedel

Fluvoxamin används också ibland för att behandla depression. Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar fluvoxamin,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot fluvoxamin, andra mediciner eller något av innehållsämnen i fluvoxamin-tabletter och förlängda kapslar. Fråga din läkare eller apotekspersonal om en lista över ingredienserna..
- berätta för din läkare om du tar alosetron (Lotronex), pimozid (Orap), ramelteon (Rozerem), tizanidin (Zanaflex) eller tioridazin. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta fluvoxamin.
- tala om för din läkare om du tar följande mediciner eller om du har slutat ta dem inom de senaste 14 dagarna: monoaminoxidas (MAO)-hämmare som isokarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metylenblått; fenelzin (Nardil), rasagilin (Azilect), selegilin (Emsam, Zelapar) och tranylcypromin (Parnate). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta fluvoxamin. Om du slutar ta fluvoxamin bör du vänta minst 14 dagar innan du börjar ta en MAO-hämmare.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel och vitaminer du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: alprazolam (Xanax); amfetamin; antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin); aspirin eller aspirininnehållande produkter och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, Naprosyn); betablockerare såsom metoprolol (Lopressor, Toprol) och propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); buspiron; karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andra); klozapin (Clozaril, Versacloz); cyklosporin (Neoral, Sandimmun); dextrometorfan (i hostmediciner); diazepam (Valium, Valtoco); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, andra); diuretika ('vattenpiller'); fentanyl (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, andra); haloperidol (Haldol); ketokonazol; litium (Lithobid); mediciner för migränhuvudvärk såsom almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan, rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) och zolmitriptan (Zomig); metadon (metados); mexiletin; metoklopramid; midazolam (Seizalam); omeprazol (Prilosec, Zegerid); andra mediciner för ångest, depression eller psykisk sjukdom; fenytoin (Dilantin, Phenytek); takrin (Cognex); teofyllin (Theo-24, Theochron); tramadol (Conzip, Qdolo, Ultram, i Ultracet); triazolam (Halcion); och kinidin. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med fluvoxamin, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar,
- berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter och kosttillskott du tar, särskilt produkter som innehåller johannesört och tryptofan.
- tala om för din läkare om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder alkohol eller har använt gatudroger eller har använt för mycket receptbelagda läkemedel. Tala även om för din läkare om du nyligen har haft en hjärtattack, om du har låga natriumnivåer i blodet; eller om du har eller någonsin har haft blödningsproblem; anfall; eller hjärt-, njur- eller leversjukdom.
- tala om för din läkare om du är gravid, särskilt om du är under de sista månaderna av graviditeten, eller om du planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du tar fluvoxamin, kontakta din läkare. Fluvoxamin kan orsaka problem hos nyfödda efter förlossningen om det tas under de sista månaderna av graviditeten.
- om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar fluvoxamin.
- du bör veta att denna medicin kan göra dig dåsig eller påverka ditt omdöme, ditt tänkande eller din motorik. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.
- kom ihåg att alkohol kan öka dåsigheten som orsakas av denna medicin. Du bör inte dricka alkohol medan du tar fluvoxamin.

- tala om för din läkare om du använder tobaksprodukter. Cigarettrökning kan minska effektiviteten av denna medicin.
- du bör veta att fluvoxamin kan orsaka glaukom med stängningsvinkel (ett tillstånd där vätskan plötsligt blockeras och inte kan rinna ut ur ögat vilket orsakar en snabb, kraftig ökning av ögontrycket som kan leda till synförlust). Tala med din läkare om att få en synundersökning innan du börjar ta detta läkemedel. Om du har illamående, ögonsmärter, synförändringar, som att se färgade ringar runt lampor och svullnad eller rodnad i eller runt ögat, ring din läkare eller få akut medicinsk behandling omedelbart.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Fluvoxamin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- dåsighet
- torr mun
- illamående
- kräkningar
- diarre
- magont
- förstoppning
- dålig matsmältning
- gas
- förändring i smak
- Täppt i näsan
- minskad aptit
- svettas
- svårt att somna eller att sova
- viktninskning
- nervositet

- sexuella problem hos män; minskad sexlust, oförmåga att få eller behålla erektion eller försenad eller utebliven utlösning
- sexuella problem hos kvinnor; minskad sexlust, försenad orgasm eller oförmåga att få orgasm

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, eller de som anges i avsnitten VIKTIG VARNING eller SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

- yrsel
- feber, svettning, förvirring, snabba eller oregelbundna hjärtslag och svår muskelstelhet eller ryckningar, agitation, hallucinationer, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré
- smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter
- skakning av en del av kroppen som du inte kan kontrollera
- huvudvärk
- koncentrationssvårigheter
- koncentrationssvårigheter, minnesproblem eller förvirring
- svaghet
- ostadighet
- utslag
- nässelfeber
- svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga eller svalg
- långsam eller svår andning
- anfall
- förlust av medvetande
- ovanlig blödning eller blåmärken
- blodig näsa
- kräks blod eller ett material som ser ut som kaffesump
- rött blod i avföring eller svart och tjärartad avföring

Fluvoxamin kan minska aptiten och orsaka viktninskning hos barn. Ditt barns läkare kommer att följa hans eller hennes tillväxt noggrant. Tala med ditt barns läkare om du är orolig för ditt barns tillväxt eller vikt medan han eller hon tar denna medicin. Tala med ditt barns läkare om riskerna med att ge ditt barn fluvoxamin.

Fluvoxamin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) eller per telefon (1-800-332-1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

- dåsighet
- agitation, hallucinationer, feber, svettning, förvirring, snabba hjärtslag, frossa, kraftig muskelstelhet eller ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré
- överdriven trötthet
- yrsel
- agitation
- mani
- anfall
- förlust av medvetande

hat annan information bör jag veta?

Det är viktigt att hålla alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera ditt svar på fluvoxamin.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Luvox®
- Luvox®CR

Senast reviderad - 2022-01-15

[Lär dig hur du citerar den här sidan](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS®Patientmedicineringinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022