

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

## فلوفوكسامين تنطق (floo vox 'a meen)

### تحذير هام:

أصبح عدد قليل من الأطفال والمراهقين والشباب (حتى سن 24 عاماً) الذين تناولوا مضادات الاكتئاب (رفع الحالة المزاجية) مثل فلوفوكسامين أثناء الدراسات السريرية انتحاراً (التفكير في إيذاء النفس أو قتلها أو التخطيط أو محاولة القيام بذلك). قد يكون الأطفال والمراهقون والشباب الذين يتناولون مضادات الاكتئاب لعلاج الاكتئاب أو غيره من الأمراض العقلية أكثر عرضة للانتحار من الأطفال والمراهقين والشباب الذين لا يتناولون مضادات الاكتئاب لعلاج هذه الحالات. ومع ذلك، فإن الخبراء ليسوا متأكدين من مدى خطورة هذا الخطر ومقدار ما يجب أخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب على الطفل أو المراهق تناول مضادات الاكتئاب.

يجب أن تعلم أن صحتك العقلية قد تتغير بطرق غير متوقعة عند تناول فلوفوكسامين أو مضادات الاكتئاب الأخرى حتى لو كنت بالغاً يزيد عمرك عن 24 عاماً. قد تصبح ميولاً إلى الانتحار، خاصة في بداية العلاج وفي أي وقت تزيد فيه جرعتك أو تنقص. يجب عليك أنت أو عائلتك أو مقدم الرعاية الخاص بك الاتصال بطبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية: اكتئاب جديد أو تفاقم؛ التفكير في إيذاء أو قتل نفسك، أو التخطيط أو محاولة القيام بذلك؛ قلق شديد وإثارة. نوبات زعر؛ صعوبة في النوم أو البقاء نائماً؛ سلوك عدواني التهيج؛ يتصرف بدون تفكير الأرق الشديد وإثارة مسعورة غير طبيعية.

سيرغب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في رؤيتك كثيراً أثناء تناولك فلوفوكسامين، خاصة في بداية علاجك. تأكد من الاحتفاظ بجميع المواعيد لزيارات العيادة مع طبيبك.

سيعطيك الطبيب أو الصيدلي ورقة معلومات المريض الخاصة بالشركة المصنعة (دليل الدواء) عندما تبدأ العلاج بفلوفوكسامين. اقرأ المعلومات بعناية واسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة. يمكنك أيضاً الحصول على دليل الدواء من موقع الويب الخاص بإدارة الغذاء والدواء: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> ]<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>

بغض النظر عن عمرك، قبل تناول مضادات الاكتئاب، يجب عليك أنت أو والدك أو مقدم الرعاية الخاص بك التحدث إلى طبيبك حول مخاطر وفوائد علاج حالتك بمضاد للاكتئاب أو

مع علاجات أخرى. يجب أن تتحدث أيضاً عن مخاطر وفوائدهم عدم معالجة حالتك. يجب أن تعلم أن الإصابة بالاكتئاب أو أي مرض عقلي آخر يزيد بشكل كبير من خطر أن تصبح انتحارياً. يكون هذا الخطر أعلى إذا كنت أنت أو أي شخص في عائلتك مصاباً أو سبق أن عانيت من اضطراب ثنائي القطب (الحالة المزاجية التي تتغير من الاكتئاب إلى الإثارة بشكل غير طبيعي) أو الهوس (الحالة المزاجية المسعورة والمثيرة بشكل غير طبيعي) أو إذا فكرت أو حاولت الانتحار. تحدث إلى طبيبك عن حالتك وأعراضك وتاريخك الطبي الشخصي والعائلي. ستقرر أنت وطبيبك نوع العلاج المناسب لك.

## لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم فلوفوكسامين لعلاج اضطراب الوسواس القهري (الأفكار المزعجة التي لن تختفي والحاجة إلى القيام بأفعال معينة مراراً وتكراراً) واضطراب القلق الاجتماعي (الخوف الشديد من التفاعل مع الآخرين أو الأداء أمام الآخرين الذي يتعارض مع الوضع الطبيعي للحياة). ينتمي Fluvoxamine إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs). وهو يعمل عن طريق زيادة كمية السيروتونين ، وهي مادة طبيعية في الدماغ تساعد في الحفاظ على التوازن العقلي.

## كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي Fluvoxamine على شكل قرص وكبسولة ممتدة المفعول ليأخذها عن طريق الفم. عادة ما يتم تناول الجهاز اللوحي إما مرة واحدة يومياً في وقت النوم أو مرتين يومياً ، مرة في الصباح ومرة في وقت النوم. عادة ما يتم تناول الكبسولة الممتدة المفعول مع الطعام أو بدونه مرة واحدة يومياً في وقت النوم. اتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. خذ فلوفوكسامين بالضبط حسب التوجيهات. لا تأخذ أكثر أو أقل منه أو تناوله أكثر مما وصفه طبيبك.

ابتلاع الكبسولات الممتدة المفعول بالكامل ؛ لا سحقهم أو تمضغهم.

قديداً طبيبك بجرعة منخفضة من فلوفوكسامين ويزيد جرعتك تدريجياً ، ليس أكثر من مرة واحدة كل أسبوع ، اعتماداً على مدى نجاح الدواء بالنسبة لك والآثار الجانبية التي تواجهها.

قد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أكثر حتى تشعر بالفائدة الكاملة من فلوفوكسامين. استمر في تناول فلوفوكسامين حتى لو كنت تشعر جيداً. لا تتوقف عن تناول فلوفوكسامين دون التحدث مع طبيبك. إذا توقفت فجأة عن تناول فلوفوكسامين ، فقد تواجه أعراض انسحاب مثل التهيج. إثارة. دوخة؛ قلق شديد القلق. ارتباك؛ صداع الراس؛ التعب. تغيرات في المزاج؛ صعوبة في النوم أو البقاء نائماً ؛ أو الشعور بالألم أو حرقة أو تنميل أو وخز أو "صدمة كهربائية" في اليدين أو القدمين. طبيبك من المحتمل أن تقلل الجرعة تدريجياً.

## هناك استخدامات لهذا الدواء

يستخدم Fluvoxamine أيضاً في بعض الأحيان لعلاج الاكتئاب. تحدث مع طبيبك حول المخاطر المحتملة لاستخدام هذا الدواء لحالتك.

يوصف هذا الدواء أحياناً لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

## قبعة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

### قبل تناول فلوفوكسامين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من فلوفوكسامين ، أو أي أدوية أخرى ، أو أي من مكونات أقراص فلوفوكسامين وكبسولات ممتدة المفعول. اسأل طبيبك أو الصيدلي عن قائمة المكونات ..
- أخبر طبيبك إذا كنت تتناول (Lotronex) (alosecron أو Orap) (pimozide أو Rozerem) (ramelteon أو Zanaflex) (tizanidine أو thioridazine). من المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم تناول فلوفوكسامين.
- أخبر طبيبك إذا كنت تتناول الأدوية التالية أو إذا توقفت عن تناولها خلال الـ 14 يوماً الماضية: مثبطات مونامين أو أكسيديز (MAO) مثل (methylene blue ، Zyxov) (linezolid ، Marplan) (isocarboxazid ؛ فينيلزين (نارديل) ، راساجيلين (أزيلكت) ، سيليجيلين (إمسام ، زيلابار) ، وتراينيلسيبرومين (بارنات). من المحتمل أن يخبرك طبيبك بعدم تناول فلوفوكسامين. إذا توقفت عن تناول فلوفوكسامين ، يجب أن تنتظر 14 يوماً على الأقل قبل أن تبدأ في تناول مثبط MAO.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: ألبرازولام (زاناكس) ؛ الأمفيتامينات. مضادات التخثر (مميعات الدم) مثل الوارفارين (الكومادين) ؛ الأسبرين أو الأسبرين الذي يحتوي على المنتجات وغيرها من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل إيبوبروفين (أدفييل ، موتزين) ونابروكسين (أليف ، نابروسين) ؛ حاصرات بيتا مثل ميتوبرولول (لوبريسور ، توبرول) وبروبرانولول (هيمانجول ، إندرال ، إينوبران) ؛ بوسبيرون. كاربامازيبين (كارباتول ، إيكيترو ، تيجريتول ، وغيرها) ؛ كلوزابين (كلوزاريل ، فيساكلوز) ؛ السيكلوسبورين (نيورال ، سانديموني) ؛ ديكستروميثورفان (في أدوية السعال) ؛ ديازيبام (فاليوم ، فالتوكو) ؛ ديلتيازيم (كارديزيم ، كارتيا ، تيازاك ، آخرون) ؛ مدرات البول (حبوب الماء) ؛ الفنتانيل (أبسترال ، أكتيك ، فينتورا ، أنسوليس ، الآخريين) ؛ هالوبيريديول (هالدول) ؛ الكيتوكونازول. الليثيوم (ليثويد) ؛ أدوية الصداع النصفي مثل ألموتريبتان (أكسيرت) وإلتربتان (ريلباكس) وفروفاتريبتان (فروفا) وناراتريبتان وريزاتريبتان (ماكسالت) وسوماتريبتان (إيميتريكس) وزولميتربتان (زوميفغ) ؛ الميثادون (الميثادوز) ؛ ميكسليتتين. ميتوكلوبراميد. ميدازولام (سيزلام) ؛ أوميفرازول (بريلوسيك ، زيجيريد) ؛ أدوية أخرى للقلق أو الاكتئاب أو المرض العقلي ؛ الفينيتوين (ديلانتين ، فينيتيك) ؛ تاكرين (كوجنيكس) ؛ الثيوفيلين (ثيو 24 ، ثيوكرون) ؛ ترامادول (Ultram ، Qdolo ، Conzip ، في Ultracet) ؛ تريازولام (هالسيون) ؛ والكينيدين. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية. قد تتفاعل العديد من الأدوية الأخرى أيضاً مع فلوفوكسامين ، لذا تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها ،
- أخبر طبيبك عن المنتجات العشبية والمكملات الغذائية التي تتناولها ، وخاصة المنتجات التي تحتوي على نبتة سانت جون والتريبتوفان.
- أخبر طبيبك إذا كنت تشرب أو سبق لك أن شربت كميات كبيرة من الكحول أو تعاطيت المخدرات في الشوارع أو تناولت الأدوية الموصوفة بشكل مفرط. أخبر طبيبك أيضاً إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية مؤخراً ، إذا كان لديك مستويات منخفضة من الصوديوم في الدم ؛ أو إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل النزيف ؛ النوبات ؛ أو أمراض القلب أو الكلى أو الكبد.
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً ، خاصة إذا كنت في الأشهر القليلة الأخيرة من الحمل ، أو إذا كنت تخطين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول فلوفوكسامين ، فاتصل بطبيبك. قد يسبب Fluvoxamine مشاكل عند الأطفال حديثي الولادة بعد الولادة إذا تم تناوله خلال الأشهر الأخيرة من الحمل.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تتناول فلوفوكسامين.
- يجب أن تعلم أن هذا الدواء قد يجعلك تشعر بالنعاس أو يؤثر على حكمك أو تفكيرك أو مهاراتك الحركية. لا تقود السيارة أو تشغل الآلات حتى تعرف كيف يؤثر هذا الدواء عليك.
- تذكر أن الكحول يمكن أن يزيد من النعاس الذي يسببه هذا الدواء. يجب ألا تشرب الكحول أثناء تناول فلوفوكسامين.

• أخبر طبيبك إذا كنت تستخدم منتجات التبغ. قد يقلل تدخين السجائر من فعالية هذا الدواء.

• يجب أن تعلم أن فلوفوكسامين قد يسبب زرق انسداد الزاوية (حالة يتم فيها انسداد السائل فجأة وعدم القدرة على التدفق خارج العين مما يؤدي إلى زيادة سريعة وشديدة في ضغط العين مما قد يؤدي إلى فقدان الرؤية). تحدث إلى طبيبك حول إجراء فحص للعين قبل البدء في تناول هذا الدواء. إذا كنت تعاني من غثيان وألم في العين وتغيرات في الرؤية ، مثل رؤية حلقات ملونة حول الأضواء وتورم أو احمرار في العين أو حولها ، فاتصل بطبيبك أو احصل على علاج طبي طارئ على الفور.

## قبة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

## قبة يجب أن أفعالها إذا نسيت جرعة؟

خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها. ومع ذلك ، إذا حان الوقت تقريباً للجرعة التالية ، فتجاوز الجرعة الفائتة واستمر في جدول الجرعات المعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

## الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب فلوفوكسامين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- النعاس
- فم جاف
- غثيان
- التقيؤ
- إسهال
- آلام في المعدة
- إمساك
- عسر الهضم
- غاز
- تغيير في الذوق
- انسداد الأنف
- قلة الشهية
- التعرق
- صعوبة في النوم أو البقاء نائماً
- فقدان الوزن
- العصبية

- مشاكل جنسية عند الذكور. انخفاض الدافع الجنسي ، وعدم القدرة على الانتصاب أو الحفاظ عليه ، أو تأخير القذف أو غيابه
  - مشاكل جنسية عند الإناث. انخفاض الدافع الجنسي ، أو تأخر النشوة الجنسية أو عدم القدرة على الوصول إلى النشوة الجنسية
- بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية ، أو تلك المذكورة في قسم تحذير هام أو احتياطات خاصة ، فاتصل بطبيبك على الفور أو احصل على علاج طبي طارئ:**

- دوخة

- الحمى ، والتعرق ، والارتباك ، وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها ، وتصلب العضلات الشديد أو الوخز ، والإثارة ، والهلوسة ، وفقدان التنسيق ، والغثيان ، والقيء ، أو الإسهال

- ألم أو حرقة أو تميل أو وخز في اليدين أو القدمين

- اهتزاز جزء من الجسم لا يمكنك التحكم فيه

- صداع الراس

- صعوبة في التركيز

- صعوبة في التركيز أو مشاكل في الذاكرة أو ارتباك

- ضعف

- عدم الثبات

- متسرع

- قشعريرة

- تورم في العينين أو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق

- تباطؤ أو صعوبة في التنفس

- النوبات

- فقدان الوعي

- نزيف أو كدمات غير عادية

- الأنف الدامي

- يتقيأ الدم أو مادة تشبه القهوة

- دم أحمر في البراز أو براز أسود وقطري

قد يقلل Fluvoxamine الشهية ويسبب فقدان الوزن عند الأطفال. سيراقب طبيب طفلك نموه بعناية. تحدث إلى طبيب طفلك إذا كانت لديك مخاوف بشأن نمو طفلك أو وزنه أثناء تناول هذا الدواء. تحدث إلى طبيب طفلك حول مخاطر إعطاء فلوفوكسامين لطفلك.

قد يسبب Fluvoxamine آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء تناول هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من آثار جانبية خطيرة ، فيمكنك أنت أو طبيبك إرسال تقرير إلى برنامج MedWatch للإبلاغ عن الأحداث الضائرة عبر الإنترنت التابع لإدارة الغذاء والدواء (FDA).

[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch] أو عبر الهاتف (1-800-332-1088).

## قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

احتفظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام).

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغطية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. [http://www.upandaway.org] [http://www.upandaway.org]

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراحيض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء [http://goo.gl/c4Rm4p] [http://goo.gl/c4Rm4p]. لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

## ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقافه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

## قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

- النعاس
- هياج ، هلوسة ، حمى ، تعرق ، ارتباك ، ضربات قلب سريعة ، رجفة ، تصلب عضلي شديد أو ارتعاش ، فقدان التنسيق ، غثيان ، قيء ، أو إسهال
- التعب المفرط
- دوخة
- الإثارة
- هوس
- النوبات
- فقدان الوعي

## قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

من المهم الاحتفاظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابتك لفلوفوكسامين.

لاتدع أي شخص آخر يأخذ دوائك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

## أسماء راند

- لوفوكس®
- لوفوكس® سجل تجاري

آخر مراجعة - 15/01/2022

[تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة](#)



### إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS® معلومات الدواء المريض™. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway، Suite 900، Bethesda، Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike، Bethesda، MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022