



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[บ้าน](#) → [ยา สมุนไพรและอาหารเสริม](#) → ฟลูโวซามีน

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ของหน้านี้: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

ฟลูโวซามีน

ออกเสียงว่า (floo vox 'a meen)

คำเตือนที่สำคัญ:

เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่จำนวนน้อย (อายุไม่เกิน 24 ปี) ที่ทานยาแก้ซึมเศร้า ('เครื่องช่วยอารมณ์') เช่น fluvoxamine ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกกลายเป็นการฆ่าตัวตาย (คิดเกี่ยวกับการทำร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทำเช่นนั้น). เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่ใช้ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิตอื่นๆ อาจมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าเด็ก วัยรุ่น และคนหนุ่มสาวที่ไม่ใช่ยาซึมเศร้าเพื่อรักษาอาการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าความเสี่ยงนี้มีมากเพียงใด และควรพิจารณาอย่างน้อยเพียงใดในการตัดสินใจว่าเด็กหรือวัยรุ่นควรใช้ยากล่อมประสาทหรือไม่

คุณควรรู้ว่าสุขภาพจิตของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณทานฟลูโวซามีนหรือยาแก้ซึมเศร้าอื่นๆ แม้ว่า你会เป็นผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 24 ปีก็ตาม คุณอาจฆ่าตัวตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษาและทุกครั้งที่คุณเพิ่มหรือลดขนาดยา คุณ ครอบครั หรือผู้ดูแลควรโทรหาแพทย์ทันที หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้: ภาวะซึมเศร้าใหม่หรือแย่ลง คิดที่จะทำร้ายหรือฆ่าตัวตายหรือวางแผนหรือพยายามทำเช่นนั้น กังวลมาก; ความปั่นป่วน; การโจมตีเสียวขวัญ; นอนหลับยากหรือหลับยาก พฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิด; กระทำโดยไม่ได้คิด; กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง และความตื่นเต้นอย่างบ้าคลั่ง

ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะต้องการพบคุณบ่อยๆ ในขณะที่คุณรับประทานฟลูโวซามีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการรักษา อย่าลืมนัดพบแพทย์ทุกครั้งเพื่อเข้ารับการตรวจที่สำนักงาน

แพทย์หรือเภสัชกรจะให้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยของผู้ผลิต (คู่มือการใช้ยา) เมื่อคุณเริ่มการรักษาด้วยฟลูโวซามีน อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ คุณสามารถขอรับคู่มือการใช้ยาได้จากเว็บไซต์ของ FDA: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

ไม่ว่าคุณจะทำอายุเท่าไร ก่อนที่คุณจะใช้ยากล่อมประสาท คุณ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลของคุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการรักษาสุขภาพของคุณด้วยยากล่อมประสาทหรือ

กับการรักษาอื่นๆ คุณควรพูดถึงความเสี่ยงและประโยชน์ของการไม่รักษาอาการของคุณ คุณควรรู้ว่าภาวะซึมเศร้าหรือความเจ็บป่วยทางจิตอื่นๆ จะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะฆ่าตัวตายได้อย่างมาก ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นหากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวของคุณมีหรือเคยเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (อารมณ์ที่เปลี่ยนจากซึมเศร้าเป็นตื่นเต้นผิดปกติ) หรือคลุ้มคลั่ง (อารมณ์แปรปรวน ตื่นเต้นผิดปกติ) หรือเคยคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับสภาพ อาการ และประวัติทางการแพทย์ส่วนบุคคลและของครอบครัว คุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคุณ

hy เป็นยานี้กำหนด?

Fluvoxamine ใช้ในการรักษาโรคย้ำคิดย้ำทำ (ความคิดที่น่ารำคาญที่จะไม่หายไปและความจำเป็นในการดำเนินการบางอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีก) และโรควิตกกังวลทางสังคม (กลัวมากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือแสดงต่อหน้าผู้อื่นที่รบกวนการทำงานปกติชีวิต). Fluvoxamine อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) มันทำงานโดยการเพิ่มปริมาณของเซโรโทนินซึ่งเป็นสารธรรมชาติในสมองที่ช่วยรักษาสมดุลของจิตใจ

ควรจะใช้ยานี้หรือไม่?

Fluvoxamine มาในรูปแบบแท็บเล็ตและแคปซูลแบบขยายเพื่อรับประทานทางปาก แท็บเล็ตมักใช้วันละครั้งก่อนนอนหรือวันละสองครั้งในตอนเช้าและก่อนนอน โดยปกติแล้ว แคปซูลแบบขยายระยะเวลาจะรับประทาน โดยมีหรือไม่มีอาหาร วันละครั้งก่อนนอน ปฏิบัติตามคำแนะนำนำบนฉลากยาอย่างระมัดระวัง และขอให้แพทย์หรือเภสัชกรอธิบายส่วนใดส่วนหนึ่งที่คุณไม่เข้าใจทานฟลูโวซามีนให้ตรงตามที่กำกับไว้ อย่ากินมากหรือน้อยหรือใช้บ่อยกว่าที่แพทย์ของคุณกำหนด

กลืนแคปซูลแบบขยายออกทั้งหมด อย่าบดขยี้หรือเคี้ยวมัน

แพทย์ของคุณอาจเริ่มให้คุณกินยาฟลูโวซามีนในปริมาณต่ำและค่อยๆ เพิ่มขนาดยาของคุณ ไม่บ่อยกว่าสี่ปดาร์ลละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ายานั้นใช้ได้ผลสำหรับคุณและผลข้างเคียงที่คุณพบมากน้อยเพียงใด

อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือนานกว่านั้นกว่าที่คุณจะรู้สึกถึงประโยชน์เต็มที่ของฟลูโวซามีน ทานฟลูโวซามีนต่อไปแม้ว่าคุณจะรู้สึกดี อย่าหยุดทานฟลูโวซามีนโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ หากคุณหยุดทานฟลูโวซามีนโดยกะทันหัน คุณอาจพบอาการถอนยา เช่น หงุดหงิด ความปั่นป่วน; อาการวิงเวียนศีรษะ กังวลมาก; ความไม่สบายใจ; ความสับสน ปวดหัว; เหงื่อเหนียวเมื่อยล้า; การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ นอนหลับยากหรือหลับยาก หรือความเจ็บปวด แสบร้อน ชา รู้สึกเสียวซ่าหรือ 'ไฟฟ้าช็อต' ในมือหรือเท้า แพทย์ของคุณอาจจะค่อยๆ ลดขนาดยาลง

ใช้สำหรับยานี้

บางครั้งก็ใช้ Fluvoxamine เพื่อรักษาภาวะซึมเศร้า พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ยานี้สำหรับสภาพของคุณ

ยานี้บางครั้งมีกำหนดสำหรับการใช้งานอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวด ข้อควรระวังพิเศษ จันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานฟลูโอซามีน

- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฟลูออออกซามีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในยาเม็ดฟลูออออกซามีนและแคปซูล ขยายเวลารับประทาน สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับรายการส่วนผสม..
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังใช้ alosetron (Lotronex), pimozone (Orap), ramielteon (Rozerem), tizanidine (Zanaflex) หรือ thioridazine แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานฟลูโอซามีน
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณกำลังใช้ยาต่อไปนี้ หรือหากคุณหยุดใช้ยาเหล่านี้ภายใน 14 วันที่ผ่านมา: สารยับยั้ง monoamine oxidase (MAO) เช่น isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), เมทิลินบรู; ฟินเลซัน (นาร์ดีล), ราซาคิลีน (อาซิเล็ก), เซลิกิลีน (เอ็มซาม, เซลาปาร์) และทรานิลโซโพรมีน (พาร์เนก) แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าทานฟลูโอซามีน หากคุณหยุดทานฟลูโอซามีน คุณควรรออย่างน้อย 14 วันก่อนเริ่มใช้ยายับยั้ง MAO
- แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ และวิตามินที่คุณกำลังรับประทานหรือวางแผนที่จะใช้ อย่างลึ้มพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: alprazolam (Xanax); ยาบ้า; สารกันเลือดแข็ง ('เลือดทินเนอร์') เช่น warfarin (Coumadin); แอสไพรินหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอสไพรินและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่น ๆ เช่น ibuprofen (Advil, Motrin) และ naproxen (Aleve, Naprosyn); ตัวบล็อกเบต้าเช่น metoprolol (Lopressor, Toprol) และ propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); บัสไฟโซ; carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, อื่น ๆ); โคลซาปีน (Clozaril, Versacloz); โซโคลอสปอริน (Neoral, Sandimmune); dextromethorphan (ในยาแก้ไอ); โดอะซีแพม (Valium, Valtoco); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, อื่น ๆ); ยาขับปัสสาวะ ('ยาเม็ดน้ำ'); เฟลทานิล (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, คนอื่น); ฮาลโดล (Haldol); คีโตโคนาโซล; ลิเธียม (Lithobid); ยาสำหรับอาการปวดหัวไมเกรนเช่น almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan, rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) และ zolmitriptan (Zomig); เมธาโดน (เมธาโดส); เมกซิลีน; เมโทโคลพราไมด์; มิตาโซแลม (Seizalam); โปเมพราโซล (Prilosec, Zegerid); ยารักษาโรควิตกกังวล ซิมเคร้า หรืออาการป่วยทางจิตอื่นๆ ฟินิโทอิน (Dilantin, Phenytek); แกกซ์ (Cognex); ธีโอฟีลลีน (ธีโอ-24, ธีโอครอน); ทรามาโดล (Conzip, Qdolo, Ultram, ใน Ultracet); ไตรอะโซแลม (ฮาลเซียน); และควินิดีน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสำหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจำนวนมากอาจโต้ตอบกับฟลูโอซามีน ดังนั้นโปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบว่า คุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสาโทเซนต์จอห์นและทริปโตเฟน
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก หรือเคยใช้ยาข้างถนนหรือใช้ยาตามใบสั่งแพทย์มากเกินไป แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเพิ่งมีอาการหัวใจวาย หากคุณมีระดับโซเดียมในเลือดต่ำ หรือถ้าคุณมีหรือเคยมีปัญหาเลือดออก อาการชัก; หรือโรคหัวใจ ไต หรือตับ
- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณกำลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณอยู่ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะทานฟลูโอซามีน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Fluvoxamine อาจทำให้เกิดปัญหาในการรกเกิดหลังคลอดหากได้รับในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์
- หากคุณกำลังมีการผ่าตัด รวมถึงการทำฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกำลังทานฟลูโอซามีน
- คุณควรรู้ว่ายานี้อาจทำให้คุณง่วงหรือส่งผลต่อการตัดสินใจ การคิด หรือทักษะการเคลื่อนไหวของคุณ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้อาจส่งผลต่อคุณอย่างไร
- จำไว้ว่าแอลกอฮอล์สามารถเพิ่มความง่วงที่เกิดจากยานี้ได้ คุณไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่ทานฟลูโอซามีน

- แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การสูบบุหรี่อาจลดประสิทธิภาพของยานี้
- คุณควรรู้ว่า fluvoxamine อาจทำให้เกิดโรคต่อหินแบบปิดมุม (ภาวะที่ของเหลวถูกปิดกั้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถไหลออกจากตาได้ทำให้เกิดความดันตาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งอาจทำให้สูญเสียการมองเห็น) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการตรวจตาก่อนเริ่มใช้ยานี้ หากคุณมีอาการคลื่นไส้ ปวดตา การมองเห็นเปลี่ยนไป เช่น เห็นวงแหวนสีรอบๆ ดวงไฟ และบวมหรือแดงที่ดวงตาหรือรอบดวงตา ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที

ฉันควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม่?

ให้ทานอาหารตามปกติต่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทำอะไรถ้าฉันลืมยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและดำเนินการตามตารางการจ่ายยาตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยการพลาด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานีสามารถทำให้เกิดได้หรือไม่?

Fluvoxamine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

- อาการง่วงนอน
- ปากแห้ง
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย
- อาการปวดท้อง
- ท้องผูก
- อาหารไม่ย่อย
- แก๊ส
- เปลี่ยนรสชาติ
- อาการคัดจมูก
- ความอยากอาหารลดลง
- เหงื่อออก
- นอนหลับยากหรือหลับยาก
- ลดน้ำหนัก
- ความกังวลใจ

- ปัญหาทางเพศในผู้ชาย แรงขับทางเพศลดลง ไม่สามารถสร้างหรือคงการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ หรือการหลังเข้าหรือขาดหายไป
- ปัญหาทางเพศในสตรี แรงขับทางเพศลดลงหรือถึงจุดสุดยอดล่าช้าหรือไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ หรือตามที่ระบุไว้ในส่วนคำเตือนที่สำคัญหรือข้อควรระวังพิเศษ โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

- อาการเวียนศีรษะ
- มีไข้ เหงื่อออก สับสน หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ และกล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง กระสับกระส่าย ประสาทหลอน สูญเสียการประสานงาน คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องร่วง
- ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า
- การสั่นของส่วนของร่างกายที่ควบคุมไม่ได้
- ปวดหัว
- สมาธิลำบาก
- มีปัญหาในการจดจ่อ ปัญหาความจำ หรือความสับสน
- ความอ่อนแอ
- ความไม่มั่นคง
- ผื่น
- ลมพิษ
- บวมที่ตา ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือลำคอ
- หายใจช้าหรือหายใจลำบาก
- อาการชัก
- หมดสติ
- เลือดออกหรือช้ำผิดปกติ
- จมูกเป็นเลือด
- อาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ
- เลือดแดงในอุจจาระหรืออุจจาระสีดำและช้ำ

Fluvoxamine อาจลดความอยากอาหารและทำให้น้ำหนักลดลงในเด็ก แพทย์ของบุตรของท่านจะดูแลการเจริญเติบโตของบุตรอย่างระมัดระวัง พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านหากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตหรือน้ำหนักของบุตรของท่าน ในขณะที่ใช้ยานี้ พูดคุยกับแพทย์ของบุตรของท่านเกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้ฟลูโวซามีนกับบุตรของท่าน

Fluvoxamine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะที่คุณกำลังใช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทย์ของคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก MedWatch ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) หรือทางโทรศัพท์ (1-800-332-1088)

หมวก จันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกำจัดยา?

เก็บยาไว้ในภาชนะที่ปิด ปิดให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและห่างจากความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป (ไม่ใช่ในห้องน้ำ)

สิ่งสำคัญคือต้องเก็บยาทั้งหมดให้พ้นสายตาและมือเด็ก เนื่องจากภาชนะจำนวนมาก (เช่น ผู้ดูแลยาเม็ดรายสัปดาห์และยาหยอดตา ครีม แผ่นแปะ และยาสูดพ่น) ไม่ทนต่อเด็ก และเด็กเล็กสามารถเปิดได้ง่าย เพื่อป้องกันเด็กเล็กจากการเป็นพิษ ให้ ล็อคฝาครอบนิรภัยเสมอ และวางยาไว้ในที่ปลอดภัยทันที - อันที่อยู่สูงและให้พ้นสายตาและเอื้อมถึง<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ควรกำจัดยาที่ไม่จำเป็นด้วยวิธีพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยง เด็ก และคนอื่น ๆ ไม่สามารถบริโภคได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก วิธีที่ดีที่สุดในการทิ้งยาของคุณคือการใช้โปรแกรมรับคืนยา พูดคุยกับเภสัชกรของคุณหรือติดต่อแผนกขยะ/รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนำกลับคืนในชุมชนของคุณ ดูเว็บไซต์การกำจัดยาอย่างปลอดภัยของ FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมรับคืน

ก กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ที่<https://www.poissonhelp.org/help> [<https://www.poissonhelp.org/help>]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลำบาก หรือตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันทีที่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:

- อาการง่วงนอน
- ความปั่นป่วน, อาการประสาทหลอน, มีไข้, เหงื่อออก, สับสน, หัวใจเต้นเร็ว, ตัวสั่น, กล้ามเนื้อตึงหรือกระตุกอย่างรุนแรง, สูญเสียการประสานงาน, คลื่นไส้, อาเจียนหรือท้องร่วง
- เหนื่อยเหลือเกิน
- อาการเวียนศีรษะ
- ความปั่นป่วน
- ความบ้าคลั่ง
- อาการชัก
- มดสติ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่จันควรรู้?

สิ่งสำคัญคือต้องนัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองต่อฟลูโอซามินของคุณ

อย่าให้คนอื่นใช้ยาของคุณ ตามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการเติมใบสั่งยา

เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ซื้อเองจากร้านขายยา) ทั้งหมด รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ หรืออาหารเสริมอื่นๆ คุณควรนำรายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่คุณไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสำคัญที่พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน

ชื่อแบรนด์

- Luvox®
- Luvox®CR

แก้ไขล่าสุด - 01/15/2022

[เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ขอจำกัดความรับผิดชอบ](#)

AHFS®ข้อมูลยาของผู้ป่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, เบเธสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทำซ้ำ
สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับอนุญาตจาก ASHP

หอสมุดแห่งชาติการแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษยของสหรัฐอเมริกา

สถาบันสุขภาพแห่งชาติ

หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022