



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Fluvoksamin

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

fluvoksamin

(floo vox' a meen) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Klinik çalışmalar sırasında fluvoksamin gibi antidepresanlar ("ruh hali yükselticileri") alan az sayıda çocuk, genç ve genç yetişkin (24 yaşına kadar) intihara meyilli hale geldi (kendine zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünme veya bunu yapmayı planlama veya yapmaya çalışma). Depresyon veya diğer akıl hastalıklarını tedavi etmek için antidepresan alan çocuklar, gençler ve genç yetişkinlerin intihara meyilli olmaları, bu durumları tedavi etmek için antidepresan kullanmayan çocuklara, ergenlere ve genç yetişkinlere göre daha olasıdır. Ancak uzmanlar bu riskin ne kadar büyük olduğundan ve bir çocuğun mu yoksa gencin mi antidepresan alması gerektiğine karar verirken ne kadar dikkate alınması gerektiği konusunda emin değiller.

24 yaşın üzerinde bir yetişkin olsanız bile, fluvoksamin veya diğer antidepresanları aldığınızda ruh sağlığınızın beklenmedik şekillerde değişebileceğini bilmelisiniz. Özellikle tedavinizin başlangıcında ve dozunuzun artırılıp azaltıldığı herhangi bir zamanda intihara meyilli olabilirsiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, siz, aileniz veya bakıcınız hemen doktorunuzu aramalısınız: yeni veya kötüleşen depresyon; kendinize zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünmek veya bunu planlamak veya yapmaya çalışmak; aşırı endişe; çalkalama; Panik ataklar; uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu; agresif davranış; sinirlilik; düşünmeden hareket etmek; AĞIR uykusuzluk; ve çılgın anormal heyecan.

Sağlık uzmanınız, özellikle tedavinizin başlangıcında, fluvoksamin alırken sizi sık sık görmek isteyecektir. Doktorunuzla ofis ziyaretleri için tüm randevuları aldığınızdan emin olun.

Fluvoksamin ile tedaviye başladığınızda, doktor veya eczacı size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. İlaç Rehberini FDA web sitesinden de edinebilirsiniz:<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

Yaşınız ne olursa olsun, bir antidepresan almadan önce siz, ebeveyniniz veya bakıcınız, durumunuzu bir antidepresan veya antidepresanla tedavi etmenin riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşmalısınız.

diğer tedaviler ile. Ayrıca durumunuzu tedavi etmemenin riskleri ve yararları hakkında da konuşmalısınız. Depresyona veya başka bir akıl hastalığına sahip olmanın intihara meyilli olma riskinizi büyük ölçüde artırdığını bilmelisiniz. Bu risk, siz veya ailenizden herhangi biri bipolar bozukluk (depresiften anormal derecede heyecanlı hale gelen ruh hali) veya mani (çılgin, anormal derecede heyecanlı ruh hali) geçirmişse veya daha önce yaşamışsa veya intiharı düşünmüş veya intihara teşebbüs etmişse daha yüksektir. Durumunuz, semptomlarınız ve kişisel ve aile tıbbi geçmişiniz hakkında doktorunuzla konuşun. Hangi tedavinin sizin için uygun olduğuna siz ve doktorunuz karar vereceksiniz.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Fluvoksamin, obsesif-kompulsif bozukluğu (geçmeyen rahatsız edici düşünceler ve belirli eylemleri tekrar tekrar gerçekleştirme ihtiyacı) ve sosyal anksiyete bozukluğunu (başkalarıyla etkileşime girmekten veya başkalarının önünde performans sergilemekten normal işleyişi bozacak şekilde) tedavi etmek için kullanılır. hayat). Fluvoksamin, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyinde zihinsel dengenin korunmasına yardımcı olan doğal bir madde olan serotonin miktarını artırarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Fluvoksamin, bir tablet ve ağızdan almak için uzatılmış salımlı bir kapsül olarak gelir. Tablet genellikle günde bir kez yatmadan önce veya günde iki kez, sabah ve yatmadan önce bir kez alınır. Uzatılmış salımlı kapsül genellikle yemekle birlikte veya yemeksiz olarak günde bir kez yatmadan önce alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Fluvoksamin'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Uzatılmış salımlı kapsülleri bütün olarak yutunuz; ezmeyin veya çiğnemeyin.

Doktorunuz size düşük dozda fluvoksamin ile başlayabilir ve ilacın sizin için ne kadar iyi çalıştığına ve yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak, haftada bir defadan fazla olmamak üzere dozunuzu kademeli olarak artırabilir.

Fluvoksaminin tüm faydasını hissetmeniz birkaç hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile fluvoksamin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan fluvoksamin almayı kesmeyin. Fluvoksamin almayı aniden bırakırsanız, sinirlilik gibi yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz; çalkalama; baş dönmesi; aşırı endişe; huzursuzluk; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; baş ağrısı; yorgunluk; ruh hali değişiklikleri; uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu; veya ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma, karıncalanma veya 'elektrik çarpması' hissi. Doktorunuz muhtemelen dozunuzu kademeli olarak azaltacaktır.

bu ilacın kullanım alanları

Fluvoksamin bazen depresyonu tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Fluvoksamin almadan önce,

- fluvoksamine, diğer ilaçlara veya fluvoksamin tabletleri ve uzun salımlı kapsüllerdeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız..
- alosetron (Lotronex), pimozid (Orap), ramelteon (Rozerem), tizanidin (Zanaflex) veya tioridazin alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size fluvoksamin almamanızı söyleyecektir.
- Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız veya bunları son 14 gün içinde almayı bıraktıysanız doktorunuza söyleyiniz: izokarboksazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metilen mavisi gibi monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri; fenelzin (Nardil), rasagilin (Azilect), selegilin (Emsam, Zelapar) ve tranilsipromin (Parnate). Doktorunuz muhtemelen size fluvoksamin almamanızı söyleyecektir. Fluvoksamin almayı bırakırsanız, bir MAO inhibitörü almaya başlamadan önce en az 14 gün beklemelisiniz.
- doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları ve aldığınız veya almayı planladığınız vitaminleri söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: alprazolam (Xanax); amfetaminler; varfarin (Coumadin) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcı'); aspirin veya aspirin içeren ürünler ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi diğer nonsteroid antiinflatuar ilaçlar; metoprolol (Lopressor, Toprol) ve propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran) gibi beta blokerler; buspiron; karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, diğerleri); klozapin (Clozaril, Versacloz); siklosporin (Neoral, Sandimmune); dekstrometorfan (öksürük ilaçlarında); diazepam (Valium, Valtoco); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, diğerleri); diüretikler ('su hapları'); fentanil (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, diğerleri); haloperidol (Haldol); ketokonazol; lityum (Lithobid); almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan, rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) ve zolmitriptan (Zomig) gibi migren baş ağrıları için ilaçlar; metadon (Metadon); meksiletin; metoklopramid; midazolam (Seizalam); omeprazol (Prilosec, Zegerid); anksiyete, depresyon veya akıl hastalığı için diğer ilaçlar; fenitoin (Dilantin, Phenytek); takrin (Cognex); teofilin (Theo-24, Theochron); tramadol (Conzip, Qdolo, Ultram, Ultracet'te); triazolam (Halcion); ve kinidin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da fluvoksamin ile etkileşime girebilir, bu nedenle aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.
- Doktorunuza, özellikle sarı kantaron ve triptofan içeren ürünler olmak üzere hangi bitkisel ürünleri ve besin takviyelerini aldığınızı söyleyin.
- Çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz veya sokak uyuşturucuları kullandıysanız veya reçeteli ilaçları aşırı kullandıysanız doktorunuza söyleyin. Ayrıca yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, kanınızda sodyum seviyesi düşükse doktorunuza söyleyiniz; ya da kanama sorunlarınız varsa ya da daha önce yaşadıysanız; nöbetler; veya kalp, böbrek veya karaciğer hastalığı.
- Hamileyseniz, özellikle hamileliğinizin son birkaç ayındaysanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Fluvoksamin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Fluvoksamin gebeliğin son aylarında alınırsa doğum sonrası yenidoğanlarda sorunlara neden olabilir.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize fluvoksamin kullandığınızı söyleyin.
- Bu ilacın sizi uyuşuk hale getirebileceğini veya muhakeme, düşünme veya motor becerilerinizi etkileyebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.
- alkolün bu ilacın neden olduğu uyuşukluğu artırabileceğini unutmayın. Fluvoksamin alırken alkol içmemelisiniz.

- Tütün ürünleri kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Sigara içmek bu ilacın etkinliğini azaltabilir.
- Fluvoksaminin açığı kapanması glokomuna neden olabileceğini bilmelisiniz (sıvının aniden tıkanması ve göz dışına akamaması, göz basıncında hızlı ve şiddetli bir artışa neden olarak görme kaybına yol açabilecek bir durum). Bu ilacı almaya başlamadan önce doktorunuzla göz muayenesi hakkında konuşun. Bulantı, göz ağrısı, ışıkların etrafında renkli halkalar görme gibi görme değişiklikleri, göz içinde veya çevresinde şişlik veya kızarıklık varsa hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Fluvoksamin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- uyuşukluk
- kuru ağız
- mide bulantısı
- kusma
- ishal
- karın ağrısı
- kabızlık
- hazımsızlık
- gaz
- tat değişikliği
- burun tıkanıklığı
- iştah azalması
- terlemek
- uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu
- kilo kaybı
- sinirlilik

- erkeklerde cinsel sorunlar; cinsel dürtüde azalma, ereksiyon olamama veya ereksiyon olamama veya boşalmanın gecikmesi veya olmaması
- kadınlarda cinsel sorunlar; cinsel dürtü azalması veya orgazm gecikmesi veya orgazm olamama

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARI veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümlerinde listelenenlerden herhangi birini yaşıyorsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- baş dönmesi
- ateş, terleme, kafa karışıklığı, hızlı veya düzensiz kalp atışı ve şiddetli kas sertliği veya seğirmesi, ajitasyon, halüsinasyonlar, koordinasyon kaybı, mide bulantısı, kusma veya ishal
- ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma
- Vücudun kontrol edemediğiniz bir bölümünün sallanması
- baş ağrısı
- Konsantrasyon zorluğu
- konsantre olma zorluğu, hafıza sorunları veya kafa karışıklığı
- zayıflık
- kararsızlık
- döküntü
- kurdeşen
- gözlerin, yüzün, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi
- yavaşlamış veya zor nefes alma
- nöbetler
- bilinç kaybı
- olağandışı kanama veya morarma
- burun kanaması
- kan veya kahve telvesi gibi görünen bir malzeme kusmak
- dışkıda kırmızı kan veya siyah ve katranlı dışkı

Fluvoksamin iştahı azaltabilir ve çocuklarda kilo kaybına neden olabilir. Çocuğunuzun doktoru büyümesini dikkatle izleyecektir. Bu ilacı alırken çocuğunuzun büyümesi veya kilosu hakkında endişeleriniz varsa, çocuğunuzun doktoruyla konuşun. Çocuğunuza fluvoksamin vermenin riskleri hakkında çocuğunuzun doktoruyla konuşun.

Fluvoksamin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşıyorsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kaptaki, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

- uyuşukluk
- ajitasyon, halüsinasyonlar, ateş, terleme, kafa karışıklığı, hızlı kalp atışı, titreme, şiddetli kas sertliği veya seğirmesi, koordinasyon kaybı, mide bulantısı, kusma veya ishal
- aşırı yorgunluk
- baş dönmesi
- çalkalama
- mani
- nöbetler
- bilinç kaybı

Şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevuları doktorunuzla ve laboratuvarla tutmanız önemlidir. Doktorunuz, fluvoksamine yanıtınızı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Luvox®
- Luvox®CR

Son Revize - 01/15/2022

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022