



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[У дома](#) → [Лекарства, билки и добавки](#) → Флувоксамин

Source : U.S. National Library of Medicine

URL на тази страница: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

## флувоксамин

произнася се като (floo vox' a meen)

### ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Малък брой деца, тийнейджъри и млади възрастни (до 24 години), които са приемали антидепресанти („повдигатели на настроение“) като флувоксамин по време на клинични проучвания, стават суицидни (мислят за самонараняване или самоубийство или планират или се опитват да го направят). Децата, тийнейджърите и младите възрастни, които приемат антидепресанти за лечение на депресия или други психични заболявания, може да са по-склонни да се самоубият, отколкото децата, тийнейджърите и младите възрастни, които не приемат антидепресанти за лечение на тези състояния. Експертите обаче не са сигурни колко голям е този риск и колко трябва да се вземе предвид при вземането на решение дали дете или тийнейджър трябва да приема антидепресант.

Трябва да знаете, че психичното ви здраве може да се промени по неочакван начин, когато приемате флувоксамин или други антидепресанти, дори ако сте възрастен над 24 години. Може да станете суицидни, особено в началото на лечението и всеки път, когато дозата Ви се увеличи или намали. Вие, вашето семейство или вашият болногледач трябва незабавно да се обадите на Вашия лекар, ако изпитате някой от следните симптоми: нова или влошаваща се депресия; мислите за самонараняване или самоубийство, или планирате или се опитвате да го направите; изключително безпокойство; възбуда; паническа атака; трудно заспиване или оставане на заспиване; агресивно поведение; раздразнителност; действия без да се замисля; силно безпокойство; и неистово необичайно вълнение.

Вашият доставчик на здравни услуги ще иска да ви вижда често, докато приемате флувоксамин, особено в началото на лечението. Не забравяйте да запазите всички срещи за посещения в офиса с Вашия лекар.

Лекарят или фармацевтът ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), когато започнете лечение с флувоксамин. Прочетете внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също така да получите ръководството за лекарства от уебсайта на FDA: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

Независимо от възрастта ви, преди да приемете антидепресант, вие, вашият родител или лицето, което се грижи за вас, трябва да говорите с вашия лекар за рисковете и ползите от лечението на вашето състояние с антидепресант или

с други лечения. Вие също трябва да говорите за рисковете и ползите от нелекуването на вашето състояние. Трябва да знаете, че наличието на депресия или друго психично заболяване значително увеличава риска от самоубийство. Този риск е по-висок, ако вие или някой от вашето семейство имате или някога сте имали биполарно разстройство (настроение, което се променя от потиснато в необичайно развълнувано) или мания (безумно, необичайно възбудено настроение) или сте мислили или се опитвали да се самоубиете. Говорете с Вашия лекар за Вашето състояние, симптоми и лична и семейна медицинска история. Вие и Вашият лекар ще решите какъв тип лечение е подходящ за Вас.

## защо е предписано това лекарство?

Fluvoxamine се използва за лечение на obsесивно-компулсивно разстройство (досадни мисли, които няма да изчезнат и необходимостта от извършване на определени действия отново и отново) и социално тревожно разстройство (екстремен страх от взаимодействие с други или представяне пред други, което пречи на нормалното животно). Флувоксаминът е в клас лекарства, наречени селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI). Действа чрез увеличаване на количеството серотонин, естествено вещество в мозъка, което помага за поддържане на психическия баланс.

## как трябва да се използва това лекарство?

Fluvoxamine се предлага като таблетка и капсула с удължено освобождаване за прием през устата. Таблетката обикновено се приема или веднъж дневно преди лягане, или два пъти дневно, веднъж сутрин и веднъж преди лягане. Капсулата с удължено освобождаване обикновено се приема, със или без храна, веднъж дневно преди лягане. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете флувоксамин точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте капсулите с удължено освобождаване цели; не ги смачквайте и не ги дъвчете.

Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза флувоксамин и постепенно да увеличава дозата Ви, не по-често от веднъж седмично, в зависимост от това колко добре действа лекарството за Вас и страничните ефекти, които изпитвате.

Може да отнеме няколко седмици или повече, за да почувствате пълната полза от флувоксамин. Продължете да приемате флувоксамин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на флувоксамин, без да говорите с Вашия лекар. Ако внезапно спрете приема на флувоксамин, може да получите симптоми на отнемане, като раздразнителност; възбуда; световъртеж; изключително безпокойство; безпокойство; объркване; главоболие; умора; промени в настроението; трудно заспиване или оставане на заспиване; или болка, парене, изтръпване, изтръпване или усещания за „електрически удар“ в ръцете или краката. Вашият лекар вероятно ще намали дозата Ви постепенно.

## други употреби на това лекарство

Флувоксамин също се използва понякога за лечение на депресия. Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство понякога се предписва за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

## какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

### Преди да приемете флувоксамин,

- уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към флувоксамин, други лекарства или някоя от съставките на флувоксамин таблетки и капсули с удължено освобождаване. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за списък на съставките.
- уведомете Вашия лекар, ако приемате алосетрон (Lotronex), пимозид (Orap), рамелтеон (Rozerem), тизанидин (Zanaflex) или тиоридазин. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате флувоксамин.
- уведомете Вашия лекар, ако приемате следните лекарства или ако сте спрели да ги приемате през последните 14 дни: инхибитори на моноаминоксидазата (MAO) като изокарбоксазид (Marplan), линезолид (Zyvox), метиленово синьо; фенелзин (Nardil), разагилин (Azilect), селегилин (Emsam, Zelapar) и транилципромин (Parnate). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате флувоксамин. Ако спрете да приемате флувоксамин, трябва да изчакате поне 14 дни, преди да започнете да приемате MAO инхибитор.
- кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства и витамини, отпускани с рецепта и без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: алпразолам (Xanax); амфетамини; антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin); аспирин или съдържащи аспирин продукти и други нестероидни противовъзпалителни лекарства като ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); бета-блокери като метопролол (Lopressor, Toprol) и пропранолол (Hemangeol, Inderal, Innopran); буспирон; карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol, други); клозапин (Clozaril, Versacloz); циклоспорин (Neoral, Sandimmune); декстрометорфан (в лекарства за кашлица); диазепам (Valium, Valtoco); дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac, други); диуретици („хапчета за вода“); фентанил (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, други); халоперидол (Haldol); кетоназол; литий (Lithobid); лекарства за мигренозно главоболие като алмотриптан (Axert), елетриптан (Relpax), фроватриптан (Frova), наратриптан, ризатриптан (Maxalt), суматриптан (Imitrex) и золмитриптан (Zomig); метадон (Methadose); мексилетин; метоклопрамид; мидазолам (Seizalam); омепразол (Prilosec, Zegerid); други лекарства за тревожност, депресия или психични заболявания; фенитоин (Dilantin, Phenytek); такрин (Cognex); теофилин (Theo-24, Theochron); трамадол (Conzip, Qdolo, Ultram, в Ultracet); триазолам (Halcion); и хинидин. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да взаимодействат с флувоксамин, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате,
- кажете на Вашия лекар какви билкови продукти и хранителни добавки приемате, особено продукти, които съдържат жълт кантарион и триптофан.
- уведомете Вашия лекар, ако пиете или някога сте пили големи количества алкохол или сте употребявали улични наркотици или сте използвали прекомерно лекарства, отпускани с рецепта. Също така информирайте Вашия лекар, ако наскоро сте имали сърдечен удар, ако имате ниски нива на натрий в кръвта; или ако имате или някога сте имали проблеми с кървенето; гърчове; или заболяване на сърцето, бъбреците или черния дроб.
- уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, особено ако сте в последните няколко месеца от бременността си, или ако планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато приемате флувоксамин, обадете се на Вашия лекар. Флувоксамин може да причини проблеми при новородени след раждане, ако се приема през последните месеци на бременността.
- ако Ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате флувоксамин.
- трябва да знаете, че това лекарство може да ви направи сънливи или да повлияе на вашата преценка, мислене или двигателни умения. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.
- не забравяйте, че алкохолът може да увеличи сънливостта, причинена от това лекарство. Не трябва да пиете алкохол, докато приемате флувоксамин.

- уведомете Вашия лекар, ако използвате тютюневи изделия. Пушенето на цигари може да намали ефективността на това лекарство.
- трябва да знаете, че флувоксамин може да причини закритоъгълна глаукома (състояние, при което течността внезапно е блокирана и не може да изтича от окото, причинявайки бързо, силно повишаване на очното налягане, което може да доведе до загуба на зрение). Говорете с Вашия лекар за очен преглед, преди да започнете да приемате това лекарство. Ако имате гадене, болка в очите, промени в зрението, като например цветни пръстени около светлините, и подуване или зачервяване в или около окото, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ.

### **какви специални диетични инструкции трябва да следвам?**

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

### **какво да правя, ако пропусна доза?**

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

### **какви странични ефекти може да причини това лекарство?**

**Флувоксамин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:**

- сънливост
- суха уста
- гадене
- повръщане
- диария
- стомашни болки
- запек
- лошо храносмилане
- газ
- промяна във вкуса
- запушен нос
- намален апетит
- изпотяване
- затруднено заспиване или оставане на заспиване
- отслабване
- нервност

- сексуални проблеми при мъжете; намалено сексуално желание, невъзможност за получаване или поддържане на ерекция, или забавена или липсваща еякулация
- сексуални проблеми при жените; намалено сексуално желание или забавен оргазъм или невъзможност за постигане на оргазъм

**Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми или тези, изброени в разделите ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:**

- световъртеж
- треска, изпотяване, объркване, бърз или неравномерен сърдечен ритъм и тежка мускулна скованост или потрепване, възбуда, халюцинации, загуба на координация, гадене, повръщане или диария
- болка, парене, изтръпване или изтръпване на ръцете или краката
- треперене на част от тялото, която не можете да контролирате
- главоболие
- затруднено концентриране
- затруднено концентриране, проблеми с паметта или объркване
- **слабост**
- **нестабилност**
- обрив
- копривна треска
- подуване на очите, лицето, устните, езика или гърлото
- забавено или затруднено дишане
- припадъци
- **загуба на съзнание**
- необичайно кървене или синини
- **кървав нос**
- повръщане на кръв или материал, който прилича на утайка от кафе
- червена кръв в изпражненията или черни и катранени изпражнения

Флувоксамин може да намали апетита и да причини загуба на тегло при деца. Лекарят на вашето дете ще наблюдава внимателно растежа му. Говорете с лекаря на детето си, ако имате притеснения относно растежа или теглото на детето си, докато то или тя приема това лекарство. Говорете с лекаря на вашето дете за рисковете от даване на флувоксамин на вашето дете.

Флувоксамин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) или по телефона (1-800-332-1088).

## какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца.

Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и обсега.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

## п случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е достъпна и онлайн на адрес <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Ако жертвата е припаднала, има гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

## Симптомите на предозиране могат да включват:

- СЪНЛИВОСТ
- възбуда, халюцинации, треска, изпотяване, объркване, ускорен пулс, треперене, тежка мускулна скованост или потрепване, загуба на координация, гадене, повръщане или диария
- прекомерна умора
- световъртеж
- възбуда
- мания
- припадъци
- загуба на съзнание

## каква друга информация трябва да знам?

Важно е да спазвате всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове, за да провери отговора Ви към флувоксамин.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

### рандови имена

- Luvox®
- Luvox®CR

Последна редакция - 15.01.2022 г

[Научете как да цитирате тази страница](#)



[Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc](#)

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

---

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г