



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家](#) → [药物、草药和补充剂](#) → 氟伏沙明

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

氟伏沙明

发音为 (floo vox' a meen)

重要警告:

少数在临床研究期间服用氟伏沙明等抗抑郁药（“情绪提升剂”）的儿童、青少年和年轻人（不超过 24 岁）有自杀倾向（考虑伤害或自杀或计划或试图这样做）。服用抗抑郁药治疗抑郁症或其他精神疾病的儿童、青少年和年轻人可能比不服用抗抑郁药治疗这些疾病的儿童、青少年和年轻人更有可能自杀。然而，专家们不确定这种风险有多大，以及在决定儿童或青少年是否应该服用抗抑郁药时应该考虑多少。

您应该知道，即使您是 24 岁以上的成年人，当您服用氟伏沙明或其他抗抑郁药时，您的心理健康可能会以意想不到的方式发生变化。您可能有自杀倾向，尤其是在治疗开始时以及剂量增加或减少的任何时候。如果您出现以下任何症状，您、您的家人或您的护理人员应立即致电您的医生：新的或恶化的抑郁症；考虑伤害或自杀，或计划或试图这样做；极度担心；搅动；惊恐发作；难以入睡或保持睡眠；攻击性行为；易怒；不假思索地行动；严重的不安；和疯狂异常的兴奋。

在您服用氟伏沙明期间，您的医疗保健提供者会希望经常见到您，尤其是在您开始治疗时。确保与您的医生保持所有就诊预约。

当您开始使用氟伏沙明治疗时，医生或药剂师会给您制造商的患者信息表（药物指南）。仔细阅读信息，如有任何问题，请咨询您的医生或药剂师。您还可以从 FDA 网站获取药物指南：<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

无论您的年龄如何，在您服用抗抑郁药之前，您、您的父母或您的看护人都应该与您的医生讨论使用抗抑郁药或

与其他治疗。您还应该谈论不治疗您的病情的风险和益处。您应该知道,患有抑郁症或其他精神疾病会大大增加您自杀的风险。如果您或您家中的任何人患有或曾经患有双相情感障碍(情绪从抑郁变为异常兴奋)或躁狂症(疯狂、异常兴奋的情绪)或曾想过或企图自杀,这种风险会更高。与您的医生讨论您的病情、症状以及个人和家庭病史。您和您的医生将决定哪种治疗适合您。

为什么要开这种药?

氟伏沙明用于治疗强迫症(烦人的想法不会消失,需要一遍又一遍地执行某些动作)和社交焦虑症(极度害怕与他人互动或在他人面前表演干扰正常生活)。氟伏沙明属于一类称为选择性血清素再摄取抑制剂(SSRIs)的药物。它通过增加血清素的量起作用,血清素是大脑中一种有助于维持心理平衡的天然物质。

这个药应该怎么用?

氟伏沙明以片剂和缓释胶囊的形式口服。片剂通常在睡前服用一次或每天两次,早上一次,睡前服用一次。缓释胶囊通常在有或没有食物的情况下服用,每天睡前服用一次。仔细遵循处方标签上的说明,并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用氟伏沙明。不要多吃或少吃,也不要比医生开的更频繁。

吞下整个缓释胶囊;不要压碎或咀嚼它们。

您的医生可能会让您开始服用低剂量的氟伏沙明,然后逐渐增加您的剂量,频率不超过每周一次,具体取决于药物对您的疗效以及您所经历的副作用。

您可能需要数周或更长时间才能感受到氟伏沙明的全部益处。即使您感觉良好,也要继续服用氟伏沙明。不要在未咨询医生的情况下停止服用氟伏沙明。如果您突然停止服用氟伏沙明,您可能会出现易怒等戒断症状;搅动;头晕;极度担心;不安;困惑;头痛;疲倦;情绪变化;难以入睡或保持睡眠;或手或脚的疼痛、灼热、麻木、刺痛或“电击”感觉。您的医生可能会逐渐减少您的剂量。

该药的其他用途

氟伏沙明有时也用于治疗抑郁症。与您的医生讨论使用这种药物治疗您的病情可能存在的风险。

这种药物有时用于其他用途;向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

在服用氟伏沙明之前,

- 如果您对氟伏沙明、任何其他药物或氟伏沙明片剂和缓释胶囊中的任何成分过敏, 请告诉您的医生和药剂师。向您的医生或药剂师索取成分清单。
- 如果您正在服用阿洛司琼 (Lotronex)、匹莫齐特 (Orap)、雷美替恩 (Rozerem)、替扎尼定 (Zanaflex) 或硫利达嗪, 请告诉您的医生。您的医生可能会告诉您不要服用氟伏沙明。
- 如果您正在服用以下药物, 或者您在过去 14 天内是否已停止服用, 请告诉您的医生: 单胺氧化酶 (MAO) 抑制剂, 例如异卡波肼 (Marplan)、利奈唑胺 (Zyvox)、亚甲蓝; 苯乙肼 (Nardil)、雷沙吉兰 (Azilect)、司来吉兰 (Emsam、Zelapar) 和反苯环丙胺 (Parnate)。您的医生可能会告诉您不要服用氟伏沙明。如果您停止服用氟伏沙明, 您应该至少等待 14 天才能开始服用 MAO 抑制剂。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药以及维生素。请务必提及以下任何一项: 阿普唑仑 (Xanax); 苯丙胺; 抗凝剂 (“血液稀释剂”), 例如华法林 (香豆素); 阿司匹林或含阿司匹林的产品和其他非甾体抗炎药, 如布洛芬 (Advil, Motrin) 和萘普生 (Aleve, Naprosyn); β -受体阻滞剂, 例如美托洛尔 (Lopressor、Toprol) 和普萘洛尔 (Hemangeol、Inderal、Innopran); 丁螺环酮; 卡马西平 (Carbatrol、Equetro、Tegretol等); 氯氮平 (Clozaril, Versacloz); 环孢素 (Neoral, Sandimmune); 右美沙芬 (止咳药); 地西洋 (Valium, Valtoco); 地尔硫卓 (Cardizem、Cartia、Tiazac等); 利尿剂 (“水丸”); 芬太尼 (Abstral、Actiq、Fentora、Onsolis、其他); 氟哌啶醇 (Haldol); 酮康唑; 锂 (Lithobid); 偏头痛药物, 如阿莫曲坦 (Axert)、依立曲坦 (Relpax)、弗洛瓦曲坦 (Frova)、那拉曲坦、利扎曲坦 (Maxalt)、舒马曲坦 (Imitrex) 和佐米曲坦 (Zomig); 美沙酮 (美沙酮); 美西律; 甲氧氯普胺; 咪达唑仑 (Seizalam); 奥美拉唑 (Prilosec, Zegerid); 其他治疗焦虑、抑郁或精神疾病的药物; 苯妥英 (Dilantin, Phenytek); 他克林 (康耐视); 茶碱 (Theo-24, Theochron); 曲马多 (Conzip、Qdolo、Ultram, 在 Ultracet 中); 三唑仑 (Halcion); 和奎尼丁。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。许多其他药物也可能与氟伏沙明相互作用, 因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物,
- 告诉您的医生您正在服用哪些草药产品和营养补充剂, 尤其是含有圣约翰草和色氨酸的产品。
- 如果您饮酒或曾经大量饮酒或使用过街头毒品或过度使用处方药, 请告诉您的医生。如果您最近有心脏病发作, 如果您的血液中钠含量低, 还要告诉您的医生; 或者如果您有或曾经有出血问题; 癫痫发作; 或心脏、肾脏或肝脏疾病。
- 如果您怀孕了, 请告诉您的医生, 尤其是如果您处于怀孕的最后几个月, 或者您打算怀孕或正在哺乳。如果您在服用氟伏沙明期间怀孕, 请致电您的医生。如果在怀孕的最后几个月服用氟伏沙明, 可能会导致分娩后的新生儿出现问题。
- 如果您正在接受手术, 包括牙科手术, 请告诉医生或牙医您正在服用氟伏沙明。
- 您应该知道, 这种药物可能会使您昏昏欲睡或影响您的判断、思维或运动技能。在您知道这种药物如何影响您之前, 请勿驾驶汽车或操作机器。
- 请记住, 酒精会增加这种药物引起的嗜睡。服用氟伏沙明时不应饮酒。

- 如果您使用烟草制品，请告诉您的医生。吸烟可能会降低这种药物的有效性。
- 您应该知道氟伏沙明可能会导致闭角型青光眼（液体突然被阻塞且无法流出眼睛的情况，导致眼压快速、严重增加，从而可能导致视力丧失）。在开始服用这种药物之前，请咨询您的医生进行眼科检查。如果您有恶心、眼痛、视力变化，例如看到灯光周围的彩色环，以及眼睛内部或周围肿胀或发红，请立即致电您的医生或接受紧急医疗治疗。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果您的下一次服药时间快到了，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

氟伏沙明可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 睡意
- 口干
- 恶心
- 呕吐
- 腹泻
- 肚子痛
- 便秘
- 消化不良
- 气体
- 口味变化
- 鼻塞
- 食欲下降
- 出汗
- 难以入睡或保持睡眠
- 减肥
- 紧张

- 男性的性问题；性欲下降，无法勃起或保持勃起，或射精延迟或不射精
- 女性的性问题；性欲下降、性高潮延迟或无法达到性高潮

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，或出现在“重要警告”或“特别注意事项”部分中列出的症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 头晕
- 发烧、出汗、精神错乱、心跳加快或不规则，以及严重的肌肉僵硬或抽搐、激动、幻觉、失去协调、恶心、呕吐或腹泻
- 手或脚疼痛、灼热、麻木或刺痛
- 身体无法控制的部位颤抖
- 头痛
- 难以集中注意力
- 难以集中注意力、记忆力问题或混乱
- 弱点
- 不稳定
- 皮疹
- 麻疹
- 眼睛、面部、嘴唇、舌头或喉咙肿胀
- 呼吸减慢或困难
- 癫痫发作
- 意识丧失
- 异常出血或瘀伤
- 流鼻血
- 吐血或看起来像咖啡渣的物质
- 便血或黑色和柏油样便

氟伏沙明可能会降低食欲并导致儿童体重减轻。您孩子的医生会仔细观察他或她的成长。如果您在孩子服用这种药物期间担心孩子的成长或体重，请咨询您孩子的医生。与您孩子的医生讨论给您孩子服用氟伏沙明的风险。

氟伏沙明可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

如果您遇到严重的副作用，您或您的医生可以在线向美国食品和药物管理局 (FDA) 的 MedWatch 不良事件报告计划发送报告

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) 或通过电话 (1-800-332-1088)。

我应该知道这种药物的储存和处置吗?

将这种药物放在它进来的容器中, 紧紧关闭, 并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下, 远离过多的热量和水分 (不要放在浴室里)。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要, 因为许多容器 (例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器) 不适合儿童使用, 而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒, 请始终锁上安全帽, 并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。

<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

不需要的药物应以特殊方式处理, 以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是, 您不应该将这种药物冲入马桶。相反, 处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门, 了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站 (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 如果您无权访问回收计划, 请了解更多信息。

n 紧急情况/过量

如果服用过量, 请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. 如果受害者已经昏倒、癫痫发作、呼吸困难或无法醒来, 请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

过量服用的症状可能包括:

- 睡意
- 激动、幻觉、发烧、出汗、精神错乱、心跳加快、颤抖、严重的肌肉僵硬或抽搐、失去协调、恶心、呕吐或腹泻
- 过度疲劳
- 头晕
- 搅动
- 狂躁
- 癫痫发作
- 意识丧失

我应该知道其他信息吗?

与您的医生和实验室保持所有预约是很重要的。您的医生会下令进行某些实验室测试, 以检查您对氟伏沙明的反应。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 卢沃克斯®
- 卢沃克斯®铭

最后修订 - 2022 年 1 月 15 日

[了解如何引用此页面](#)



[美国卫生系统药剂师协会免责声明](#)

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面: 2022 年 3 月 25 日