



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Huis](#) → [Medicijnen, kruiden en supplementen](#) → Fluvoxamine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL van deze pagina: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

## Fluvoxamine

uitgesproken als (floo vox' a me)

### BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Een klein aantal kinderen, tieners en jongvolwassenen (tot 24 jaar) die tijdens klinische onderzoeken antidepressiva ('stemmingslifters') zoals fluvoxamine slikten, werden suïcidaal (denken over zelfbeschadiging of zelfmoord of plannen of proberen dit te doen). Kinderen, tieners en jonge volwassenen die antidepressiva gebruiken om depressie of andere psychische aandoeningen te behandelen, hebben meer kans om suïcidaal te worden dan kinderen, tieners en jonge volwassenen die geen antidepressiva gebruiken om deze aandoeningen te behandelen. Deskundigen weten echter niet zeker hoe groot dit risico is en in hoeverre het moet worden overwogen bij de beslissing of een kind of tiener een antidepressivum moet nemen.

U moet weten dat uw geestelijke gezondheid op onverwachte manieren kan veranderen als u fluvoxamine of andere antidepressiva gebruikt, zelfs als u een volwassene bent ouder dan 24 jaar. U kunt suïcidaal worden, vooral aan het begin van uw behandeling en op elk moment dat uw dosis wordt verhoogd of verlaagd. U, uw familie of uw verzorger moeten onmiddellijk uw arts bellen als u een van de volgende symptomen ervaart: nieuwe of verergerende depressie; denken aan zelfbeschadiging of zelfmoord plegen, of dit plannen of proberen te doen; extreme zorgen; agitatie; paniekaanvallen; moeite met inslapen of doorslapen; agressief gedrag; prikkelbaarheid; handelen zonder na te denken; ernstige rusteloosheid; en waanzinnige abnormale opwinding.

Uw zorgverlener zal u vaak willen zien terwijl u fluvoxamine gebruikt, vooral aan het begin van uw behandeling. Zorg ervoor dat u alle afspraken voor kantoorbezoeken met uw arts bewaart.

De arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met de behandeling met fluvoxamine. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt de medicatiehandleiding ook verkrijgen van de FDA-website: <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

Ongeacht uw leeftijd, voordat u een antidepressivum gebruikt, moeten u, uw ouder of uw verzorger met uw arts praten over de risico's en voordelen van het behandelen van uw aandoening met een antidepressivum of

met andere behandelingen. U moet ook praten over de risico's en voordelen van het niet behandelen van uw aandoening. U moet weten dat het hebben van een depressie of een andere psychische aandoening het risico dat u suïcidaal wordt aanzienlijk vergroot. Dit risico is groter als u of iemand in uw familie een bipolaire stoornis (stemming die verandert van depressief in abnormaal opgewonden) of manie (uitzinnige, abnormaal opgewonden stemming) heeft of ooit heeft gehad, of heeft gedacht aan zelfmoord of een poging daartoe heeft ondernomen. Praat met uw arts over uw toestand, symptomen en persoonlijke en familiale medische geschiedenis. U en uw arts zullen beslissen welk type behandeling voor u geschikt is.

## hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Fluvoxamine wordt gebruikt voor de behandeling van een obsessief-compulsieve stoornis (lastige gedachten die maar niet verdwijnen en de noodzaak om bepaalde handelingen steeds opnieuw te leven). Fluvoxamine zit in een klasse geneesmiddelen die selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) worden genoemd. Het werkt door de hoeveelheid serotonine te verhogen, een natuurlijke stof in de hersenen die helpt het mentale evenwicht te behouden.

## hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Fluvoxamine wordt geleverd als een tablet en een capsule met verlengde afgifte om via de mond in te nemen. De tablet wordt gewoonlijk één keer per dag voor het slapengaan of twee keer per dag ingenomen, één keer 's ochtends en één keer voor het slapengaan. De capsule met verlengde afgifte wordt gewoonlijk, met of zonder voedsel, eenmaal daags voor het slapengaan ingenomen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem fluvoxamine precies zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de capsules met verlengde afgifte heel door; wees niet verpletterd of kauw ze niet.

Uw arts kan u laten beginnen met een lage dosis fluvoxamine en uw dosis geleidelijk verhogen, niet vaker dan één keer per week, afhankelijk van hoe goed de medicatie voor u werkt en de bijwerkingen die u ervaart.

Het kan enkele weken of langer duren voordat u het volledige effect van fluvoxamine voelt. Blijf fluvoxamine gebruiken, ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van fluvoxamine zonder met uw arts te overleggen. Als u plotseling stopt met het innemen van fluvoxamine, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen, zoals prikkelbaarheid; agitatie; duizeligheid; extreme zorgen; onbehagen; verwardheid; hoofdpijn; vermoeidheid; stemmingswisselingen; moeite met inslapen of doorslapen; of pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid, tintelingen of 'elektrische schok' gewaarwordingen in de handen of voeten. Uw arts zal uw dosis waarschijnlijk geleidelijk verlagen.

## andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Fluvoxamine wordt soms ook gebruikt om depressie te behandelen. Praat met uw arts over de mogelijke risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn wordt soms voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

## hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

### Voordat u fluvoxamine inneemt,

- vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor fluvoxamine, andere medicijnen of een van de ingrediënten in fluvoxamine-tabletten en capsules met verlengde afgifte. Vraag uw arts of apotheker om een lijst van de ingrediënten.
- vertel het uw arts als u alosetron (Lotronex), pimozide (Orap), ramelteon (Rozerem), tizanidine (Zanaflex) of thioridazine gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen fluvoxamine te gebruiken.
- vertel het uw arts als u de volgende medicijnen gebruikt of als u ermee bent gestopt in de afgelopen 14 dagen: monoamineoxidase (MAO)-remmers zoals isocarboxazide (Marplan), linezolid (Zyvox), methyleenblauw; fenelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), selegiline (Emsam, Zelapar) en tranylcypromine (Parnate). Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen fluvoxamine te gebruiken. Als u stopt met het innemen van fluvoxamine, moet u ten minste 14 dagen wachten voordat u begint met het innemen van een MAO-remmer.
- vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen en vitamines u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de volgende vermeldt: alprazolam (Xanax); amfetaminen; anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin); aspirine of aspirinebevattende producten en andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen zoals ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve, Naprosyn); bètablokkers zoals metoprolol (Lopressor, Toprol) en propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran); buspiron; carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, anderen); clozapine (Clozaril, Versacloz); ciclosporine (Neoral, Sandimmune); dextromethorfan (in hoestmedicatie); diazepam (Valium, Valtoco); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, anderen); diuretica ('plaspillen'); fentanyl (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, anderen); haloperidol (Haldol); ketoconazol; lithium (Lithobid); medicijnen voor migrainehoofdpijn zoals almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan, rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) en zolmitriptan (Zomig); methadon (Methadose); mexiletine; metoclopramide; midazolam (Seizalam); omeprazol (Prilosec, Zegerid); andere medicijnen voor angst, depressie of psychische aandoeningen; fenytoïne (Dilantin, Phenytek); tacrine (Cognex); theofylline (Theo-24, Theochron); tramadol (Conzip, Qdolo, Ultram, in Ultracet); triazolam (Halcion); en kinidine. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met fluvoxamine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt,
- vertel uw arts welke kruidenproducten en voedingssupplementen u gebruikt, vooral producten die sint-janskruid en tryptofaan bevatten.
- vertel het uw arts als u grote hoeveelheden alcohol drinkt of ooit heeft gedronken, straatdrugs heeft gebruikt of te veel voorgeschreven medicijnen heeft gebruikt. Vertel het uw arts ook als u onlangs een hartaanval heeft gehad, als u een laag natriumgehalte in uw bloed heeft; of als u bloedingsproblemen heeft of ooit heeft gehad; toevallen; of hart-, nier- of leverziekte.
- vertel het uw arts als u zwanger bent, vooral als u in de laatste paar maanden van uw zwangerschap bent, of als u van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u fluvoxamine gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Fluvoxamine kan problemen veroorzaken bij pasgeborenen na de bevalling als het tijdens de laatste maanden van de zwangerschap wordt ingenomen.
- als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u fluvoxamine gebruikt.
- u moet weten dat dit medicijn u slaperig kan maken of uw beoordelingsvermogen, denkvermogen of motoriek kan beïnvloeden. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.
- onthoud dat alcohol kan bijdragen aan de slaperigheid die door dit medicijn wordt veroorzaakt. U mag geen alcohol drinken terwijl u fluvoxamine gebruikt.

- vertel het uw arts als u tabaksproducten gebruikt. Het roken van sigaretten kan de effectiviteit van dit medicijn verminderen.
- u moet weten dat fluvoxamine kamerhoekglaucoom kan veroorzaken (een aandoening waarbij de vloeistof plotseling wordt geblokkeerd en niet uit het oog kan stromen, wat een snelle, ernstige verhoging van de oogdruk veroorzaakt die kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen). Praat met uw arts over een oogonderzoek voordat u begint met het innemen van dit medicijn. Als u last heeft van misselijkheid, oogpijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, zoals het zien van gekleurde ringen rond lichten, en zwelling of roodheid in of rond het oog, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of roep onmiddellijk medische hulp in.

## hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

### wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

**Fluvoxamine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet weggaat:**

- slaperigheid
- droge mond
- misselijkheid
- braken
- diarree
- buikpijn
- constipatie
- indigestie
- gas-
- verandering in smaak
- verstopte neus
- verminderde eetlust
- zweten
- moeite met inslapen of doorslapen
- gewichtsverlies
- nervositeit

- seksuele problemen bij mannen; verminderde zin in seks, onvermogen om een erectie te krijgen of te houden, of vertraagde of afwezige ejaculatie
- seksuele problemen bij vrouwen; verminderde zin in seks, of vertraagd orgasme of geen orgasme kunnen krijgen

**Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, of de symptomen die worden vermeld in de rubrieken BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN of SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of roep medische noodhulp in:**

- duizeligheid
- koorts, zweten, verwardheid, snelle of onregelmatige hartslag en ernstige spierstijfheid of spiertrekkingen, opwindning, hallucinaties, verlies van coördinatie, misselijkheid, braken of diarree
- pijn, branderig gevoel, gevoelloosheid of tintelingen in de handen of voeten
- trillen van een deel van het lichaam dat u niet kunt beheersen
- hoofdpijn
- moeite met concentreren
- moeite met concentreren, geheugenproblemen of verwarring
- zwakheid
- onvastheid
- uitslag
- netelroos
- zwelling van de ogen, het gezicht, de lippen, de tong of de keel
- vertraagde of moeilijke ademhaling
- toevallen
- verlies van bewustzijn
- ongebruikelijke bloeding of blauwe plekken
- bloedneus
- bloed overgeven of een materiaal dat op koffiedik lijkt
- rood bloed in ontlasting of zwarte en teerachtige ontlasting

Fluvoxamine kan de eetlust verminderen en gewichtsverlies bij kinderen veroorzaken. De arts van uw kind zal zijn of haar groei nauwlettend in de gaten houden. Praat met de arts van uw kind als u zich zorgen maakt over de groei of het gewicht van uw kind terwijl hij of zij dit medicijn gebruikt. Praat met de arts van uw kind over de risico's van het geven van fluvoxamine aan uw kind.

Fluvoxamine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) of telefonisch (1-800-332-1088).

## wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op kamertemperatuur en uit de buurt van overvloedige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

## n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op: <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

### Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

- slaperigheid
- agitatie, hallucinaties, koorts, zweten, verwardheid, snelle hartslag, rillingen, ernstige spierstijfheid of spiertrekkingen, verlies van coördinatie, misselijkheid, braken of diarree
- overmatige vermoeidheid
- duizeligheid
- agitatie
- manie
- toevallen
- verlies van bewustzijn

## wat moet ik nog meer weten?

Het is belangrijk om alle afspraken met uw arts en het laboratorium na te komen. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw reactie op fluvoxamine te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept (zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

## randnamen

- Luvox®
- Luvox®CR

Laatst herzien - 15/01/2022

[Leer hoe u deze pagina kunt citeren](#)



### [American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS®Informatie over patiëntmedicatie™. © Copyright, 2022. De American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alle rechten voorbehouden. duplicatie voor commercieel gebruik moet worden geautoriseerd door ASHP.

---

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

Nationale gezondheidsinstituten

Pagina laatst bijgewerkt: 25 maart 2022