



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Domicile](#) → [Médicaments, herbes et suppléments](#) → Fluvoxamine

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695004.html>

## Fluvoxamine

prononcé comme (floo vox' a meen)

### AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Un petit nombre d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes (jusqu'à 24 ans) qui ont pris des antidépresseurs (« éleveurs d'humeur ») tels que la fluvoxamine au cours des études cliniques sont devenus suicidaires (en pensant à se faire du mal ou à se tuer ou en planifiant ou en essayant de le faire). Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui prennent des antidépresseurs pour traiter la dépression ou d'autres maladies mentales peuvent être plus susceptibles de devenir suicidaires que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui ne prennent pas d'antidépresseurs pour traiter ces affections. Cependant, les experts ne sont pas sûrs de l'ampleur de ce risque et de la mesure dans laquelle il doit être pris en compte pour décider si un enfant ou un adolescent doit prendre un antidépresseur.

Vous devez savoir que votre santé mentale peut changer de manière inattendue lorsque vous prenez de la fluvoxamine ou d'autres antidépresseurs, même si vous êtes un adulte de plus de 24 ans. Vous pouvez devenir suicidaire, surtout au début de votre traitement et chaque fois que votre dose est augmentée ou diminuée. Vous, votre famille ou votre soignant devez appeler votre médecin immédiatement si vous ressentez l'un des symptômes suivants : dépression nouvelle ou qui s'aggrave ; penser à vous faire du mal ou à vous tuer, ou planifier ou essayer de le faire ; inquiétude extrême; agitation; crises de panique; difficulté à s'endormir ou à rester endormi; comportement agressif; irritabilité; agir sans réfléchir; agitation sévère; et une excitation anormale frénétique.

Votre fournisseur de soins de santé voudra vous voir souvent pendant que vous prenez de la fluvoxamine, surtout au début de votre traitement. Assurez-vous de respecter tous les rendez-vous pour les visites au bureau avec votre médecin.

Le médecin ou le pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) lorsque vous commencerez le traitement par la fluvoxamine. Lisez attentivement les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également obtenir le Guide des médicaments sur le site Web de la FDA : <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm> [<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm>].

Peu importe votre âge, avant de prendre un antidépresseur, vous, votre parent ou votre soignant devriez parler à votre médecin des risques et des avantages du traitement de votre maladie avec un antidépresseur ou

avec d'autres traitements. Vous devriez également parler des risques et des avantages de ne pas traiter votre maladie. Vous devez savoir que la dépression ou une autre maladie mentale augmente considérablement le risque que vous deveniez suicidaire. Ce risque est plus élevé si vous ou un membre de votre famille souffrez ou avez déjà souffert d'un trouble bipolaire (humeur qui passe de déprimé à anormalement excité) ou de manie (humeur frénétique, anormalement excitée) ou avez pensé ou tenté de vous suicider. Parlez à votre médecin de votre état, de vos symptômes et de vos antécédents médicaux personnels et familiaux. Vous et votre médecin déciderez du type de traitement qui vous convient.

## **Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?**

La fluvoxamine est utilisée pour traiter le trouble obsessionnel-compulsif (pensées gênantes qui ne disparaissent pas et la nécessité d'effectuer certaines actions encore et encore) et le trouble d'anxiété sociale (peur extrême d'interagir avec les autres ou de se produire devant les autres qui interfère avec la vie normale). La fluvoxamine appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS). Il agit en augmentant la quantité de sérotonine, une substance naturelle dans le cerveau qui aide à maintenir l'équilibre mental.

## **Comment ce médicament doit-il être utilisé ?**

La fluvoxamine se présente sous la forme d'un comprimé et d'une gélule à libération prolongée à prendre par voie orale. Le comprimé est généralement pris une fois par jour au coucher ou deux fois par jour, une fois le matin et une fois au coucher. La gélule à libération prolongée est généralement prise, avec ou sans nourriture, une fois par jour au coucher. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la fluvoxamine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Avalez les gélules à libération prolongée entières; ne les écrasez pas et ne les mâchez pas.

Votre médecin peut vous prescrire une faible dose de fluvoxamine et augmenter progressivement votre dose, pas plus d'une fois par semaine, en fonction de l'efficacité du médicament pour vous et des effets secondaires que vous ressentez.

Cela peut prendre plusieurs semaines ou plus avant que vous ressentiez tous les bienfaits de la fluvoxamine. Continuez à prendre de la fluvoxamine même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre de la fluvoxamine sans en parler à votre médecin. Si vous arrêtez soudainement de prendre de la fluvoxamine, vous pouvez ressentir des symptômes de sevrage tels que l'irritabilité ; agitation; vertiges; inquiétude extrême; malaise; confusion; mal de crâne; fatigue; des changements d'humeur; difficulté à s'endormir ou à rester endormi; ou des sensations de douleur, de brûlure, d'engourdissement, de picotement ou de « choc électrique » dans les mains ou les pieds. Votre médecin diminuera probablement votre dose progressivement.

## **autres utilisations de ce médicament**

La fluvoxamine est aussi parfois utilisée pour traiter la dépression. Discutez avec votre médecin des risques possibles de l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Ce médicament est parfois prescrit pour d'autres usages ; Demandez à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

## Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

### Avant de prendre de la fluvoxamine,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la fluvoxamine, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients contenus dans les comprimés et les capsules à libération prolongée de fluvoxamine. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien la liste des ingrédients.
- informez votre médecin si vous prenez de l'alosetron (Lotronex), du pimozide (Orap), du ramelteon (Rozerem), de la tizanidine (Zanaflex) ou de la thioridazine. Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de fluvoxamine.
- informez votre médecin si vous prenez les médicaments suivants ou si vous avez cessé de les prendre au cours des 14 derniers jours : inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO) tels que l'isocarboxazide (Marplan), le linézolide (Zyvox), le bleu de méthylène ; phénelzine (Nardil), rasagiline (Azilect), sélégiline (Emsam, Zelapar) et tranlycypromine (Parnate). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de fluvoxamine. Si vous arrêtez de prendre de la fluvoxamine, vous devez attendre au moins 14 jours avant de commencer à prendre un inhibiteur de la MAO.
- informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre et des vitamines que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : alprazolam (Xanax) ; les amphétamines; les anticoagulants (« anticoagulants ») tels que la warfarine (Coumadin) ; de l'aspirine ou des produits contenant de l'aspirine et d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'ibuprofène (Advil, Motrin) et le naproxène (Aleve, Naprosyn); les bêta-bloquants tels que le métoprolol (Lopressor, Toprol) et le propranolol (Hemangeol, Inderal, Innopran) ; buspirone; carbamazépine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, autres); clozapine (Clozaril, Versacloz); cyclosporine (Neoral, Sandimmun); dextrométhorphan (dans les médicaments contre la toux); diazépam (Valium, Valtoco); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, autres); diurétiques ("pilules d'eau"); fentanyl (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis, autres); l'halopéridol (Haldol); kétoconazole; lithium (Lithobide); les médicaments contre les migraines tels que l'almotriptan (Axert), l'élétriptan (Relpax), le frovatriptan (Frova), le naratriptan, le rizatriptan (Maxalt), le sumatriptan (Imitrex) et le zolmitriptan (Zomig); méthadone (Methadose); mexilétine; métoclopramide; le midazolam (Seizalam); oméprazole (Prilosec, Zegerid); d'autres médicaments contre l'anxiété, la dépression ou les maladies mentales ; phénytoïne (Dilantin, Phenytek); tacrine (Cognex); théophylline (Théo-24, Théochron); tramadol (Conzip, Qdolo, Ultram, dans Ultracet); le triazolam (Halcion); et quinidine. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent également interagir avec la fluvoxamine, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez,
- informez votre médecin des produits à base de plantes et des suppléments nutritionnels que vous prenez, en particulier des produits contenant du millepertuis et du tryptophane.
- informez votre médecin si vous buvez ou avez déjà bu de grandes quantités d'alcool ou si vous avez consommé des drogues illicites ou si vous avez abusé de médicaments sur ordonnance. Informez également votre médecin si vous avez récemment eu une crise cardiaque, si vous avez un faible taux de sodium dans le sang ; ou si vous avez ou avez déjà eu des problèmes de saignement; convulsions; ou une maladie cardiaque, rénale ou hépatique.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, en particulier si vous êtes dans les derniers mois de votre grossesse, ou si vous envisagez de devenir enceinte ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de la fluvoxamine, appelez votre médecin. La fluvoxamine peut causer des problèmes chez les nouveau-nés après l'accouchement si elle est prise au cours des derniers mois de la grossesse.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de la fluvoxamine.
- vous devez savoir que ce médicament peut vous rendre somnolent ou affecter votre jugement, votre réflexion ou vos habiletés motrices. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.
- n'oubliez pas que l'alcool peut augmenter la somnolence causée par ce médicament. Vous ne devez pas boire d'alcool pendant que vous prenez de la fluvoxamine.

- informez votre médecin si vous consommez des produits du tabac. Le tabagisme peut diminuer l'efficacité de ce médicament.
- vous devez savoir que la fluvoxamine peut provoquer un glaucome à angle fermé (une condition dans laquelle le liquide est soudainement bloqué et incapable de s'écouler hors de l'œil, provoquant une augmentation rapide et sévère de la pression oculaire pouvant entraîner une perte de vision). Discutez avec votre médecin de la possibilité de passer un examen de la vue avant de commencer à prendre ce médicament. Si vous avez des nausées, des douleurs oculaires, des changements dans la vision, tels que des anneaux colorés autour des lumières et un gonflement ou une rougeur dans ou autour de l'œil, appelez votre médecin ou obtenez immédiatement un traitement médical d'urgence.

## Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

## Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

## quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

**La fluvoxamine peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :**

- somnolence
- bouche sèche
- nausée
- vomissement
- diarrhée
- Douleur d'estomac
- constipation
- indigestion
- gaz
- changement de goût
- nez encombré
- diminution de l'appétit
- transpiration
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi
- perte de poids
- nervosité

- problèmes sexuels chez les hommes; diminution de la libido, incapacité à obtenir ou à maintenir une érection, ou éjaculation retardée ou absente
- problèmes sexuels chez les femmes; diminution de la libido, ou orgasme retardé ou incapacité d'avoir un orgasme

**Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, ou ceux énumérés dans les sections AVERTISSEMENT IMPORTANT ou PRÉCAUTIONS SPÉCIALES, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :**

- vertiges
- fièvre, transpiration, confusion, rythme cardiaque rapide ou irrégulier et raideur ou secousses musculaires sévères, agitation, hallucinations, perte de coordination, nausées, vomissements ou diarrhée
- douleur, brûlure, engourdissement ou picotements dans les mains ou les pieds
- tremblement d'une partie du corps que vous ne pouvez pas contrôler
- mal de crâne
- difficulté de concentration
- difficulté à se concentrer, problèmes de mémoire ou confusion
- la faiblesse
- déséquilibre
- éruption
- urticaire
- gonflement des yeux, du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- respiration ralentie ou difficile
- convulsions
- perte de conscience
- saignements ou ecchymoses inhabituels
- nez saignant
- vomir du sang ou un matériau qui ressemble à du marc de café
- sang rouge dans les selles ou selles noires et goudronneuses

La fluvoxamine peut diminuer l'appétit et entraîner une perte de poids chez les enfants. Le médecin de votre enfant surveillera attentivement sa croissance. Parlez au médecin de votre enfant si vous avez des inquiétudes concernant la croissance ou le poids de votre enfant pendant qu'il ou elle prend ce médicament. Parlez au médecin de votre enfant des risques de donner de la fluvoxamine à votre enfant.

La fluvoxamine peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

## Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

## n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne sur <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

### Les symptômes de surdosage peuvent inclure :

- somnolence
- agitation, hallucinations, fièvre, transpiration, confusion, accélération du rythme cardiaque, frissons, raideur ou secousses musculaires sévères, perte de coordination, nausées, vomissements ou diarrhée
- fatigue excessive
- vertiges
- agitation
- la manie
- convulsions
- perte de conscience

## Quelles autres informations dois-je connaître ?

Il est important de respecter tous les rendez-vous avec votre médecin et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour vérifier votre réponse à la fluvoxamine.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

## noms rands

- Luvox®
- Luvox®RS

Dernière révision - 15/01/2022

[Apprenez à citer cette page](#)



[Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.](#)

AHFS® Renseignements pour les patients sur les médicaments MC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisée par l'ASHP.

---

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022