Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612026.html

Injection de fondaparinux

prononcé comme (fon'' da par' dans ux)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Si vous subissez une anesthésie péridurale ou rachidienne ou une ponction lombaire alors que vous utilisez un anticoagulant tel que l'injection de fondaparinux, vous risquez de former un caillot sanguin dans ou autour de votre colonne vertébrale qui pourrait vous rendre paralysé. Informez votre médecin si vous avez subi ou avez déjà subi une chirurgie de la colonne vertébrale, des problèmes avec les analgésiques administrés par la colonne vertébrale, une déformation de la colonne vertébrale ou si vous avez des problèmes de saignement. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres anticoagulants (« anticoagulants ») tels que la warfarine (Coumadin), l'anagrélide (Agrylin), l'aspirine ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène, naproxène), le cilostazol (Pletal), le clopidogrel (Plavix), dipyridamole (Persantine), eptifibatide (Integrilin), prasugrel (Effient), ticlopidine et tirofiban (Aggrastat). Si vous ressentez l'un des symptômes suivants,

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin peut prescrire certains tests pour vérifier la réponse de votre corps à l'injection de fondaparinux.

Discutez avec votre médecin des risques liés à l'injection de fondaparinux.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de fondaparinux est utilisée pour prévenir la thrombose veineuse profonde (TVP ; un caillot sanguin, généralement dans la jambe), qui peut entraîner une embolie pulmonaire (EP ; un caillot sanguin dans le poumon), chez les personnes qui subissent une chirurgie de la hanche, de la hanche ou du genou remplacement ou chirurgie abdominale. Il est également utilisé avec la warfarine (Coumadin, Jantoven) pour traiter la TVP ou l'EP. L'injection de fondaparinux appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs du facteur Xa. Il agit en diminuant la capacité de coagulation du sang.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de fondaparinux se présente sous la forme d'une solution (liquide) à injecter par voie sous-cutanée (juste sous la peau) dans la région inférieure de l'estomac. Il est généralement administré une fois par jour pendant 5 à 9 jours ou parfois jusqu'à environ 1 mois. Vous commencerez probablement à utiliser l'injection de fondaparinux pendant votre séjour à l'hôpital, au moins 6 à 8 heures après votre chirurgie. Utilisez l'injection de fondaparinux à peu près à la même heure chaque jour. Suivre la

attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Utilisez l'injection de fondaparinux exactement comme indiqué. N'en injectez pas plus ou moins ou injectez-le plus souvent que prescrit par votre médecin.

Si vous continuez à utiliser le fondaparinux après votre séjour à l'hôpital, vous pouvez vous injecter vous-même le fondaparinux ou demander à un ami ou à un parent d'effectuer les injections. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous montrer, à vous ou à la personne qui injectera le médicament, comment l'injecter. Avant d'utiliser vous-même l'injection de fondaparinux pour la première fois, lisez les informations destinées aux patients qui l'accompagnent. Ces informations comprennent des instructions sur la façon d'utiliser et d'injecter les seringues de sécurité préremplies de fondaparinux. Assurez-vous de demander à votre pharmacien ou à votre médecin si vous avez des questions sur la façon d'injecter ce médicament.

Chaque seringue contient suffisamment de médicament pour une injection. N'utilisez pas la seringue et l'aiguille plus d'une fois. Votre médecin, votre pharmacien ou votre professionnel de la santé vous expliquera comment vous débarrasser en toute sécurité des aiguilles et des seringues usagées.

Ne mélangez pas l'injection de fondaparinux avec d'autres médicaments ou solutions.

autres utilisations de ce médicament

L'injection de fondaparinux est également parfois utilisée pour aider à prévenir les caillots sanguins chez les personnes qui ont eu une crise cardiaque. Discutez avec votre médecin des risques liés à l'utilisation de ce médicament pour votre état.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant d'utiliser l'injection de fondaparinux,

- informez votre médecin et votre pharmacien si vous avez eu une réaction allergique grave (difficulté à respirer ou à avaler ou gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres ou des yeux) au fondaparinux. Votre médecin vous dira probablement de ne pas utiliser le fondaparinux. Informez également votre médecin si vous êtes allergique à d'autres médicaments ou à l'un des ingrédients contenus dans l'injection de fondaparinux. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients. Informez également votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au latex.
- informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner les médicaments énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.
- informez votre médecin si vous pesez 110 livres (50 kg) ou moins, si vous saignez n'importe où sur votre corps ou si vous avez un faible nombre de plaquettes (cellules de coagulation du sang) dans votre sang, une endocardite (une infection du cœur) ou une maladie rénale. Votre médecin vous dira probablement de ne pas utiliser l'injection de fondaparinux.
- informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des ulcères à l'estomac ou aux intestins, une hypertension artérielle, un accident vasculaire cérébral ou un mini-accident vasculaire cérébral (AIT), une maladie oculaire due au diabète ou une maladie du foie. Informez également votre médecin si vous avez récemment subi une chirurgie du cerveau, des yeux ou de la colonne vertébrale.
- informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du fondaparinux, appelez votre médecin.
- si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez du fondaparinux injectable.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Donnez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. N'utilisez pas plus d'une dose de fondaparinux injectable à la fois.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection de fondaparinux peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

- éruption cutanée, démangeaisons, ecchymoses ou saignements au site d'injection
- vertiges
- confusion
- peau pâle
- cloques sur la peau
- difficulté à s'endormir ou à rester endormi

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, ou ceux énumérés dans la section AVERTISSEMENT IMPORTANT, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

- saignements ou ecchymoses inhabituels
- taches rouges foncées sous la peau ou dans la bouche
- urticaire
- gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres ou des yeux
- difficulté à avaler ou à respirer

L'injection de fondaparinux peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels lors de l'utilisation de ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA). (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Votre fournisseur de soins de santé vous expliquera comment conserver vos médicaments. Conservez vos médicaments uniquement selon les instructions et hors de portée des enfants. Assurez-vous de comprendre comment conserver correctement vos médicaments. Ne pas congeler l'injection de fondaparinux.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

- saignement

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Avant de subir un test de laboratoire, informez votre médecin et le personnel du laboratoire que vous recevez une injection de fondaparinux.

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

- Arixtre®

autres noms

- Fondaparine sodique

Dernière révision - 15/02/2018

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022