Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

URL của trang này: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607031.html

Tiêm Fulvestrant

phát âm là (ful ves 'trant)

hy có thuốc này được kê đơn không?

Tiêm Fulvestrant được sử dụng một mình hoặc kết hợp với ribociclib (Kisqali®) để điều trị một loại thụ thể hormone dương tính nhất định, ung thư vú tiến triển (ung thư vú phụ thuộc vào hormone như estrogen để phát triển) hoặc ung thư vú đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể ở phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh (thay đổi cuộc sống; kết thúc của chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng) và trước đó chưa được điều trị bằng thuốc kháng estrogen như tamoxifen (Nolvadex). Tiêm Fulvestrant cũng được sử dụng một mình hoặc kết hợp với ribociclib (Kisqali®) để điều trị dương tính với thụ thể hormone, ung thư vú tiến triển hoặc ung thư vú đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể ở những phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh và ung thư vú trở nên tồi tệ hơn sau khi họ được điều trị bằng thuốc kháng estrogen như tamoxifen. Tiêm Fulvestrant cũng được sử dụng kết hợp với palbociclib (Ibrance®) hoặc abemaciclib (Verzenio®) để điều trị ung thư vú tiến triển dương tính với thụ thể hormone ở những phụ nữ có ung thư vú đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể và trở nên tồi tệ hơn sau khi họ được điều trị bằng thuốc kháng estrogen như tamoxifen. Fulvestrant nằm trong nhóm thuốc được gọi là thuốc đối kháng thụ thể estrogen. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của estrogen trên các tế bào ung thư. Điều này có thể làm chậm hoặc ngừng sự phát triển của một số khối u vú cần estrogen để phát triển.

có nên sử dụng thuốc này không?

Fulvestrant có dạng dung dịch (chất lỏng) được tiêm chậm trong vòng 1 đến 2 phút vào cơ ở mông. Fulvestrant được quản lý bởi một bác sĩ hoặc y tá tại một văn phòng y tế. Nó thường được tiêm 2 tuần một lần trong 3 liều đầu tiên (ngày 1, 15 và 29) và sau đó mỗi tháng một lần. Bạn sẽ nhận được liều thuốc của mình dưới dạng hai lần tiêm riêng biệt (một mũi vào mỗi mông).

Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để cung cấp bản sao thông tin của nhà sản xuất cho bệnh nhân.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi nhận được người đầu tư đầy đủ,

- Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với fulvestrant, bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành phần nào trong thuốc tiêm fulvestrant. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần.

- cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến thuốc chống đông máu (chất làm loãng máu) như warfarin (Coumadin, Jantoven). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.
- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có hoặc đã từng có bất kỳ vấn đề về chảy máu hoặc bệnh gan.
- Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai hoặc dự định có thai. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các phương pháp ngừa thai mà bạn có thể sử dụng trong quá trình điều trị của mình. Bác sĩ cũng có thể kiểm tra xem bạn có thai hay không trong vòng 7 ngày trước khi bắt đầu điều trị. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn có thai trong khi điều trị với fulvestrant. Fulvestrant có thể gây hại cho thai nhi.
- nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đang cho con bú. Bạn không nên cho con bú trong thời gian điều trị với fulvestrant và trong 1 năm sau khi nhận liều cuối cùng.
- bạn nên biết rằng thuốc này có thể làm giảm khả năng sinh sản ở nam giới và phụ nữ. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro của việc nhận thuốc đầu tư.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Trừ khi bác sĩ cho bạn biết cách khác, hãy tiếp tục chế độ ăn uống bình thường của bạn.

Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Nếu bạn bỏ lỡ cuộc hẹn để nhận một liều fulvestrant, hãy gọi cho bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Fulvestrant có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

- buồn nôn
- nôn mửa
- táo bón
- bệnh tiêu chảy
- đau bụng
- ăn mất ngon
- viêm họng
- lở miệng
- yếu đuối
- nóng bừng hoặc đỏ bừng
- đau đầu
- đau ở xương, khớp hoặc lưng
- đau, đỏ hoặc sưng ở nơi bạn đã tiêm thuốc
- sưng bàn tay, bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân

- chóng mặt
- khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được
- Phiền muộn
- sự lo lắng
- lo lắng
- cảm giác tê, ngứa ran, châm chích hoặc bỏng rát trên da
- đổ mồ hôi
- chảy máu âm đạo bất thường

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức:

- hụt hơi
- đau ngực
- tổ ong
- phát ban
- ngứa
- khó thở hoặc nuốt
- sưng mặt, cổ họng, lưỡi, môi hoặc mắt
- đau ở lưng dưới hoặc chân của bạn
- tê, ngứa ran hoặc yếu ở chân của bạn
- đau ở phần trên bên phải của dạ dày
- vàng da hoặc mắt
- đau hoặc rát khi đi tiểu

Fulvestrant có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào khi dùng thuốc này.

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn.

Trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào trong phòng thí nghiệm, hãy nói với bác sĩ của bạn và nhân viên phòng thí nghiệm rằng bạn đang nhận được chất đầu tư đầy đủ.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

- Faslodex®

Sửa đổi lần cuối - 15/05/2019

Tìm hiểu cách trích dẫn trang này

Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AHFS®Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân ™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022