Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

**แผ่นพับบรรจุภัณฑ์:**
**ข้อมูลสำหรับผู้ใช้**

# ฟรูมิล®40 มก./5 มก. แท็บเล็ต

ฟูโรเซไมด์ 40 มก.
อะมิโลไรด์ ไฮโดรคลอไรด์ 5 มก.

SANOFI

**แผ่นพับนี้มองเห็นหรืออ่านยากหรือไม่**

**โทรศัพท์ 0800 035 2525 เพื่อขอความช่วยเหลือ**

**อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญสำหรับคุณ**

- เก็บแผ่นพับนี้ไว้ อาจต้องอ่านซ้ำ
- หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร
- ยานี้ได้รับการสั่งจ่ายสำหรับคุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น มันอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา แม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับของคุณ
- หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

**มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้:**

1.Frumil Tablets คืออะไรและใช้ทำอะไร

2.สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทาน Frumil Tablets
3. วิธีรับประทาน Frumil Tablets
4.ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5.วิธีเก็บ Frumil Tablets
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

## 1. แท็บเล็ต Frumil คืออะไรและใช้ทำอะไร

**แท็บเล็ต Frumil คืออะไร**
ชื่อยาของคุณคือยาเม็ด Frumil 40 มก./5 มก. ( เรียกว่ายาเม็ด Frumil ตลอดเอกสารฉบับนี้) ยาเม็ด Frumil ประกอบด้วยยาสองชนิดที่เรียกว่า: furosemide และ amiloride hydrochloride ทั้งสองอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาขับปัสสาวะ (เม็ดน้ำ)

**แท็บเล็ต Frumil ใช้สำหรับอะไร**
สามารถใช้ Frumil Tablets เพื่อหยุดการสร้างน้ำส่วนเกินในร่างกายของคุณ น้ำส่วนเกินนี้อาจทำให้ข้อเท้าบวม หายใจลำบาก และรู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติ

**แท็บเล็ต Frumil ทำงานอย่างไร**
แท็บเล็ต Frumil ทำงานโดยช่วยให้คุณส่งน้ำ ( ปัสสาวะ) มากกว่าที่คุณมักจะทำ หากน้ำส่วนเกินในร่างกายไม่ถูกกำจัดออกไป อาจทำให้หัวใจ หลอดเลือด ปอด ไต หรือตับทำงานหนักเกินไป

## 2. สิ่งที่ต้องรู้ก่อนรับประทานเม็ด Frumil

**อย่าใช้แท็บเล็ต Frumil ถ้า:** [2]
คุณแพ้ (แพ้ง่าย) ต่อ
furosemide, amiloride hydrochloride หรือส่วนผสมอื่น ๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6)
สัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ผื่น ปัญหาการกลืนหรือการหายใจ อาการบวมที่ริมฝีปาก ใบหน้า คอหรือลิ้น
[2]คุณแพ้สารซัลโฟนาไมด์ เช่น
ซัลฟาไดอะซีนหรือโคทริมอกซาโซล [2]คุณมีปัญหาร้ายแรงกับไตของคุณ [2]คุณมีปัญหาตับอย่างรุนแรง [2]คุณหมอแจ้งว่ามีอาการอ่อนแรง

ปริมาณเลือดหรือขาดน้ำ [2]คุณไม่ผ่านน้ำ ( ปัสสาวะ) [2]คุณมีโพแทสเซียมที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
โซเดียมในเลือดของคุณ (แสดงในการตรวจเลือด) [2] คุณมีอาการป่วยที่เรียกว่า 'โรคแอดดิสัน'
นี้สามารถทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและอ่อนแอ [2] คุณกำลังให้นมบุตร (ดู “การตั้งครรภ์และ
ส่วนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ด้านล่าง)
[2]คุณกำลังใช้ยาอื่นที่เปลี่ยนไป
ปริมาณโพแทสเซียมในเลือดของคุณ (ดูหัวข้อ "การใช้ยาอื่น" ด้านล่าง) [2]หากผู้ทานยาอยู่ภายใต้
18 ปี. เม็ด Frumil ไม่เหมาะสำหรับเด็ก

อย่าใช้ยาเม็ด Frumil หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา Frumil Tablets

**คำเตือนและข้อควรระวัง พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานยาเม็ด Frumil หาก:** คุณมีปัญหาในการส่งน้ำ (ปัสสาวะ) คุณอายุ 65 ปีขึ้นไป คุณมีปัญหาตับหรือไต คุณเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและ

กำลังรับประทานยาริสเพอริโดน
ด้วย คุณเป็นเบาหวาน
คุณมีความดันโลหิตต่ำหรือรู้สึกวิงเวียน
เมื่อคุณยืนขึ้น คุณมีปัญหาต่อมลูกหมาก คุณเป็นโรคเกาต์
คุณรู้สึกวิงเวียนหรือขาดน้ำ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้
หากคุณสูญเสียน้ำมากจากการป่วย ท้องเสีย หรือผ่านน้ำบ่อยมาก นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้หากคุณมีปัญหาในการดื่มหรือรับประทานอาหาร
คุณกำลังจะไปตรวจน้ำตาล คุณกำลังทานยาเม็ดน้ำอื่น ๆ คุณเป็นโรคลูปัส erythematosus อย่างเป็นระบบ คุณเป็นผู้สูงอายุหรือคุณเป็นคนอื่น
ยาที่อาจทำให้ความดันโลหิตลดลงและคุณมี

เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อความดันโลหิตลดลง

หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา Frumil

Turn Over

## ยาอื่นๆ และ Frumil Tablets

โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกำลังใช้หรือเพิ่งกำลังใช้ หรืออาจใช้ยาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มีใบสั่งยา รวมทั้งยาสมุนไพร เนื่องจากยาเม็ด Frumil อาจส่งผลต่อวิธีการทำงานของยาอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อวิธีการทำงานของเม็ดยา Frumil

**ห้ามใช้ยานี้ และแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณกำลังรับประทาน:**

- ยาที่เปลี่ยนปริมาณโพแทสเซียมในเลือดของคุณ ซึ่งรวมถึงอาหารเสริมโพแทสเซียมเช่น โพแทสเซียมคลอไรด์หรือยาเม็ดน้ำบางชนิด ( ยาขับปัสสาวะ) เช่น triamterene

**ยาต่อไปนี้อาจส่งผลต่อวิธีการทำงานของแท็บเล็ต Frumil และเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้รับผลข้างเคียง:**

- ยาเช่น ramipril, enalapril, perindopril ( เรียกว่า 'ACE inhibitors') หรือ losartan, candesartan, irbesartan (เรียกว่า 'angiotensin II receptor antagonists') แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือขอให้คุณหยุดใช้ยา
- ยาสำหรับความดันโลหิตสูงหรือปัญหาหัวใจ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ
- ยาที่ใช้เป็นยาชาทั่วไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างการผ่าตัด
- ยารักษาโรคเบาหวาน สิ่งเหล่านี้อาจใช้งานไม่ได้เช่นกันเมื่อคุณทาน Frumil Tablets
- Theophylline - ใช้สำหรับหายใจดังเสียงฮืด ๆ หรือหายใจลำบาก
- Phenytoin - ใช้สำหรับโรคลมชัก สิ่งนี้สามารถลดผลกระทบของ Frumil Tablets

**ยาต่อไปนี้สามารถเพิ่มโอกาสของผลข้างเคียงเมื่อถ่ายด้วย Frumil Tablets:**

- ลิเธียม - ใช้สำหรับอาการป่วยทางจิต เพื่อช่วยหยุดผลข้างเคียง แพทย์อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดลิเธียมและตรวจดูปริมาณลิเธียมในเลือดของคุณ
- Cisplatin - ใช้สำหรับมะเร็งบางชนิด
- ดิจอกซิน - ใช้สำหรับปัญหาหัวใจ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ

- ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) - ใช้สำหรับความเจ็บปวดและการอักเสบ เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน คีโตโพรเฟน หรืออินโดเมทาซิน
- Carbamazepine - ใช้สำหรับโรคลมชัก
- Aminoglutethimide - ใช้สำหรับมะเร็งเต้านม
- Ciclosporin - ใช้เพื่อหยุดการปฏิเสธอวัยวะหลังการปลูกถ่าย
- Methotrexate - ใช้สำหรับมะเร็งผิวหนัง โรคข้อหรือลำไส้
- Carbenoxolone - ใช้สำหรับแผลในหลอดอาหาร ( หลอดอาหาร)
- Reboxetine - ใช้สำหรับภาวะซึมเศร้า
- แอมโฟเทอริซิน - ใช้สำหรับติดเชื้อราหากใช้เป็นเวลานาน
- คอร์ติโคสเตียรอยด์ - ใช้สำหรับการอักเสบ เช่น เพรดนิโซโลน
- ชะเอมเทศ - มักใช้ในยาแก้ไอ หากรับประทานในปริมาณมาก
- Probenecid (ใช้ร่วมกับยาเอชไอวีตัวอื่น)
- ยาสำหรับการติดเชื้อ เช่น gentamicin, amikacin, neomycin, netilmicin, tobramycin, vancomycin หรือ cephalosporins ขนาดสูง
- ยาที่ใช้ฉีดก่อนการตรวจเอ็กซ์เรย์

- ยาที่ใช้รักษาอาการท้องผูก (ยาระบาย) หากใช้เป็นเวลานาน เช่น bisacodyl หรือ senna

- ยารักษาโรคหอบหืดเมื่อให้ในปริมาณที่สูง เช่น ซัลบูทามอล เทอร์บูทาลีน ซัลเฟต ซัลเมเทอรอล ฟอร์โมเทอรอล หรือแบมบูเทอรอล

- ยาเม็ดน้ำอื่นๆ (ยาขับปัสสาวะ) เช่น เบนโดรฟลูเมไทอาไซด์ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ

**การตั้งครรภ์และให้นมบุตร**

ทำ**ไม่**ใช้แท็บเล็ต Frumil หากคุณกำลังตั้งครรภ์ ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ หากคุณกำลังตั้งครรภ์ อาจตั้งครรภ์ หรือคิดว่าคุณอาจกำลังตั้งครรภ์

อย่าให้นมแม่หากคุณทานยาเม็ด Frumil

เนื่องจากปริมาณเล็กน้อยอาจผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้ พูดคุยกับแพทย์ก่อนใช้ยานี้ หากคุณกำลังให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะให้นมลูก ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำก่อนใช้ยาหากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

**การขับรถและการใช้เครื่องจักร** คุณอาจรู้สึกวิงเวียนหรือไม่สบายหลังจากรับประทานยาเม็ด Frumil หากเป็นเช่นนี้ ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ

**เม็ด Frumil ประกอบด้วย Sunset Yellow และ Lactose**

ยานี้ประกอบด้วย:

- สีที่เรียกว่า 'พระอาทิตย์ตกสีเหลือง' (E110) ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้
- แลคโตส. หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณไม่สามารถทนต่อน้ำตาลบางชนิดได้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

## 3. วิธีรับประทาน Frumil Tablets

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

**กินยาตัวนี้**

- รับประทานยานี้ทางปาก
- ดื่มน้ำเปล่าให้กลืนทั้งเม็ด

- หากคุณรู้สึกว่าผลของยาอ่อนหรือแรงเกินไป อย่าเปลี่ยนขนาดยาด้วยตนเอง แต่ควรปรึกษาแพทย์

**ต้องใช้เม็ด Frumil เท่าไหร่**

ปริมาณปกติคือหนึ่งหรือสองเม็ดในตอนเช้า แพทย์ของคุณจะบอกคุณว่าต้องกินกี่เม็ด

**หากคุณกำลังใช้ซูคราลเฟต**(ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร)

อย่าใช้ sucralfate ในเวลาเดียวกันกับ Frumil Tablets ทานยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือหลังแท็บเล็ต Frumil เนื่องจากอาจส่งผลต่อวิธีการทำงานของยาได้

**หากคุณทานยาเม็ด Frumil มากกว่าที่ควร**

หากคุณคิดว่าคุณอาจได้รับยาเม็ด Frumil มากกว่าที่ควร หรือถ้าเด็กกลืนยาเม็ดใดๆ ของคุณเข้าไป ให้แจ้งแพทย์หรือไปที่แผนกผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที อย่าลืมนำยาที่เหลือติดตัวไปด้วยเพื่อให้แพทย์รู้ว่าคุณทานอะไรไป ผลกระทบต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น: ปากแห้ง รู้สึกกระหายน้ำ ปวดกล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว รู้สึกไม่สบายหรือป่วย ( อาเจียน) หัวใจเต้นอ่อนแอหรือไม่สม่ำเสมอ รู้สึกวิงเวียน อ่อนแอหรือง่วงนอน

**หากคุณลืมทานยาเม็ด Frumil** หากคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ จากนั้นทำต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นตามปกติ อย่าใช้ยาสองครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่ลืม

**หากคุณหยุดทานยาเม็ด Frumil**

ใช้ยาเม็ด Frumil ต่อไปจนกว่าแพทย์จะแจ้งให้คุณหยุดใช้

**การตรวจเลือด**

แพทย์ของคุณอาจทำการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบว่าระดับเกลือในเลือดอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

## 4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม

**แจ้งแพทย์ทันทีหากสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อไปนี้ – คุณอาจต้องรับการรักษาพยาบาลโดยด่วน ไม่ทราบความถี่**(ไม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มีอยู่)

- หากคุณมีอาการแพ้ สัญญาณอาจรวมถึงการอักเสบของไต (ไตอักเสบ), ข้อเท้าบวมหรือความดันโลหิตสูง, ผื่นที่ผิวหนัง, สีผิวเปลี่ยนไป, ผิวหนังพุพองอย่างรุนแรง, ไวต่อแสงแดดมากกว่าปกติ, อุณหภูมิสูง (มีไข้) และมีอาการคัน

- อาการแพ้อย่างรุนแรง. อาการต่างๆ อาจรวมถึงการช็อก เช่น หายใจลำบาก ผิวเย็นชื้น สีผิวซีดและหัวใจเต้นเร็ว

- ปวดท้องหรือปวดหลังอย่างรุนแรง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของ 'ตับอ่อนอักเสบ'

- ช้าง่ายกว่า ติดเชื้อมากขึ้น รู้สึกอ่อนแรงหรือเหนื่อยมากกว่าปกติ
  Frumil Tablets อาจส่งผลต่อจำนวนเซลล์เม็ดเลือดทำให้เกิดปัญหาเลือดร้ายแรง
- กระหายน้ำมากขึ้น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะหรือหน้ามืด เป็นลม เป็นลม สับสน ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อหรืออ่อนแรง ตะคริวหรือกระตุก ปวดท้อง หรือหัวใจเต้นไม่เท่ากัน สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของการขาดน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายตามปกติของคุณ ภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดหรือ 'โรคเกาต์'

- คุณสังเกตเห็นว่าผิวหรือดวงตาของคุณเป็นสีเหลือง และปัสสาวะของคุณมีสีเข้มขึ้น สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของปัญหาตับ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาตับอยู่แล้ว อาจเกิดปัญหาตับที่ร้ายแรงกว่าที่เรียกว่าโรคไข้สมองอักเสบจากตับได้ อาการต่างๆ ได้แก่ หลงลืม พอดี อารมณ์แปรปรวน และโคม่า
- ตุ่มหรือลอกของผิวหนังบริเวณริมฝีปาก ตา ปาก จมูก และอวัยวะเพศ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และมีไข้ นี่อาจเป็นภาวะที่เรียกว่ากลุ่มอาการสตีเวนส์-จอห์นสัน ในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นของสภาพที่เรียกว่า Toxic Epidermal Necrolysis ชั้นของผิวหนังอาจลอกออกจนเหลือพื้นที่ขนาดใหญ่ของผิวหนังที่สัมผัสดิบทั่วร่างกาย

- Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) (ยาลดไข้เฉียบพลัน) อาการต่างๆ ได้แก่ ผิวหนังกลายเป็นสีแดง โดยบริเวณที่บวมมีตุ่มหนองเล็กๆ จำนวนมาก
- อาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม และหมดสติ

**แจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วที่สุด หากคุณมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้:**

**ผิดปกติ**(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน)

- หูหนวก (บางครั้งกลับไม่ได้)

**ไม่ทราบความถี่**(ไม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มีอยู่)

- ปัญหาการได้ยินหรือเสียงดังในหู (หูอื้อ). โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องไตอยู่แล้ว

- การรู้สึกเสียวซ่าหรือชาที่ผิวหนัง
- การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอารมณ์ของคุณ เช่น รู้สึกกระวนกระวายหรือวิตกกังวล
- ปวดหัว เวียนศีรษะ หรือหน้ามืดเมื่อยืนขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังเสียสมาธิ ปฏิกิริยาช้าลง ง่วงหรืออ่อนแรง มีปัญหาการมองเห็น แห้ง

  ปาก. อาจเป็นเพราะความดันโลหิตต่ำ

**บอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าผลข้างเคียงใด ๆ ต่อไปนี้ร้ายแรงหรือกินเวลานานกว่าสองสามวัน หรือหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ ไม่ทราบความถี่**(ไม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มีอยู่)

- รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้) หรือรู้สึกไม่สบายทั่วไป ท้องเสีย และป่วย (อาเจียน) และท้องผูก
- ผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากอาจสังเกตเห็นความเจ็บปวดเมื่อผ่านน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเพิ่มขึ้น

Turn Over

- หากคุณเป็นเบาหวาน คุณอาจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้น้อยลง
- ส่งน้ำ (ปัสสาวะ) มากกว่าปกติ โดยปกติจะเกิดขึ้น 1 หรือ 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยานี้
- อาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ป่วย แต่อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ: ปวดข้อและปวดข้อ ข้อต่อบวม ปวดหัว ไวต่อแสงแดดเพิ่มขึ้น ผื่นที่ผิวหนัง ปัญหาเกี่ยวกับไต อ่อนเพลียและอ่อนแรง แผลในปาก ผมร่วง วิตกกังวลและซึมเศร้า มีไข้และตอนกลางคืน เหงื่อออก, ปวดท้อง, เจ็บหน้าอก, หายใจถี่, โรคโลหิตจาง (Systemic lupus erythematosus)
- ปฏิกิริยา Lichenoid มีลักษณะเป็นรอยโรคเล็กๆ สีแดงอมม่วง รูปหลายเหลี่ยมบนผิวหนัง อวัยวะเพศ หรือในปาก

**การตรวจเลือด**
เม็ด Frumil สามารถเปลี่ยนระดับของเอนไซม์ตับหรือไขมันในร่างกายที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ที่แสดงในการตรวจเลือด

**การรายงานผลข้างเคียง**
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที่: www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App Store
โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

79392 1 - 89036012 4/4

- เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก
- ห้ามใช้ Frumil Tablets หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่องและกล่องบลิสเตอร์หลังจาก EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส เก็บแถบตุ่มในกล่องด้านนอกเพื่อป้องกันแสงและความชื้น

ไม่ควรทิ้งยาผ่านทางน้ำเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีกำจัดยาที่ไม่ต้องการอีกต่อไป มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

## 6. สิ่งของในแพ็คและอื่นๆ ข้อมูล

**แท็บเล็ต Frumil มีอะไรบ้าง**
หนึ่งในสารออกฤทธิ์ในยานี้คือ furosemide 40mg นี่คือชื่อใหม่ของฟูรูเซไมด์ 40 มก. ตัวส่วนผสมเองไม่เปลี่ยนแปลง

- สารออกฤทธิ์คือ ฟูโรเซไมด์ และ อะมิโลไรด์ ไฮโดรคลอไรด์ แต่ละเม็ดประกอบด้วย furosemide 40 มก. และ amiloride hydrochloride 5 มก. ( เป็นแอนไฮดรัส)
- ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ แลคโตส แป้งข้าวโพด ไมโครคริสตัลลีนเซลลูโลส โซเดียมสตาร์ชไกลคอลเลต แป้งโรยตัว ย้อมสีเหลืองพระอาทิตย์ตก (E110) คอลลอยด์ แอนไฮดรัส ซิลิกา และแมกนีเซียม สเตียเรต

**แท็บเล็ต Frumil มีลักษณะอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค**
แท็บเล็ต Frumil เป็นเม็ดกลมสีส้ม มีรอยจุดสม่ำเสมอพร้อมขอบมุมเอียง และ 'FRUMIL' นูนที่ด้านหนึ่ง และมีเส้นแบ่งที่อีกด้านหนึ่ง

แท็บเล็ตของคุณมีจำหน่ายในแพ็คตุ่ม 4, 7, 28, 56 และ 1400 เม็ดหรือขวดที่บรรจุ 50, 100 หรือ 500 เม็ด
ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

**ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต**

ผู้มีอำนาจทางการตลาด ซาโนฟี,

410 Thames Valley Park Drive, เรดดิ้ง,
เบิร์กเชียร์, RG6 1PT, สหราชอาณาจักร
โทรศัพท์ : 0800 035 2525
อีเมล: uk-medicalinformation@sanofi.com

ผู้ผลิต
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22,
67019 Scoppito (L'Aquila),
อิตาลี

เอกสารนี้ไม่มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยาของคุณ หากคุณมีคำถามหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งใด ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

**แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10/2020**

© ซาโนฟี, 1983 - 2020