Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

本页网址：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607002.html

吉非替尼

发音为 (ge fi' ti nib)

为什么要开这种药?

吉非替尼用于治疗某些类型肿瘤患者已扩散到身体其他部位的非小细胞肺癌。吉非替尼属于一类称为激酶抑制剂的药物。它通过阻断可能需要帮助癌细胞繁殖的某种天然物质的作用而起作用。

这个药应该怎么用?

吉非替尼以口服片剂的形式出现。它通常每天服用或不服用食物一次。每天大约在同一时间服用吉非替尼。仔细遵循处方标签上的说明，并请您的医生或药剂师解释您不理解的任何部分。完全按照指示服用吉非替尼。不要多吃或少吃，也不要比医生开的更频繁。

如果您无法吞咽药片，您可以将它们溶解在水中。将一片药片放入 4 至 8 盎司（120 至 240 毫升）的普通非碳酸饮用水中。用勺子搅拌约 15 分钟，直到药片溶解。立即喝下混合物。用另外 4 至 8 盎司（120 至 240 毫升）的水冲洗玻璃杯，并立即喝下冲洗水，以确保您吞下所有药物。

如果您遇到某些副作用，您的医生可能会延迟或永久停止您的治疗。请务必告诉您的医生您在吉非替尼治疗期间的感受。

该药的其他用途

这种药物可用于其他用途；向您的医生或药剂师咨询更多信息。

我应该遵循什么特殊的预防措施?

服用吉非替尼前，

- 如果您对吉非替尼、任何其他药物或吉非替尼片剂中的任何成分过敏，请告诉您的医生和药剂师。向您的药剂师索取成分清单。
- 告诉您的医生和药剂师您正在服用或计划服用哪些处方药和非处方药、维生素和营养补充剂。请务必提及以下任何一项：抗凝剂（“血液稀释剂”），例如华法林（Coumadin，Jantoven）；抗真菌药，例如伊曲康唑（Onmel，Sporanox）和酮康唑（Nizoral）；美托洛尔（Lopressor，Toprol XL，in

度托洛尔）；苯妥英（Dilantin，Phenytek）；和三环类抗抑郁药，如丙咪嗪（Tofranil）和阿米替林。许多其他药物可能与吉非替尼相互作用，因此请务必告诉您的医生您正在服用的所有药物，即使是未出现在此列表中的药物。您的医生可能需要改变您的药物剂量或仔细监测您的副作用。

- 如果您正在服用抗酸剂或 H_2用于治疗消化不良、胃灼热或溃疡的阻滞剂药物，例如西咪替丁 (Tagamet)、法莫替丁 (Pepcid)、尼扎替丁 (Axid) 或雷尼替丁 (Zantac)，请在服用吉非替尼前至少 6 小时或服用后 6 小时服用。
- 如果您正在服用质子泵抑制剂药物治疗消化不良、胃灼热或溃疡，例如埃索美拉唑 (Nexium)、兰索拉唑 (Prevacid)、奥美拉唑 (Prilosec)、泮托拉唑 (Protonix) 或雷贝拉唑 (AcipHex)，至少服用 12 小时在服用吉非替尼之前或之后至少 12 小时。
- 如果您患有或曾经患有肺纤维化（肺部瘢痕）或其他肺部或呼吸问题、眼睛或视力问题或肝脏疾病，请告诉您的医生。
- 如果您怀孕或计划怀孕，请告诉您的医生。吉非替尼可能导致女性不育（难以怀孕）。但是，您应该在使用吉非替尼治疗期间以及停止服药后至少 2 周内使用避孕措施来预防怀孕。如果您在服用吉非替尼期间怀孕，请致电您的医生。吉非替尼可能会伤害胎儿并增加流产的风险。
- 如果您正在母乳喂养，请告诉您的医生。服用吉非替尼期间不应进行母乳喂养。

我应该遵循特殊的饮食说明吗？

除非您的医生另有说明，否则请继续您的正常饮食。

如果我忘记服药该怎么办？

记住后立即服用错过的剂量。但是，如果距下一次服药不到 12 小时，请跳过错过的服药并继续您的常规服药计划。不要服用双倍剂量来弥补错过的剂量。

这种药物会引起副作用吗？

吉非替尼可能会引起副作用。如果这些症状中的任何一个严重或不会消失，请告诉您的医生：

- 皮肤干燥
- 瘙痒
- 皮疹
- 粉刺
- 口腔溃疡
- 弱点

一些副作用可能很严重。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医生或接受紧急医疗：

- 新的或恶化的呼吸急促、咳嗽或发烧
- 严重或持续腹泻

- 严重的腹痛
- 食欲不振
- 眼睛疼痛、发红或刺激
- 视力变化
- 水汪汪的大眼睛
- 眼睛对光的敏感性
- 麻疹
- 水泡或脱皮
- 眼睛、脸、嘴唇、舌头、喉咙、手、手臂、脚、脚踝或小腿肿胀
- 恶心
- 呕吐
- 皮肤或眼睛发黄
- 深色尿液
- 大便苍白
- 右上腹部疼痛或不适

吉非替尼可能会引起其他副作用。如果您在服用这种药物时有任何异常问题，请致电您的医生。

我应该知道这种药物的储存和处置吗？

将这种药物放在它进来的容器中，紧紧关闭，并且放在儿童接触不到的地方。将其存放在室温下，远离过多的热量和水分（不要放在浴室里）。

不需要的药物应以特殊方式处理，以确保宠物、儿童和其他人无法食用。但是，您不应该将这种药物冲入马桶。相反，处置药物的最佳方式是通过药物回收计划。与您的药剂师交谈或联系您当地的垃圾/回收部门，了解您所在社区的回收计划。请参阅 FDA 的药品安全处置网站（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) 如果您无权访问回收计划，请了解更多信息。

将所有药物放置在儿童看不到和接触不到的地方很重要，因为许多容器（例如每周服用药丸的容器以及用于滴眼液、面霜、贴片和吸入器的容器）不适合儿童使用，而且幼儿可以轻松打开它们。为保护幼儿免受中毒，请始终锁上安全帽，并立即将药物放在安全的位置——一个向上、远离、看不见和够不到的地方。http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n 紧急情况/过量

如果服用过量，请拨打毒物控制热线 1-800-222-1222。信息也可在线获取https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. 如果受害者已经倒下，

癫痫发作、呼吸困难或无法唤醒，请立即拨打 911 拨打紧急服务电话。

我应该知道其他信息吗？

与您的医生和实验室保持所有约会。您的医生会下令进行某些实验室测试，以检查您的身体对吉非替尼的反应。

不要让其他人服用您的药物。向您的药剂师询问有关重新配药的任何问题。

保留一份您正在服用的所有处方药和非处方药（非处方药）以及任何产品（如维生素、矿物质或其他膳食补充剂）的书面清单非常重要。每次去看医生或住院时，您都应该携带这份清单。这也是在紧急情况下随身携带的重要信息。

兰特名称

- 易瑞沙®

最后修订 - 2015 年 12 月 15 日

了解如何引用此页面

美国卫生系统药剂师协会免责声明

AHFS®患者用药信息™。© 版权所有，2022。美国卫生系统药剂师协会®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, 马里兰州。版权所有。复制

用于商业用途必须获得 ASHP 的授权。

国家医学图书馆 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 美国卫生与公众服务部

美国国立卫生研究院

最后更新页面：2022 年 3 月 25 日