TITLE - GOSERELIN ACETATE / ZOLADEX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Source : Medicines Org UK

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

ゾラデックスLA 10.8mgインプラント
ゴセレリン

あなたにとって重要な情報が含まれているので、この薬を使い始める前に、このリーフレットのすべてを注意深く読んでください。

- このリーフレットを保管してください。もう一度読む必要があるかもしれません。
- さらに質問がある場合は、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。
- この薬はあなただけのために処方されました。他人に渡さないでください。彼らの病気の兆候があなたのものと同じであっても、それは彼らに害を及ぼす可能性があります。
- 副作用が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作用が含まれます。セクション4を参照してください。

このリーフレットの内容：

1. Zoladex LAとは何か、そしてそれは何のために使われるのか
2.ZoladexLAを使用する前に知っておくべきこと
3.ゾラデックスLAの使用方法
4.起こりうる副作用
5.ゾラデックスLAの保存方法
6.パックの内容およびその他の情報

このリーフレットの情報のほとんどは、男性と女性の両方に適用されます。

- 情報が男性にのみ適用される場合は、「男性の情報」という見出しで示されます。
- 情報が女性にのみ適用される場合は、「女性向けの情報」という見出しで示されます。

1. Zoladex LAとは何か、そしてそれは何のために使われるのか

Zoladex LAには、ゴセレリンと呼ばれる薬が含まれています。これは「LHRHアナログ」と呼ばれる薬のグループに属しています。

男性によるゾラデックスLAの使用
男性では、ゾラデックスLAは前立腺がんの治療に使用されます。それはあなたの体によって生成される「テストステロン」（ホルモン）の量を減らすことによって働きます。

女性によるゾラデックスLAの使用 女性では、ゾラデックスLAは次の目的で使用されます。

- ホルモン依存性の早期および進行性乳がんを治療します。

女性の場合、ゾラデックスLAは、体が生成する「エストロゲン」（ホルモン）の量を減らすことで機能します。

2.ZoladexLAを使用する前に知っておくべきこと

ZoladexLAを使用しないでください。

- ゴセレリンまたはこの薬の他の成分のいずれかにアレルギーがある場合（セクション6に記載されています）。
- 妊娠中または授乳中の場合（下記の「妊娠と授乳」のセクションを参照）。

上記のいずれかに該当する場合は、ZoladexLAを使用しないでください。よくわからない場合は、ゾラデックスLAを服用する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。

警告と注意事項

病院に行く場合は、ZoladexLAを使用していることを医療スタッフに伝えてください。

Zoladex LAを使用する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。

- 高血圧の場合。
- 心臓のリズムの問 題（不整脈）を含む心臓または血管の状態がある場合、またはこれらの状態の薬で治療されている場合。Zoladex LAを使用すると、不整脈のリスクが高まる可能性があります。
- 骨の強度に影響を与える状態がある場合、特にあなたが大酒飲み、喫煙者である場合、骨粗鬆症の家族歴がある場合（骨の強度に影響を与える状態）、食事が不十分であるか、抗けいれん薬を服用している（てんかんまたは発作のための薬）またはコルチコステロイド（ステロイド）。

重度の可能性があるゾラデックスを服用している患者のうつ病の報告があります。ゾラデックスを服用していて、気分が落ち込んでいる場合は、医師に相談してください。

このタイプの薬は、骨のカルシウムの減少（骨の薄化）を引き起こす可能性があります。

子供

ZoladexLAは子供に与えられるべきではありません。

男性向け情報

Zoladexを使用する前に、医師、薬剤師、または看護師に相談してください。

- 尿（水）の通過に問題がある場合、または背中に問題がある場合。
- 糖尿病の場合。女

性のための情報

- 治療開始時の乳がんの症状の悪化。これには、痛みの増加や影響を受けた組織のサイズの増加が含まれる場合があります。これらの効果は通常長くは続かず、ゾラデックスLAによる治療を続けると通常は消えます。ただし、症状が続く場合や不快な場合は、**医師に相談してください**。

その他の医薬品とゾラデックスLA

医師、薬剤師、または看護師に、他の薬を服用している、最近服用した、または服用する可能性があるかどうかを伝えてください。これには、処方箋なしで購入した薬や漢方薬が含まれます。

Zoladex LAは、心臓のリズムの問 題を治療するために使用されるいくつかの薬（キニジン、プロカインアミド、アミオダロン、ソタロールなど）を妨害したり、他の薬（メタドン（痛みの緩和や薬物の一部に使用）など）と併用すると心臓のリズムの問 題のリスクを高める可能性があります中毒無害化）、モキシフロキサシン（抗生物質）、重篤な精神疾患に使用される抗精神病薬）。

妊娠、授乳、出生力

- 妊娠中または授乳中の方はゾラデックスを服用しないでください。
- 妊娠しようとしている場合は、ゾラデックスを服用しないでください（不妊症の治療の一部としてゾラデックスが使用されている場合を除く）。
- Zoladexを服用している間は、「ピル」（経口避妊薬）を使用しないでください。コンドームやダイヤフラム（キャップ ）などの避妊のバリア方法を使用します。

機械の運転と使用

Zoladex LAは、ツールやマシンを運転または使用できることに影響を与える可能性はありません。

3.ゾラデックスLAの使用方法

- Zoladex LA 10.8 mgインプラントは、12週間ごとに胃の皮膚の下に注入されます。これはあなたの医師または看護師によって行われます。
- 気分が良くても、ゾラデックスLA治療を継続することが重要です。

- あなたの医者があなたがやめる時が来たと決定するまで、この治療を受け続けてください。
- Zoladex LAは、アロマターゼ阻害剤による治療を開始する少なくとも6〜8週間前に開始する必要があり、アロマターゼ阻害剤による治療全体を通して継続する必要があります。

あなたの次の予定

- あなたは12週間ごとにゾラデックスLA注射を与えられるべきです。
- 次の注射の予約をするように、常に医師または看護師に思い出させてください。
- 前回の注射から12週間前または12週間後の次の注射の予約が与えられた場合は、医師または看護師に伝えてください。
- 最後の注射から12週間以上経過している場合は、できるだけ早く注射を受けることができるように、医師または看護師に連絡してください。

4.起こりうる副作用

すべての薬と同様に、この薬は副作用を引き起こす可能性がありますが、誰もがそれらを得るわけではありません。

次の副作用は男性または女性で発生する可能性があります。

アレルギー反応：

これらはまれです。症状には、次の突然の発症が含まれる場合があります。

- 皮膚の発疹、かゆみ、じんましん。
- 顔、唇、舌、または体の他の部分の腫れ。
- 息切れ、喘鳴、または呼吸困難。これがあなたに起こった場合、**すぐに医師の診察を受けてください**。

Zoladex LAの注射後、注射部位の損傷（腹部の血管の損傷を含む）が報告されています。非常にまれなケースですが、これにより重度の出血が発生します。**すぐに医師に連絡してください**次の症状のいずれかが発生した場合：

- 腹痛。
- 腹部膨満。
- 呼吸困難。
- めまい。
- 低血圧および/または意識レベルの変化。

その他の考えられる副作用：

非常に一般的（10人に1人以上に影響を与える可能性があります）

- ほてりと発汗。時折、これらの副作用はゾラデックスを止めた後しばらくの間（おそらく数ヶ月）続くかもしれません。
- 性欲減退とインポテンス。
- Zoladex LAが注射された場所の痛み、あざ、出血、発赤または腫れ。

一般的（10人に1人まで影響を受ける可能性があります）

- 腰の痛みや尿の通過の問題。これが発生した場合、**医師に相談してください**。
- 治療開始時の骨の痛み。これが発生した場合、**医師に相談してください**。
- 治療開始時のがんの症状の一時的な悪化。
- あなたの骨を薄くします。
- 血糖値が上昇します。
- 指やつま先がチクチクする。
- 皮膚の発疹。
- 脱毛。
- 体重の増加。
- 関節の痛み。

- 心臓機能または心臓発作の減少。
- 血圧の変化。
- あなたの胸の腫れと柔らかさ。
- 気分の変化（うつ病を含む）。

非常にまれです（10,000人に1人まで影響する可能性があります）

- 幻覚（そこにないものを見たり、感じたり、聞いたりする）、思考障害、性格の変化など、精神病性障害と呼ばれる精神医学的問題。これは非常にまれです。

- 頭に下垂体の腫瘍が発生した場合、またはすでに下垂体に腫瘍がある場合は、ゾラデックスLAによって腫瘍が出血または崩壊することがあります。これらの影響は非常にまれです。下垂体腫瘍は、激しい頭痛、気分や病気、視力喪失、無意識を引き起こす可能性があります。

不明（頻度は入手可能なデータから推定できない）

- あなたの血の変化。
- 黄疸を含む肝臓の問題。
- 胸の痛みや息切れを引き起こす肺の血栓。
- 肺の炎症。症状は肺炎のようなものかもしれません（息切れや咳など）。

- ECGの変化（QT延長）。

男性向け情報

次の副作用は男性で発生する可能性があります： **非常に一般的**
（10人に1人以上に影響を与える可能性があります）

- インポテンス。

一般的（10人に1人まで影響を受ける可能性があります）

- 腰の痛みや尿の通過の問題。これが発生した場合、**医師に相談してください**。
- 治療開始時の骨の痛み。これが発生した場合、**医師に相談してください**。
- 心臓機能または心臓発作の減少。
- あなたの胸の腫れと柔らかさ。
- 血糖値が上昇します。

女性のための情報

次の副作用は女性に起こる可能性があります： **非常に一般的**
（10人に1人以上に影響を与える可能性があります）

- 膣の乾燥。
- 胸のサイズの変更。
- にきびは非常に一般的に報告されています（多くの場合、治療開始から1か月以内）。

一般的（10人に1人まで影響を受ける可能性があります）

- 頭痛。

まれ（1,000人に1人まで影響を受ける可能性があります）

- 痛みを引き起こす可能性のある卵巣の小さな嚢胞（腫れ）。これらは通常、治療なしで消えます。
- 一部の女性は、ゾラデックスLAによる治療の初期に閉経に入り、ゾラデックスLAの治療を中止しても生理が戻りません。

不明（頻度は入手可能なデータから推定できない）

- 膣からの出血。これは、ゾラデックスLAを開始してから最初の月に発生する可能性が最も高く、自然に停止するはずです。ただし、それが続く場合、または不快な場合は、**医師に相談してください**。
- 痛みなどの子宮筋腫の症状のわずかな増加。

考えられる副作用のこのリストを気にしないでください。あなたはそれらのどれも手に入れられないかもしれません。

副作用の報告

副作用が出た場合は、医師、薬剤師、看護師に相談してください。これには、このリーフレットに記載されていない可能性のある副作用が含まれます。イエローカードスキーム、ウェブサイトから直接副作用を報告することもできます：www.mhra.gov.uk/yellowcard または、GooglePlayまたはAppleAppStoreでMHRAイエローカードを検索してください。副作用を報告することにより、この薬の安全性に関するより多くの情報を提供するのに役立ちます。

5.ゾラデックスLAの保存方法

- あなたの医者はあなたに処方箋を与えるかもしれません。そうすればあなたは薬局からあなたの薬を手に入れ、あなたが彼または彼女に再び会ったときにあなたの医者にそれを与えることができます。
- この薬は子供の視界や手の届かないところに保管してください。
- 元のパッケージに保管し、シールを破らないでください。
- 25°C以上で保管しないでください。
- カートンに記載されている有効期限が切れた後は、この薬を使用しないでください。有効期限とは、その月の最終日を指します。
- 廃水や家庭ごみで薬を捨てないでください。使用しなくなった薬を捨てる方法を薬剤師に尋ねてください。これらの対策は、環境保護に役立ちます。

6.パックの内容およびその他の情報

Zoladex LA10.8mgインプラントに含まれるもの

有効成分はゴセレリンです。各ZoladexLA10.8 mgインプラントには、10.8mgのゴセレリンが含まれています。他の成分は、不活性物質であるラクチド/グリコリド共重合体です。

Zoladex LA10.8mgインプラントの外観とパックの内容

Zoladex LA 10.8 mgインプラントは、事前に充填された注射器にインプラント（非常に小さなペレット）として付属しており、医師または看護師がすぐに使用できます。

Zoladex LA 10.8 mgインプラントは、1つのインプラント（注射）のパックで製造されます。

販売承認取得者

AstraZeneca UK Limited、
600 Capability Green、
ルートン、LU1 3LU、
イギリス。

メーカー

AstraZeneca UK Limited、
Silk Road Business Park、
Macclesfield、Cheshire、
SK10 2NA、
イギリス。

このリーフレットは2021年11月に最後に改訂されました

©アストラゼネカ2021

Zoladexは、アストラゼネカグループの登録商標です。

ONC 21 0036a

その他の情報源

点字でこのリーフレットのコピーを聞く、またはリクエストするには、大きな活字または音声で、無料で電話してください。

0800 198 5000（英国のみ）

次の情報を提供する準備をしてください。

商品名	**Zoladex LA10.8mgインプラント**
参照番号	17901/0065

これは、英国王立盲人協会が提供するサービスです。