

Source : Medicines Org UK

Disclaimer : Document presented by [www.911GlobalMeds.com](http://www.911GlobalMeds.com)



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

## **Золадекс ЛА-Имплантат 10,8 мг**

гозерелин

**Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать использовать это лекарство, потому что она содержит важную информацию для вас.**

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.
- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.
- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже если их признаки болезни такие же, как у вас.
- Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

### **Что в этой брошюре:**

1. Что представляет собой Золадекс ЛА и для чего он применяется
2. Что нужно знать перед применением Золадекса ЛА
3. Как использовать Золадекс ЛА
4. Возможные побочные эффекты
5. Как хранить Золадекс ЛА
6. Содержимое упаковки и прочая информация

Большая часть информации в этой брошюре относится как к мужчинам, так и к женщинам.

- Если информация относится только к мужчинам, она указывается под заголовком **Информация для мужчин**.
- Если информация относится только к женщинам, она указывается под заголовком **Информация для женщин**.

#### **1. Что представляет собой Золадекс ЛА и для чего он применяется**

Zoladex LA содержит лекарство под названием гозерелин. Он принадлежит к группе препаратов, называемых «аналогами ЛГРГ».

##### **Использование Zoladex LA мужчинами**

У мужчин Zoladex LA используется для лечения рака предстательной железы. Он работает за счет уменьшения количества «тестостерона» (гормона), который вырабатывается вашим телом.

##### **Использование Zoladex LA женщинами**

У женщин Zoladex LA используется для:

- Лечение раннего и распространенного рака молочной железы, гормонозависимого.

У женщин Zoladex LA работает, уменьшая количество «эстрогена» (гормона), который вырабатывается вашим телом.

## **2. Что нужно знать перед применением Золадекса ЛА**

### **Не используйте Zoladex LA:**

- если у вас аллергия на гозерелин или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6).
- если вы беременны или кормите грудью (см. раздел «Беременность и кормление грудью» ниже).

Не принимайте Zoladex LA, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Zoladex LA.

#### **Предупреждения и меры предосторожности**

Если вы пойдете в больницу, сообщите медицинскому персоналу, что вы принимаете Zoladex LA.

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой перед использованием Zoladex LA:

- если у вас высокое кровяное давление.
- если у вас есть какие-либо заболевания сердца или кровеносных сосудов, в том числе проблемы с сердечным ритмом (аритмия), или вы лечитесь лекарствами от этих состояний. При применении Золадекса ЛА может повышаться риск возникновения проблем с сердечным ритмом.
- Если у вас есть какое-либо заболевание, влияющее на прочность ваших костей, особенно если вы сильно пьете, курите, у вас есть семейный анамнез остеопороза (состояние, которое влияет на прочность ваших костей), вы плохо питаетесь или принимаете противосудорожные препараты ( лекарства от эпилепсии или припадков) или кортикостероиды (стероиды).

Были сообщения о тяжелой депрессии у пациентов, принимающих Золадекс. Если вы принимаете Золадекс и у вас развивается депрессивное настроение, сообщите об этом своему врачу.

Лекарства этого типа могут вызывать снижение содержания кальция в костях (истончение костей).

## Дети

Zoladex LA не следует назначать детям.

### Информация для мужчин

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой перед использованием Золадекса:

- если у вас проблемы с мочеиспусканием (водой) или проблемы со спиной.
- если у вас диабет.

### Информация для женщин

- Ухудшение симптомов рака молочной железы в начале лечения. Это может включать усиление боли или увеличение размера пораженной ткани. Эти эффекты обычно не длятся долго и обычно исчезают по мере продолжения лечения Золадексом ЛА. Однако, если симптомы продолжают или вы испытываете дискомфорт, **поговори со своим врачом.**

## Другие лекарства и Золадекс ЛА

Сообщите своему врачу, фармацевту или медсестре, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие лекарства. Сюда входят лекарства, которые вы покупаете без рецепта, и лекарственные травы.

Zoladex LA может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, используемыми для лечения нарушений сердечного ритма (например, хинидин, новокаиномид, амиодарон и соталол), или может повышать риск нарушений сердечного ритма при использовании с некоторыми другими препаратами (например, метадон (используется для обезболивания и частью лекарственного средства), детоксикации от зависимости), моксифлоксацин (антибиотик), нейролептики, применяемые при тяжелых психических заболеваниях).

### Беременность, кормление грудью и фертильность

- Не принимайте Золадекс, если вы беременны или кормите грудью.
- Не принимайте Золадекс, если вы пытаетесь забеременеть (если Золадекс не используется как часть лечения бесплодия).
- Не принимайте «таблетки» (оральные контрацептивы) во время приема Золадекса. Используйте барьерные методы контрацепции, такие как презерватив или диафрагма (колпачок).

### Вождение и использование машин

Zoladex LA вряд ли повлияет на вашу способность управлять автомобилем или использовать какие-либо инструменты или машины.

## 3. Как использовать Золадекс ЛА

- Имплантат Zoladex LA 10,8 мг будет вводиться под кожу живота каждые 12 недель. Это сделает ваш врач или медсестра.
- Важно, чтобы вы продолжали лечение Zoladex LA, даже если вы чувствуете себя хорошо.

- Продолжайте это лечение, пока ваш врач не решит, что вам пора остановиться.
- Прием Золадекса ЛА следует начинать не менее чем за 6–8 недель до начала лечения ингибитором ароматазы и продолжать в течение всего периода лечения ингибитором ароматазы.

#### **Ваша следующая встреча**

- Вам следует делать инъекцию Zoladex LA каждые 12 недель.
- Всегда напоминайте врачу или медсестре о назначении следующей инъекции.
- Если вы назначены на следующую инъекцию раньше или позже, чем через 12 недель после последней инъекции, сообщите об этом своему врачу или медсестре.
- Если с момента последней инъекции прошло более 12 недель, обратитесь к врачу или медсестре, чтобы как можно скорее получить инъекцию.

#### **4. Возможные побочные эффекты**

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

#### **Следующие побочные эффекты могут возникать у мужчин и женщин:**

##### **Аллергические реакции:**

Это редкость. Симптомы могут включать внезапное начало:

- Сыпь, зуд или крапивница на коже.
- **Отек лица, губ или языка или других частей тела.**
- Одышка, свистящее дыхание или затрудненное дыхание. Если

это случится с тобой, **немедленно обратитесь к врачу.**

Сообщалось о травмах в месте инъекции (включая повреждение кровеносных сосудов в брюшной полости) после инъекции Золадекса ЛА. В очень редких случаях это вызывало сильное кровотечение. **Немедленно обратитесь к врачу** если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов:

- **Боль в животе.**
- **Вздутие живота.**
- Сбивчивое дыхание.
- Головокружение.
- Низкое кровяное давление и/или любые измененные уровни сознания.

##### **Другие возможные побочные эффекты:**

#### **Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)**

- Приливы жара и потливость. Иногда эти побочные эффекты могут сохраняться в течение некоторого времени (возможно, месяцев) после прекращения приема Золадекса.
- Снижение полового влечения и импотенция.
- Боль, кровоподтеки, кровотечение, покраснение или отек в месте инъекции Zoladex LA.

#### **Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)**

- Боль в пояснице или проблемы с мочеиспусканием. Если это произойдет, **поговори со своим врачом.**
- Боль в костях в начале лечения. Если это произойдет, **поговори со своим врачом.**
- **Временное ухудшение симптомов вашего рака в начале лечения.**
- Истончение ваших костей.
- Повышается уровень сахара в крови.
- Покалывание в пальцах рук или ног.
- Кожные высыпания.
- Выпадение волос.
- Увеличение веса.
- Боль в суставах.

- Снижение функции сердца или сердечный приступ.
- Изменения артериального давления.
- **Набухание и болезненность груди.**
- Изменения настроения (включая депрессию).

#### **Очень редко (может затронуть до 1 из 10 000 человек)**

- Психиатрические проблемы, называемые психотическими расстройствами, которые могут включать галлюцинации (видение, осязание или слух вещей, которых нет), беспорядочные мысли и изменения личности. Это очень редко.
- Развитие опухоли гипофиза в голове или, если у вас уже есть опухоль в гипофизе, Золадекс ЛА может вызвать кровотечение или коллапс опухоли. Эти эффекты очень редки. Опухоли гипофиза могут вызывать сильные головные боли, плохое самочувствие или тошноту, потерю зрения и потерю сознания.

#### **Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)**

- Изменения в вашей крови.
- Проблемы с печенью, включая желтуху.
- Сгусток крови в легких, вызывающий боль в груди или одышку.
- Воспаление легких. Симптомы могут быть похожи на пневмонию (например, одышка и кашель).
- Изменения на ЭКГ (удлинение интервала QT).

#### **Информация для мужчин**

У мужчин могут возникать следующие побочные эффекты: **Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)**

- Импотенция.

#### **Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)**

- Боль в пояснице или проблемы с мочеиспусканием. Если это произойдет, **поговори со своим врачом.**
- Боль в костях в начале лечения. Если это произойдет, **поговори со своим врачом.**
- Снижение функции сердца или сердечный приступ.
- **Набухание и болезненность груди.**
- Повышается уровень сахара в крови.

#### **Информация для женщин**

У женщин могут возникать следующие побочные эффекты:

#### **Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)**

- Сухость влагалища.
- Изменение размера груди.
- Очень часто сообщалось об акне (часто в течение одного месяца после начала лечения).

#### **Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)**

- Головные боли.

#### **Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000)**

- Небольшие кисты (опухоли) на яичниках, которые могут вызывать боль. Обычно они исчезают без лечения.
- У некоторых женщин менопауза наступает рано во время лечения Золадексом ЛА, и их менструации не возобновляются после прекращения лечения Золадексом ЛА.

#### **Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)**

- Кровотечение из влагалища. Скорее всего, это произойдет в первый месяц после начала приема Золадекса ЛА и должно прекратиться само по себе. Однако, если это продолжается или вам неудобно, **поговори со своим врачом.**
- Незначительное усиление симптомов миомы, таких как боль.

Не беспокойтесь об этом списке возможных побочных эффектов. Вы можете не получить ни один из них.

#### **Сообщение о побочных эффектах**

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему желтой карточки, веб-сайт: [www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard) или найдите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store..

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

## **5. Как хранить Золадекс ЛА**

- Ваш врач может выписать вам рецепт, чтобы вы могли получить лекарство в аптеке и передать его своему врачу, когда вы снова встретитесь с ним или с ней.
- Храните это лекарство в недоступном для детей месте.
- Храните его в оригинальной упаковке и не нарушайте печать.
- Не храните его при температуре выше 25°C.
- Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню этого месяца.
- Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочая информация**

### **Что содержит имплантат Zoladex LA 10,8 мг**

Активное вещество – гозерелин. Каждый имплантат Zoladex LA 10,8 мг содержит 10,8 мг гозерелина. Другим ингредиентом является сополимер лактида/гликолида, который является неактивным веществом.

### **Как выглядит имплантат Zoladex LA 10,8 мг и что содержится в упаковке**

Имплантат Zoladex LA 10,8 мг поставляется в виде имплантата (очень маленькая таблетка) в предварительно заполненном шприце, готовом для использования врачом или медсестрой.

Zoladex LA 10,8 mg Implant выпускается в упаковках по одному имплантату (инъекционному).

#### **Держатель регистрационного удостоверения**

AstraZeneca UK Limited,  
600 Capability Green,  
Лутон, LU1 3LU,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

#### **Производитель**

AstraZeneca UK Limited,  
бизнес-парк Silk Road,  
Маклсфилд, Чешир,  
SK10 2NA,

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Эта брошюра последний раз редактировалась в 11/2021

© АстраЗенека 2021

Золадекс является зарегистрированным товарным знаком группы компаний «АстраЗенека».

ОНК 21 0036а

#### **Другие источники информации**

Чтобы прослушать или запросить копию этой брошюры шрифтом Брайля, крупным шрифтом или в аудиоформате, позвоните по бесплатному телефону:

0800 198 5000 (только для Великобритании)

Будьте готовы предоставить следующую информацию:

Наименование товара	<b>Zoladex LA 10,8 мг Имплантат</b>
Справочный номер	17901/0065

Это услуга, предоставляемая Королевским национальным институтом слепых.