Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com

Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : Medicines Org UK

Zoladex LA 10.8 مجم غرسة

جوسريلين

اقرأهذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبةلك.

- احتفظبهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذاكانت لديك أسئلة أخرى ، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة.
- تموصف هذا الدواء لك فقط. لا تنقلها للأخرين. فهو قد يضرهم ، حتى لو كانت أعراض مرضهم هي نفس أعراضك.
- إذاعانيت من أي آثار جانبية ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غيرمذكورة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

ماهو في هذه النشرة:

1.ما هو Zoladex LA وما هي دواعي استخدامه
2.ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام Zoladex LA
3.كيفية استخدام Zoladex LA
4.الآثار الجانبية المحتملة
5.كيفية تخزين Zoladex LA
6.محتويات العبوة ومعلومات أخرى

تنطبقمعظم المعلومات الواردة في هذه النشرة على كل من الرجال والنساء.

- عندماتنطبق المعلومات على الرجال فقط ، يتم عرضها في العنوان معلومات للرجال.
- عندماتنطبق المعلومات على النساء فقط ، يتم عرضها في العنوان "معلومات خاصة بالنساء".

1.ما هو Zoladex LA وما هي دواعي استخدامه

يحتويZoladex LA على دواء يسمى goserelin. ينتمي هذا إلى مجموعة من الأدوية تسمى "نظائر LHRH".

استخدامZoladex LA من قبل الرجال

فيالرجال ، يستخدم Zoladex LA لعلاج سرطان البروستاتا. إنه يعمل عن طريق تقليل كمية هرمون التستوستيرونالذي ينتجه جسمك.

استخدامZoladex LA من قبل النساء في

النساء ،يستخدم Zoladex LA من أجل:

- علاجسرطان الثدي المبكر والمتقدم الذي يعتمد على الهرمونات.

فيالنساء ، يعمل Zoladex LA عن طريق تقليل كمية "هرمون الاستروجين" (هرمون) الذي ينتجه جسمك.

2.ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام Zoladex LA

لاتستخدم Zoladex LA:

- إذاكان لديك حساسية من goserelin أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم 6).
- إذاكنت حاملاًأو مرضعة (أنظري قسم "الحمل والرضاعة" أدناه).

لاتملك Zoladex LA إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك. إذا لم تكن متأكداً ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أوالممرضة قبل تناول Zoladex LA.

المحاذيروالإحتياطات

إذاذهبت إلى المستشفى ، أخبر الطاقم الطبي أنك تتناول Zoladex LA.

تحدثإلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة قبل استخدام Zoladex LA:

- إذاكنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.
- إذاكنت تعاني من أي أمراض في القلب أو الأوعية الدموية ، بما في ذلك مشاكل ضربات القلب (عدم انتظام ضرباتالقلب) ، أو كنت تعالج بأدوية لهذه الحالات. قد يزداد خطر حدوث مشاكل في ضربات القلب عند استخدامZoladex LA.
- إذاكنت تعاني من أي حالة تؤثر على قوة عظامك ، خاصةً إذا كنت تشرب بكثرة ، أو مدخناً ، أو لديك تاريخ عائليمن مرض هشاشة العظام (حالة تؤثر على قوة عظامك) ، أو إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً سيئاً أو تتناولمضادات الاختلاج (أدوية الصرع أو النوبات) أو الكورتيكوستيرويدات (المنشطات).

كانتهناك تقارير عن الاكتئاب لدى المرضى الذين يتناولون Zoladex والذي قد يكون شديداً. إذا كنت تتناولZoladex وتطور مزاج مكتئب ، أخبر طبيبك.

يمكنللأدوية من هذا النوع أن تسبب انخفاض في الكالسيوم في العظام (ترقق العظام).

أطفال
لاينبغي إعطاء Zoladex LA للأطفال.

معلوماتللرجال
تحدثإلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة قبل استخدام Zoladex:

- إذاكان لديك مشاكل في التبول (الماء) أو مشاكل في ظهرك.
- إذاكنت تعاني من مرض

السكري.معلومات للمرأة

- تفاقمأعراض سرطان الثدي لديك في بداية العلاج. يمكن أن يشمل ذلك زيادة الألم أو زيادة حجم الأنسجة المصابة.لا تدوم هذه التأثيرات طويلاً عادةً وعادةً ما تختفي مع استمرار العلاج بـ Zoladex LA. ومع ذلك ، إذا استمرتالأعراض أو كنت غير مرتاح ،**تحدث مع طبيبك**.

الأدويةالأخرى و Zoladex LA

أخبرطبيبك أو الصيدلي أو الممرضة إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي أدوية أخرى. يشمل ذلكالأدوية التي تشتريها بدون وصفة طبية وأدوية عشبية.

قديتداخل Zoladex LA مع بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل ضربات القلب (مثل الكينيدين ، وبروكيناميد ،وأميودارون ، وسوتالول) أو قد يزيد من خطر حدوث مشاكل في ضربات القلب عند استخدامه مع بعضالأدوية الأخرى (مثل الميثادون (يستخدم لتخفيف الآلام وجزء من الدواء) إزالة السموم من الإدمان) ، موكسيفلوكساسين(مضاد حيوي) ، مضادات الذهان المستخدمة للأمراض العقلية الخطيرة).

الحملوالرضاعة والخصوبة

- لاتتناول Zoladex إذا كنت حاملاًأو مرضعة.
- لاتتناولي Zoladex إذا كنت تحاولين الحمل (ما لم يتم استخدام Zoladex كجزء من علاج العقم).

- لاتستخدمي "حبوب منع الحمل" (موانع الحمل الفموية) أثناء تناولك Zoladex. استخدمي وسائل منع الحمل ،مثل الواقي الذكري أو العازل الأنثوي (الغطاء).

السياقةواستعمال الماكنات
منغير المحتمل أن يؤثر Zoladex LA على قدرتك على القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات.

3.كيفية استخدام Zoladex LA

- سيتمحقن غرسة Zoladex LA 10.8 mg تحت الجلد على معدتك كل 12 أسبوعاً. سيقوم طبيبك أو ممرضتكبذلك.
- منالمهم أن تستمر في تلقي علاج Zoladex LA ، حتى لو كنت تشعر بصحة جيدة.

- استمرفي تناول هذا العلاج حتى يقرر طبيبك أن الوقت قد حان للتوقف.
- يجبأن يبدأ Zoladex LA قبل 6-8 أسابيع على الأقل من بدء العلاج بمثبطات الأروماتاز ويجب أن يستمرطوال العلاج بمثبط الأروماتيز.

موعدكالقادم

- يجبأن تحصل على حقنة Zoladex LA كل 12 أسبوعاً.
- قمدائماً بتذكير الطبيب أو الممرضة بتحديد موعد لحقنك التالي.
- إذاتم تحديد موعد لحقنك التالي أي قبل أو بعد 12 أسبوعاً من آخر حقنة ، أخبر طبيبك أو ممرضتك.
- إذامر أكثر من 12 أسبوعاً على آخر حقنة ، فاتصل بطبيبك أو ممرضتك حتى تتمكن من تلقي حقنك في أسرعوقت ممكن.

4.الآثار الجانبية المحتملة

مثلجميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

يمكنأن تحدث الآثار الجانبية التالية عند الرجال أو النساء:

ردودالفعل التحسسية:
هذهنادرة. يمكن أن تشمل الأعراض ظهور مفاجئ لما يلي:
- طفحجلدي أو حكة أو خلايا على الجلد.
- تورمفي الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم.
- ضيقفي التنفس أو أزيز أو صعوبة في التنفس. إذا

حدثهذا لك ،**راجع الطبيب على الفور**.

تمالإبلاغ عن إصابة موقع الحقن (بما في ذلك تلف الأوعية الدموية في البطن) بعد حقن Zoladex LA. وقد تسببهذا في حالات نادرة جداً في حدوث نزيف حاد.**اتصل بطبيبك على الفور**إذا واجهت أياً من الأعراض التالية:
- وجعبطن.
- انتفاخفي البطن.
- ضيقفي التنفس.
- دوخة.
- انخفاضضغط الدم و / أو أي تغيرات في مستويات الوعي.

الآثارالجانبية المحتملة الأخرى:
شائعجداً (**قد يصيب أكثر من 1 من كل 10 أشخاص**)
- الهباتالساخنة والتعرق. من حين لآخر ، قد تستمر هذه الآثار الجانبية لبعض الوقت (ربما أشهر) بعد إيقافZoladex.
- انخفاضالدافع الجنسي والعجز الجنسي.
- ألم ،كدمات ، نزيف ، احمرار أو تورم حيث يتم حقن Zoladex LA.

شائعة(**قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص**)
- ألمفي أسفل الظهر أو مشاكل في التبول. اذا حدث هذا،**تحدث مع طبيبك**.
- آلامالعظام في بداية العلاج. اذا حدث هذا،**تحدث مع طبيبك**.
- تدهورمؤقت لأعراض السرطان في بداية العلاج.
- ترققعظامك.
- ارتفاعمستويات السكر في الدم.
- وخزفي أصابع يديك أو أصابع قدميك.
- طفحجلدي.
- تساقطالشعر.
- زيادةالوزن.
- ألمفي المفاصل.

- انخفاضوظائف القلب أو النوبة القلبية.
- تغيراتفي ضغط الدم.
- تورموحنان ثدييك.
- تغيراتفي مزاجك (بما في ذلك الاكتئاب).

نادرةجداً (**قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10000 شخص**)
- مشاكلنفسية تسمى الاضطرابات الذهانية والتي قد تشمل الهلوسة (رؤية أو الشعور أو سماع أشياء غير موجودة) والأفكار المضطربة وتغيرات الشخصية. هذا نادر جدا.

- تطورورم في الغدة النخامية في رأسك ، أو إذا كان لديك بالفعل ورم في الغدة النخامية ، فقد يتسبب LA Zoladex في نزيف الورم أو انهياره. هذه الآثار نادرة جدا. يمكن أن تسبب أورام الغدة النخامية صداعاً شديداً ،والشعور أو المرض ، وفقدان البصر وفقدان الوعي.

غيرمعروف (**لا يمكن تقدير التردد من البيانات المتاحة**)

- تغييراتفي دمك.
- مشاكلالكبد بما في ذلك اليرقان.
- جلطةدموية في رئتيك تسبب ألماً في الصدر أو ضيقاً في التنفس.
- التهابفي الرئتين. قد تكون الأعراض مثل الالتهاب الرئوي (مثل الشعور بضيق في التنفس والسعال).

- التغييراتفي تخطيط القلب (إطالة كيو تي).

معلوماتللرجال

يمكنأن تحدث الآثار الجانبية التالية عند الرجال: **شائع جداً** (
قديصيب أكثر من 1 من كل 10 أشخاص)
- ضعفجنسي.

شائعة(**قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص**)
- ألمفي أسفل الظهر أو مشاكل في التبول. اذا حدث هذا،**تحدث مع طبيبك**.
- آلامالعظام في بداية العلاج. اذا حدث هذا،**تحدث مع طبيبك**.
- انخفاضوظائف القلب أو النوبة القلبية.
- تورموحنان ثدييك.
- ارتفاعمستويات السكر في الدم.

معلوماتللمرأة

يمكنأن تحدث الآثار الجانبية التالية عند النساء: **شائع جداً**
(**قد يصيب أكثر من 1 من كل 10 أشخاص**)
- جفافالمهبل.
- تغيرفي حجم الثدي.
- تمالإبلاغ عن ظهور حب الشباب بشكل شائع (غالباً خلال شهر واحد من بدء العلاج).

شائعة(**قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص**)
- الصداع.

نادرة(**قد تظهر لدى حتى 1 من كل 1000 شخص**)
- تكيساتصغيرة (انتفاخات) على المبيضين يمكن أن تسبب الألم. وعادة ما تختفي هذه دون علاج.

- تدخلبعض النساء سن اليأس مبكراً أثناء العلاج بـ Zoladex LA ، ولا تعود فتراتهن إلى ما بعد توقف العلاج بـZoladex LA.

غيرمعروف (**لا يمكن تقدير التردد من البيانات المتاحة**)

- نزيفمن المهبل. من المرجح أن يحدث هذا في الشهر الأول بعد بدء Zoladex LA ويجب أن يتوقف من تلقاءنفسه. ومع ذلك ، إذا استمر أو كنت غير مرتاح ،**تحدث مع طبيبك**.
- زيادةطفيفة في أعراض الأورام الليفية ، مثل الألم.

لاتقلق من هذه القائمة من الآثار الجانبية المحتملة. قد لا تحصل على أي منهم.

التبليغعن الأعراض الجانبية
إذاعانيت من أي آثار جانبية ، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورةفي هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً عبر موقع الويب Yellow Card Scheme: www.mhra.gov.uk/yellowcard أو ابحث عن MHRA Yellow Card في Google Play أو Apple App Store.
منخلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية ، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5.كيفية تخزين Zoladex LA

- قديعطيك طبيبك وصفة طبية حتى تتمكن من الحصول على أدويتك من الصيدلية وإعطائها لطبيبك عندماتراه مرة أخرى.
- احفظهذا الدواء بعيداً عن أنظار ومتناول أيدي الأطفال.
- احتفظبها في عبوتها الأصلية ولا تكسر الختم.
- لاتقم بتخزينه فوق 25 درجة مئوية.
- لاتستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكرتون. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخيرمن نفس الشهر.
- لاتتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدويةالتي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

6.محتويات العبوة ومعلومات أخرى

مايحتويه Zoladex LA 10.8 mg Implant
المادةالفعالة هي goserelin. كل غرسة Zoladex LA 10.8 mg تحتوي على 10.8 مجم goserelin. المكون الآخرهو اللاكتيد / جليكوليد كوبوليمر وهو مادة غير فعالة.

كيفيبدو Zoladex LA 10.8 mg Implant ومحتويات العبوة
يأتيZoladex LA 10.8 mg غرسة كغرسة (حبيبة صغيرة جداً) في حقنة مملوءة مسبقاً ، جاهزة للاستخدام من قبلالطبيب أو الممرضة.

يتمإنتاج Zoladex LA 10.8 mg Implant في عبوات من غرسة واحدة (حقنة).

صاحبترخيص التسويق

AstraZeneca UK Limited
600 Capability Green،
لوتون، LU1 3LU ،
المملكةالمتحدة.

الصانع

AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business ،
Park، Macclesfield
Cheshire، SK10 2NA، ،
المملكةالمتحدة.

تمتعديل هذه النشرة لآخر مرة في 11/2021

© AstraZeneca2021

.AstraZeneca هي علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركات Zoladex

ONC 21 0036a

مصادرأخرى للمعلومات

للاستماعإلى هذه النشرة أو طلب نسخة منها بطريقة برايل ، بأحرف كبيرة أو بالصوت ،يرجى الاتصال مجاناً:

1980800 5000 (المملكة المتحدة فقط)

يرجىالاستعداد لتقديم المعلومات التالية:

اسمالمنتج	**مجمغرسة Zoladex LA 10.8**
رقمالمرجع	17901/0065

هذهخدمة مقدمة من المعهد الوطني الملكي للمكفوفين.