



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682826.html>

הזרקת הפרין מבוטא כמו (הפ' א רין)

היי האם נרשמה תרופה זו?

הפרין משמש למניעת היווצרות קרישי דם אצל אנשים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים או שעוברים הליכים רפואיים מסוימים המגבירים את הסיכוי להיווצרות קרישים. הפרין משמש גם לעצירת הצמיחה של קרישים שכבר נוצרו בכלי הדם, אך לא ניתן להשתמש בו כדי להקטין את גודל הקרישים שכבר נוצרו. הפרין משמש גם בכמויות קטנות כדי למנוע היווצרות קרישי דם בצנתרים (צינורות פלסטיק קטנים שדרכם ניתן לתת תרופות או לשאוב דם) שנשארים בוורידים לאורך תקופה. הפרין הוא בקבוצה של תרופות הנקראות נוגדי קרישה ('מדללי דם'). זה פועל על ידי הפחתת יכולת הקרישה של הדם.

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

הפרין מגיע כתמיסה (נוזל) להזרקה לווריד (לווריד) או עמוק מתחת לעור וכתמיסה מדוללת (פחות מרוכזת) להזרקה לצנתרים תוך ורידיים. אין להזריק הפרין לשריר. לעיתים מוזרק הפרין פעם אחת עד שש פעמים ביום ולעיתים ניתן בהזרקה איטית ומתמשכת לווריד. כאשר הפרין משמש למניעת היווצרות קרישי דם בצנתרים תוך ורידיים, הוא משמש בדרך כלל כאשר הצנתר מותקן לראשונה, ובכל פעם שהדם נשאב מהקטטר או ניתנת תרופה דרך הצנתר.

הפרין עשוי להינתן לך על ידי אחות או ספק שירותי בריאות אחר, או שיאמר לך להזריק את התרופה לבד בבית. אם תזריק הפרין בעצמך, ספק שירותי בריאות יראה לך כיצד להזריק את התרופה. שאל את הרופא, האחיות או הרוקח אם אינך מבין את ההנחיות הללו או שיש לך שאלות כלשהן לגבי היכן בגופך עליך להזריק הפרין, כיצד להזריק או כיצד להיפטר ממחטים ומזרקים משומשים לאחר הזרקת התרופה.

אם תזריק הפרין בעצמך, עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. השתמש בהפרין בדיוק לפי ההוראות. אין להשתמש יותר או פחות ממנו או להשתמש בו לעיתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא שלך.

תמיסת הפרין מגיעה בעוצמות שונות, ושימוש בחוזק שגוי עלול לגרום לבעיות חמורות. לפני מתן הזרקת הפרין, בדוק את תווית האריזה כדי לוודא שזה עוצמת תמיסת הפרין שהרופא שלך רשם לך. אם חוזק הפרין אינו נכון אל תשתמש בהפרין והתקשר מיד לרופא או לרוקח.

הרופא שלך עשוי להגדיל או להקטין את המינון שלך במהלך הטיפול בהפרין. אם תזריק הפרין בעצמך, וודא שאתה יודע כמה תרופות עליך להשתמש.

השימושים בתרופה זו

הפרין משמש לעתים גם לבד או בשילוב עם אספירין כדי למנוע אובדן הריון ובעיות אחרות אצל נשים הרות הסובלות ממצבים רפואיים מסוימים ושסבלו מבעיות אלו בהריונות המוקדמים שלהן. שוחח עם הרופא או הרוקח על הסיכונים בשימוש בתרופה זו לטיפול במצבך.

תרופה זו עשויה להירשם לשימושים אחרים; שאל את הרופא או הרוקח לקבלת מידע נוסף.

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני השימוש בהפרין,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי להפרין, כל תרופה אחרת, מוצרי בקר, מוצרי חזיר או כל אחד מהמרכיבים בהזרקת הפרין. שאל את הרופא או הרוקח שלך עבור רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא ולרוקח אילו תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ויטמינים, תוספי תזונה ומוצרי צמחים אתה לוקח או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהבאים: נוגדי קרישה אחרים כגון וורפרין (קומדין); אנטיהיסטמינים (מוצרי שיעול והצטננות רבים); (antithrombin III) Thrombate III; אספירין או מוצרים המכילים אספירין ותרופות נוגדות דלקת לא סטרואידליות אחרות (NSAIDs) כגון איבופרופן (אדוויל, מוטרין) ונפרוקסן (Aleve, Naprosyn); דיקסטרו; דיגוקסין (Digitek, Lanoxin); דיפירידמול (פרסנטי, באגרנוקס); הידרוקסיכלורוקין (Plaquenil); אינדומטצין (Indocin); פנילבוטזון (אזוליד) (לא זמין בארה"ב); כינין; ואנטיבייטיקה של טרציקלין כגון דמקלוציקלין (דקלומיצין), דוקסיציקלין (מונודוקס, ויברמיצין), מינוציקלין (דינאצין, Minocin) וטרציקלין (Bristacycline, Sumycin). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי.
- ספר לרופא שלך אם יש לך רמה נמוכה של טסיות דם (סוג של תאי דם הדרושים לקרישה תקינה) בדם ואם יש לך דימום כבד שלא ניתן לעצור בשום מקום בגוף. הרופא שלך עשוי לומר לך לא להשתמש בהפרין.
- ספר לרופא שלך אם אתה חווה כעת את הווסת שלך; אם יש לך חום או זיהום; ואם עברת לאחרונה ברז עמוד השדרה (הסרה של כמות קטנה מהנוזל השוטף את חוט השדרה כדי לבדוק זיהום או בעיות אחרות), הרדמה בעמוד השדרה (מתן תרופות נגד כאבים באזור סביב עמוד השדרה), ניתוח, במיוחד מערב המוח, חוט השדרה או העין, או התקף לב. ספר גם לרופא שלך אם יש לך או הייתה לך אי פעם הפרעת דימום כגון המופיליה (מצב שבו הדם אינו נקשר כרגיל), מחסור באנטיטרומבין III (מצב הגורם להיווצרות קרישי דם), קרישי דם ברגליים, בריאות, או בכל מקום בגוף, חבורות חריגות או כתמים סגולים מתחת לעור, סרטן, כיבים בקיבה או במעי, צינור שמנקז את הקיבה או המעי, לחץ דם גבוה,
- ספר לרופא שלך אם אתה בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן השימוש בהפרין, התקשר לרופא שלך.
- אם אתה עובר ניתוח, כולל ניתוח שיניים, ספר לרופא או לרופא השיניים שאתה משתמש בהפרין.
- ספר לרופא שלך אם אתה מעשן או משתמש במוצרי טבק ואם אתה מפסיק לעשן בכל עת במהלך הטיפול בהפרין. עישון עשוי להפחית את היעילות של תרופה זו.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

אלא אם כן הרופא שלך אומר לך אחרת, המשך בתזונה הרגילה שלך.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

אם תזריק הפרין בעצמך בבית, שוחח עם הרופא שלך מה עליך לעשות אם תשכח להזריק מנה.

התרופה יכולה לגרום לתופעות לוואי?

הפרין עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם אחד מהתסמינים הללו חמור או לא חולף:

- אדמומיות, כאבים, חבורות או פצעים במקום שבו הופרין הוזרק
- איבוד שיער

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים האלה, התקשר לרופא שלך מיד:

- חבורות או דימום חריגים
- הקאות מדממות או שנראות כמו שאריות קפה
- צואה המכילה דם אדום בוהק או שחורה זפתית
- דם בשתן
- עייפות יתר
- בחילה
- הקאה
- כאבים בחזה, לחץ או אי נוחות בלחיצה
- אי נוחות בזרועות, בכתף, בלסת, בצוואר או בגב
- להשתעל דם
- הזעה מוגברת
- כאב ראש חמור פתאומי
- סחרחורת או עילפון
- אובדן פתאומי של שיווי משקל או קואורדינציה
- בעיה פתאומית בהליכה
- חוסר תחושה או חולשה פתאומיים של הפנים, הזרוע או הרגל, במיוחד בצד אחד של הגוף
- בלבול פתאומי, או קושי בדיבור או בהבנת דיבור
- קושי לראות בעיניים אחת או בשתייהן
- שינוי צבע העור סגול או שחור

- כאב ושינוי צבע כחול או כהה בזרועות או ברגליים
- גירוד וצריבה, במיוחד בחלק התחתון של כפות הרגליים
- צמרמורת
- חום
- כוורות
- פריחה
- צפצופים
- קוצר נשימה
- קשיי נשימה או בליעה
- צרודות
- זקפה כואבת שנמשכת שעות

הפרין עלול לגרום לאוסטאופורוזיס (מצב בו העצמות נחלשות ועלולות להישבר בקלות), במיוחד אצל אנשים המשתמשים בתרופה במשך זמן רב. שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים בשימוש בתרופה זו.

הפרין עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן השימוש בתרופה זו.

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

אם תזריק הפרין בבית, הרופא שלך יגיד לך כיצד לאחסן את התרופה. בצע את ההנחיות האלה בזהירות. הקפד לשמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה). אין להקפיא הפרין.

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם.

<http://www.upandaway.org>]<http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכניות החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>)]<http://goo.gl/c4Rm4p>].

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help> [https://www.poisonhelp.org/help]. אם הקורבן התמוטט, עבר התקף, מתקשה לנשום או לא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול:

- דימום מהאף
- דם בשתן
- צואה שחורה וזפתית
- חבורות קלות
- דימום חריג
- דם אדום בצואה
- הקאות מדממות או שנראות כמו שאריות קפה

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובת הגוף שלך להפריין. הרופא שלך עשוי לבקש ממך לבדוק את הדם בצואה שלך באמצעות בדיקה ביתית.

לפני ביצוע בדיקת מעבדה כלשהי, ספר לרופא שלך ולצוות המעבדה שאתה משתמש בהפריין.

אל תיתן לאף אחד אחר להשתמש בתרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כמו ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- ליפו-הפין®¹
- ליקוואמין®¹
- פאנהפריין®¹

¹מוצר ממותג זה אינו זמין עוד בשוק. חלופות גנריות עשויות להיות זמינות.

מתוקן לאחרונה - 15/09/2017

למד כיצד לצטט דף זה



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc. כתב ויתור](#)

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

הספרייה הלאומית לרפואה 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 מחלקת הבריאות ושירותי האנוש האמריקאית

המכונים הלאומיים לבריאות

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022