



Express Medicine Shipments, Globally!

FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[家 → 薬、ハーブ、サプリメント](#) → ヘパリン注射

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL : <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682826.html>

ヘパリン注射

(hep'a rin) と発音します

なぜこの薬が処方されているのですか？

ヘパリンは、特定の病状を持っている人、または血栓が形成される可能性を高める特定の医療処置を受けている人に血栓が形成されるのを防ぐために使用されます。ヘパリンは、血管内にすでに形成されている血塊の成長を止めるためにも使用されますが、すでに形成されている血塊のサイズを縮小するために使用することはできません。ヘパリンはまた、一定期間静脈に残されたカテーテル（薬剤を投与したり採血したりできる小さなプラスチックチューブ）に血栓が形成されるのを防ぐために少量使用されます。ヘパリンは、抗凝固剤（「抗凝血剤」）と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは血液の凝固能力を低下させることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

ヘパリンは、静脈内（静脈内）または皮膚の深部に注入される溶液（液体）として、また静脈内カテーテルに注入される希薄な（低濃度の）溶液として提供されます。ヘパリンは筋肉に注入されるべきではありません。ヘパリンは1日に1〜6回注射されることもあれば、ゆっくりと継続的に静脈に注射されることもあります。静脈内カテーテルで血栓が形成されるのを防ぐためにヘパリンを使用する場合、通常、カテーテルを最初に留置するときに使用し、カテーテルから血液を抜いたり、カテーテルから薬剤を投与したりするたびに使用します。

ヘパリンは、看護師または他の医療提供者からあなたに与えられるかもしれませんが、あるいはあなたは家であなた自身で薬を注射するように言われるかもしれません。自分でヘパリンを注射する場合は、医療提供者が薬の注射方法を説明します。これらの指示がわからない場合や、ヘパリンを注射する必要がある場所、注射の方法、または薬を注射した後に使用済みの針や注射器を処分する方法については、質問がある場合は、医師、看護師、または薬剤師に尋ねてください。

自分でヘパリンを注射する場合は、処方ラベルの指示に注意深く従って、医師または薬剤師に理解できない部分について説明するように依頼してください。指示どおりにヘパリンを使用してください。それを多かれ少なかれ使用したり、医師の処方よりも頻繁に使用したりしないでください。

ヘパリン溶液にはさまざまな強度があり、間違った強度を使用すると深刻な問題が発生する可能性があります。ヘパリンを注射する前に、パッケージラベルをチェックして、医師が処方したヘパリン溶液の強度であることを確認してください。ヘパリンの強度が正しくない場合は、ヘパリンを使用せず、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。

あなたの医者はあなたのヘパリン治療の間にあなたの線量を増減するかもしれません。自分でヘパリンを注射する場合は、使用する薬の量を知っていることを確認してください。

この薬の用途

ヘパリンは、特定の病状があり、以前の妊娠でこれらの問題を経験した妊婦の妊娠喪失やその他の問題を防ぐために、単独で、またはアスピリンと組み合わせて使用されることもあります。あなたの状態を治療するためにこの薬を使用することのリスクについてあなたの医者または薬剤師に相談してください。

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

ヘパリンを使用する前に、

- ヘパリン、その他の医薬品、牛肉製品、豚肉製品、またはヘパリン注射の成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては、医師または薬剤師にご相談ください。
- 医師と薬剤師に、処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品、および服用中または服用予定のハーブ製品を伝えてください。次のいずれかに必ず言及してください。ワルファリン（クマディン）などの他の抗凝固剤。抗ヒスタミン薬（多くの咳や風邪薬に含まれる）；アンチトロンビンIII（トロンビン酸III）；アスピリンまたはアスピリン含有製品、およびイブプロフェン（Advil、Motrin）やナプロキセン（Aleve、Naprosyn）などの他の非ステロイド性抗炎症薬（NSAID）。デキストラン；ジゴキシン（Digitek、Lanoxin）；ジピリダモール（ペルサンチン、アグレノックス）；ヒドロキシクロロキン（プラケニル）；インドメタシン（インドシン）；フェニルブタゾン（アゾリド）（米国では利用できません）；キニーネ；デメクロサイクリン（デクロマイシン）、ドキシサイクリン（モノドックス、ビブラマイシン）、ミノサイクリン（ダイナシン、ミノサイクリン）およびテトラサイクリン（プリスタサイクリン、スミシン）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。
- 血中の血小板（正常な凝固に必要な血球の種類）のレベルが低い場合や、出血がひどくて体のどこにも止まらない場合は、医師に相談してください。あなたの医者はあなたにヘパリンを使わないように言うかもしれません。
- あなたが現在月経期間を経験しているかどうかを医師に伝えてください。発熱や感染症がある場合。最近、脊髄タッピング（感染やその他の問題をテストするために脊髄を浸す少量の液体を取り除く）、脊椎麻酔（脊椎周辺の鎮痛剤の投与）、手術、特に脳、脊髄または眼、または心臓発作を伴う。また、血友病（血液が正常に凝固しない状態）、抗トロンビンIII欠乏症（血液凝固を引き起こす状態）、脚、肺の血液凝固などの出血性疾患があるか、またはこれまでに経験したことがあるかどうかを医師に伝えてください。または体のどこか、皮膚の下の異常なあざや紫色の斑点、癌、胃や腸の潰瘍、胃や腸を排出する管、高血圧、
- あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。ヘパリンの使用中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。
- 歯科手術を含む手術を受けている場合は、ヘパリンを使用していることを医師または歯科医に伝えてください。
- タバコ製品を喫煙または使用するかどうか、およびヘパリンによる治療中はいつでも喫煙をやめるかどうかを医師に伝えてください。喫煙はこの薬の効果を低下させる可能性があります。

特別な食事の指示に従うべきですか？

医師の指示がない限り、通常の食事を続けてください。

服用を忘れた場合はどうすればいいですか？

自宅でヘパリンを注射する場合は、注射を忘れた場合の対処方法について医師に相談してください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

ヘパリンは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- ヘパリンが注射された場所の発赤、痛み、あざ、または痛み
- 脱毛

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 異常なあざや出血
- 血が混じっている、またはコーヒーかすのように見える嘔吐物
- 真っ赤な血が入っている、または黒くてタリーなスツール
- 血尿
- 過度の倦怠感
- 吐き気
- 嘔吐
- 胸の痛み、圧迫感、または圧迫感
- 腕、肩、あご、首、または背中の不快感
- 血を吐く
- 過度の発汗
- 突然の激しい頭痛
- 立ちくらみまたは失神
- バランスや協調の突然の喪失
- 突然の歩行困難
- 顔、腕、脚の突然のしびれや脱力感、特に体の片側
- 突然の混乱、または会話や会話の理解の困難
- 片目または両目で見づらい
- 紫または黒の皮膚の変色

- 腕や脚の痛みや青または濃い変色
- 特に足の裏のかゆみと灼熱感
- 寒気
- 熱
- じんましん
- 発疹
- 喘鳴
- 呼吸困難
- 呼吸困難または嚥下困難
- 嘔声
- 何時間も続く痛みを伴う勃起

ヘパリンは、特に長期間薬を使用している人に、骨粗鬆症（骨が弱くなり、壊れやすい状態）を引き起こす可能性があります。この薬を使用するリスクについて医師に相談してください。

ヘパリンは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の使用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

自宅でヘパリンを注射する場合は、医療提供者が薬の保管方法を教えてくれます。これらの指示に注意深く従ってください。この薬は、入った容器に入れ、しっかりと閉じて、子供の手の届かないところに保管してください。室温で、過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。ヘパリンを凍結しないでください。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸入器など）は子供に耐性がなく、幼児は簡単に開けることができるため、すべての薬を子供の手の届かないところに置いておくことが重要です。幼児を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

ペット、子供、その他の人がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な方法で処分する必要があります。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の方法は、薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/リサイクル部門に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください（<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) 回収プログラムにアクセスできない場合の詳細については。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には次のものがあります。

- 鼻血
- 血尿
- 黒、タリースツール
- あざがでやすい
- 異常な出血
- 便中の赤い血
- 血が混じっている、またはコーヒーかすのように見える嘔吐物

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。あなたの医者はヘパリンに対するあなたの体の反応をチェックするために特定の臨床検査を命じます。医師は、在宅検査を使用して血液がないか便をチェックするように依頼する場合があります。

臨床検査を受ける前に、ヘパリンを使用していることを医師と検査官に伝えてください。

他の人にあなたの薬を使わせないでください。処方箋の補充について質問がある場合は、薬剤師に尋ねてください。

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- Lipo-Hepin®¶
- リケミン®¶
- パンヘパリン®¶

¶-このブランドの製品はもう市場に出ていません。一般的な代替手段が利用できる場合があります。

最終改訂日-2017年9月15日

[このページを引用する方法を学ぶ](#)



[American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項](#)

AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省

国立衛生研究所

ページの最終更新日：2022年3月25日