

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Injecție cu heparină

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682826.html>

## **Injecție cu heparină** **pronunțat ca (hep' a rin)**

### **de ce este prescris acest medicament?**

Heparina este utilizată pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge la persoanele care au anumite afecțiuni medicale sau care sunt supuse anumitor proceduri medicale care cresc șansa ca cheaguri să se formeze. Heparina este, de asemenea, utilizată pentru a opri creșterea cheagurilor care s-au format deja în vasele de sânge, dar nu poate fi utilizată pentru a scădea dimensiunea cheagurilor care s-au format deja. Heparina este, de asemenea, utilizată în cantități mici pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge în catetere (tuburi mici de plastic prin care se pot administra medicamente sau se poate extrage sânge) care rămân în vene pe o perioadă de timp. Heparina face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticoagulante („diluante ai sângelui”).

Aționează prin scăderea capacității de coagulare a sângelui.

### **cum trebuie utilizat acest medicament?**

Heparina vine ca o soluție (lichid) pentru a fi injectată intravenos (într-o venă) sau profund sub piele și ca o soluție diluată (mai puțin concentrată) pentru a fi injectată în cateterele intravenoase. Heparina nu trebuie injectată într-un mușchi. Heparina este uneori injectată de una până la șase ori pe zi și uneori administrată ca injecție lentă și continuă în venă. Atunci când heparina este utilizată pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge în cateterele intravenoase, este de obicei utilizată atunci când cateterul este prima dată la locul său și de fiecare dată când sângele este extras din cateter sau medicamentul este administrat prin cateter.

Heparina vă poate fi administrată de o asistentă medicală sau de un alt furnizor de asistență medicală sau vi se poate spune să vă injectați singur medicamentul acasă. Dacă vă veți injecta singur heparină, un furnizor de asistență medicală vă va arăta cum să injectați medicamentul. Adresați-vă medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni sau aveți întrebări despre locul în care ar trebui să vă injectați heparina, cum să faceți injecția sau cum să eliminați acele și seringile uzate după injectarea medicamentului.

Dacă vă veți injecta singur heparină, urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați heparină exact conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Soluția de heparină vine în diferite concentrații, iar utilizarea unei concentrații greșite poate cauza probleme grave. Înainte de a administra o injecție cu heparină, verificați eticheta ambalajului pentru a vă asigura că este concentrația soluției de heparină pe care medicul dumneavoastră v-a prescris-o. Dacă concentrația heparinei nu este corectă, nu utilizați heparina și sunați imediat medicul sau farmacistul.

Medicul dumneavoastra va poate creste sau reduce doza in timpul tratamentului cu heparina. Daca va veti injecta singur heparina, asigurati-va ca stiti cat de mult medicament ar trebui sa utilizati.

### există utilizări pentru acest medicament

Heparina este, de asemenea, uneori utilizată singură sau în combinație cu aspirina pentru a preveni pierderea sarcinii și alte probleme la femeile însărcinate care au anumite afecțiuni medicale și care s-au confruntat cu aceste probleme în sarcinile anterioare. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre riscurile utilizării acestui medicament pentru a vă trata starea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

## ce precauții speciale ar trebui să urmez?

### Înainte de a utiliza heparina,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la heparina, orice alte medicamente, produse din carne de vită, produse din carne de porc sau oricare dintre ingredientele injectate cu heparina. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: alte anticoagulante, cum ar fi warfarina (Coumadin); antihistaminice (în multe produse pentru tuse și răceală); antitrombina III (Trombat III); aspirina sau produse care conțin aspirina și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin) și naproxen (Aleve, Naprosyn); dextran; digoxină (Digitek, Lanoxin); dipiridamol (Persantine, în Aggrenox); hidroxiclorochină (Plaquenil); indometacin (Indocin); fenilbutazonă (Azolid) (nu este disponibilă în SUA); chinină; și antibiotice tetraciline, cum ar fi demeclociclina (Declomycin), doxiciclina (Monodox, Vibramycin), minociclina (Dynacin, Minocin) și tetraciclina (Bristacycline, Sumycin). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți un nivel scăzut de trombocite (tip de celule sanguine necesare pentru coagularea normală) în sânge și dacă aveți sângerări abundente care nu pot fi oprite nicăieri în corpul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu utilizați heparina.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți în prezent perioada menstruală; dacă aveți febră sau o infecție; și dacă ați avut recent o puncție spinală (eliminarea unei cantități mici de lichid care scaldă măduva spinării pentru a testa infecția sau alte probleme), rahianestezie (administrarea de medicamente pentru durere în zona din jurul coloanei vertebrale), intervenții chirurgicale, în special care implică creierul, măduva spinării sau ochiul sau un atac de cord. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o tulburare de sângerare, cum ar fi hemofilia (afecțiune în care sângele nu se coagulează în mod normal), deficit de antitrombină III (afecțiune care provoacă formarea cheagurilor de sânge), cheaguri de sânge la nivelul picioarelor, plămânilor, sau oriunde în corp, vânătăi neobișnuite sau pete violete sub piele, cancer, ulcere în stomac sau intestin, un tub care drenează stomacul sau intestinul, hipertensiune arterială,
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce utilizați heparina, sunați la medicul dumneavoastră.
- dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați heparina.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă fumați sau utilizați produse din tutun și dacă vă opriți la fumat în orice moment în timpul tratamentului cu heparina. Fumatul poate reduce eficacitatea acestui medicament.

## ce instructiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

## ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă vă veți injecta singur heparină acasă, discutați cu medicul dumneavoastră despre ce ar trebui să faceți dacă uitați să vă injectați o doză.

## ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

**Heparina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispere:**

- roșeață, durere, vânătăi sau răni la locul în care a fost injectată heparina
- Pierderea parului

**Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:**

- vânătăi sau sângerări neobișnuite
- vărsături sângeroase sau care arată ca zațul de cafea
- scaun care conține sânge roșu aprins sau este negru și gudron
- sânge în urină
- oboseala excesiva
- greață
- vărsături
- durere în piept, presiune sau disconfort de strângere
- disconfort la nivelul brațelor, umărului, maxilarului, gâtului sau spatelui
- tuse cu sânge
- transpirație excesivă
- durere de cap severă bruscă
- amețeli sau leșin
- pierderea bruscă a echilibrului sau a coordonării
- probleme bruște la mers
- amorțeală sau slăbiciune bruscă a feței, brațului sau piciorului, în special pe o parte a corpului
- confuzie bruscă sau dificultăți de a vorbi sau de a înțelege vorbirea
- dificultăți de vedere la unul sau ambii ochi
- decolorarea pielii violet sau negru

- durere și decolorare albastră sau închisă la nivelul brațelor sau picioarelor
- mâncărime și arsuri, în special la nivelul picioarelor
- frisoane
- febră
- urticarie
- eczemă
- respirație șuierătoare
- dificultăți de respirație
- dificultăți de respirație sau de înghițire
- răgușeală
- erecție dureroasă care durează ore întregi

Heparina poate provoca osteoporoză (afecțiune în care oasele devin slabe și se pot rupe cu ușurință), în special la persoanele care folosesc medicamentul pentru o perioadă lungă de timp. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament.

Heparina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce utilizați acest medicament.

## ce ar trebui să știi despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Dacă vă veți injecta heparină acasă, medicul dumneavoastră vă va spune cum să păstrați medicamentul. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție. Asigurați-vă că păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Nu înghețați heparina.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

## n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

## Simptomele supradozajului pot include:

- sângerare nazale
- sânge în urină
- scaune negre, gudronate
- vânătăi ușoare
- sângerare neobișnuită
- sânge roșu în scaune
- vărsături sângeroase sau care arată ca zațul de cafea

## ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la heparină. Medicul dumneavoastră vă poate cere să vă verificați scaunul pentru sânge folosind un test la domiciliu.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că utilizați heparină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

## nume rand

- Lipo-Hepin®¶
- Liquaemin®¶
- Panheparina®¶

¶-Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.

Ultima revizuire - 15.09.2017

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

---

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022