



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

عنوان URL لهذه الصفحة: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682826.html>

حقن الهيبارين تنطق باسم (hep 'a rin)

لماذا وصف هذا الدواء؟

يستخدم الهيبارين لمنع تكون الجلطات الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة أو الذين يخضعون لإجراءات طبية معينة تزيد من فرصة تكوين الجلطات. يستخدم الهيبارين أيضاً لوقف نمو الجلطات التي تكونت بالفعل في الأوعية الدموية ، ولكن لا يمكن استخدامه لتقليل حجم الجلطات التي تكونت بالفعل. يستخدم الهيبارين أيضاً بكميات صغيرة لمنع تشكل الجلطات الدموية في القسطرة (أنابيب بلاستيكية صغيرة يمكن من خلالها إعطاء الدواء أو سحب الدم) التي تُترك في الأوردة على مدى فترة من الزمن. ينتمي الهيبارين إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات التخثر ("مميعات الدم"). وهو يعمل عن طريق تقليل قدرة الدم على التخثر.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

يأتي الهيبارين كمحلول (سائل) يتم حقنه عن طريق الوريد (في الوريد) أو بعمق تحت الجلد ومحلول مخفف (أقل تركيزاً) يتم حقنه في القسطرة الوريدية. لا ينبغي حقن الهيبارين في العضل. يحقن الهيبارين أحياناً من مرة إلى ست مرات يومياً ويعطى أحياناً كحقنة بطيئة ومستمرة في الوريد. عندما يتم استخدام الهيبارين لمنع تشكل جلطات الدم في القسطرة الوريدية ، فإنه يستخدم عادة عند وضع القسطرة لأول مرة ، وفي كل مرة يتم فيها سحب الدم من القسطرة أو إعطاء الدواء من خلال القسطرة.

يمكن إعطاء الهيبارين لك من قبل ممرضة أو مقدم رعاية صحية آخر ، أو قد يطلب منك حقن الدواء بنفسك في المنزل. إذا كنت ستحقن الهيبارين بنفسك ، فسوف يوضح لك مقدم الرعاية الصحية كيفية حقن الدواء. اسأل طبيبك أو ممرضتك أو الصيدلي إذا كنت لا تفهم هذه التوجيهات أو لديك أي أسئلة حول مكان في جسمك يجب أن تحقن الهيبارين ، أو كيفية إعطاء الحقنة ، أو كيفية التخلص من الإبر والمحاقن المستخدمة بعد حقن الدواء.

إذا كنت ستحقن الهيبارين بنفسك ، فاتبع الإرشادات الموجودة على ملصق الوصفة الخاص بك بعناية ، واطلب من طبيبك أو الصيدلي شرح أي جزء لا تفهمه. استخدم الهيبارين تماماً حسب التوجيهات. لا تستخدم أكثر أو أقل منه أو تستخدمه أكثر مما وصفه طبيبك.

يأتي محلول الهيبارين بنقاط قوة مختلفة ، وقد يتسبب استخدام القوة الخاطئة في حدوث مشكلات خطيرة. قبل إعطاء حقنة الهيبارين ، تحقق من ملصق العبوة للتأكد من أنها قوة محلول الهيبارين الذي وصفه لك طبيبك. إذا كانت قوة الهيبارين غير صحيحة ، فلا تستخدم الهيبارين واتصل بطبيبك أو الصيدلي على الفور.

قد يزيد طبيبك أو ينقص جرعتك أثناء علاج الهيبارين. إذا كنت ستحقن الهيبارين بنفسك ، فتأكد من معرفة مقدار الدواء الذي يجب عليك استخدامه.

هناك استخدامات لهذا الدواء

يستخدم الهيبارين أيضاً في بعض الأحيان بمفرده أو بالاشتراك مع الأسبرين لمنع فقدان الحمل ومشاكل أخرى لدى النساء الحوامل اللاتي يعانين من حالات طبية معينة والذين عانوا من هذه المشكلات في حالات الحمل المبكرة. تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي حول مخاطر استخدام هذا الدواء لعلاج حالتك.

يمكن وصف هذا الدواء لاستخدامات أخرى ؛ إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على مزيد من المعلومات.

قبة الاحتياطات الخاصة التي يجب علي اتباعها؟

قبل استخدام الهيبارين ،

- أخبر طبيبك والصيدلي إذا كان لديك حساسية من الهيبارين ، أو أي أدوية أخرى ، أو منتجات لحم البقر ، أو منتجات لحم الخنزير ، أو أي من مكونات حقن الهيبارين. اسأل طبيبك أو الصيدلي عن قائمة المكونات.
- أخبر طبيبك والصيدلي عن الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة والفيتامينات والمكملات الغذائية والمنتجات العشبية التي تتناولها أو تخطط لتناولها. تأكد من ذكر أي مما يلي: مضادات التخثر الأخرى مثل الوارفارين (الكومادين) ؛ مضادات الهيستامين (في العديد من منتجات السعال والبرد) ؛ مضاد الثرومبين الثالث (ثرومبات الثالث) ؛ الأسبرين أو المنتجات المحتوية على الأسبرين وغيرها من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل إيبوبروفين (أدفيل ، موترين) ونابروكسين (أليف ونابروسين) ؛ ديكستران. الديجوكسين (ديجيتيك ، لانوكسين) ؛ ديبيريديامول (بيرسينتين ، في أجرينو كس) ؛ هيدروكسي كلوروكوين (بلاكوينيل) ؛ إندوميثاسين (إندوسين) ؛ فينيل بوتازون (أزوليد) (غير متوفر في الولايات المتحدة) ؛ الكينين. والمضادات الحيوية التتراسيكلين مثل ديميكلوسيكلين (ديكلوميسين) ، دوكسيسيكلين (مونودوكس ، فييراميسين) ، مينوسيكلين (ديناسين ، مينوسين) والتتراسيكلين (بريستاسيكلين ، سوميسين). قد يحتاج طبيبك إلى تغيير جرعات الأدوية الخاصة بك أو مراقبتك بعناية بحثاً عن الآثار الجانبية.
- أخبر طبيبك إذا كان لديك مستوى منخفض من الصفائح الدموية (نوع خلايا الدم اللازمة للتخثر الطبيعي) في دمك وإذا كان لديك نزيف حاد لا يمكن إيقافه في أي مكان في جسمك. قد يخبرك طبيبك بعدم استخدام الهيبارين.
- أخبر طبيبك إذا كنت تعانين من فترة الحيض حالياً ؛ إذا كنت تعاني من حمى أو عدوى. إذا كنت قد خضعت مؤخراً لبزل شوكي (إزالة كمية صغيرة من السائل الذي يغمر نخاع الشوكي لفحص العدوى أو مشاكل أخرى) ، التخدير النخاعي (إعطاء مسكنات الألم في المنطقة المحيطة بالعمود الفقري) ، الجراحة ، خاصة تشمل الدماغ أو نخاع الشوكي أو العين أو نوبة قلبية. أخبر طبيبك أيضاً إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من اضطراب نزيف مثل الهيموفيليا (حالة لا يتخثر فيها الدم بشكل طبيعي) ، ونقص مضاد الثرومبين الثالث (حالة تسبب تجلط الدم) ، والجلطات الدموية في الساقين والريئتين ، أو في أي مكان في الجسم ، كدمات غير عادية أو بقع أرجوانية تحت الجلد ، سرطان ، تقرحات في المعدة أو الأمعاء ، أنبوب يصرف المعدة أو الأمعاء ، ارتفاع ضغط الدم ،
- أخبر طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية. إذا أصبحت حاملاً أثناء استخدام الهيبارين ، فاتصل بطبيبك.
- إذا كنت تخضع لعملية جراحية ، بما في ذلك جراحة الأسنان ، أخبر الطبيب أو طبيب الأسنان أنك تستخدم الهيبارين.
- أخبر طبيبك إذا كنت تدخن أو تستخدم منتجات التبغ وإذا توقفت عن التدخين في أي وقت أثناء العلاج بالهيبارين. قد يقلل التدخين من فعالية هذا الدواء.

قبعة تعليمات غذائية خاصة يجب علي اتباعها؟

مالم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك ، استمر في نظامك الغذائي المعتاد.

قبعة يجب أن أفعلها إذا نسيت جرعة؟

إذا كنت ستحقن الهيبارين بنفسك في المنزل ، فتحدث إلى طبيبك حول ما يجب عليك فعله إذا نسيت حقن جرعة.

الآثار الجانبية التي يمكن أن يسببها هذا الدواء؟

قد يسبب الهيبارين آثاراً جانبية. أخبر طبيبك إذا كانت أي من هذه الأعراض شديدة أو لا تختفي:

- احمرار أو ألم أو كدمات أو تقرحات في مكان حقن الهيبارين
- تساقط الشعر

بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة. إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور:

- كدمات أو نزيف غير عادي
- القيء الدموي أو يشبه القهوة
- براز يحتوي على دم أحمر فاتح أو أسود وقطري
- دم في البول
- التعب المفرط
- غثيان
- التقيؤ
- ألم في الصدر أو ضغط أو انزعاج من الضغط
- عدم الراحة في الذراعين أو الكتف أو الفك أو الرقبة أو الظهر
- سعال الدم
- التعرق المفرط
- صداع حاد مفاجئ
- الدوار أو الإغماء
- فقدان التوازن أو التنسيق المفاجئ
- صعوبة مفاجئة في المشي
- خدر أو ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق ، خاصة في جانب واحد من الجسم
- ارتباك مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو فهم الكلام
- صعوبة في الرؤية بإحدى العينين أو كليهما
- تلون الجلد الأرجواني أو الأسود

- أُموتغير لون الذراعين أو الساقين إلى اللون الأزرق أو الداكن
- حكة وحرقان خاصة في أسفل القدمين
- قشعريرة
- حمى
- قشعريرة
- متسرع
- أزيز
- ضيق في التنفس
- صعوبة في التنفس أو البلع
- بحّة في الصوت
- انتصاب مؤلم يستمر لساعات

قد يسبب الهيبارين هشاشة العظام (حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وقد تنكسر بسهولة) ، خاصة عند الأشخاص الذين يستخدمون الدواء لفترة طويلة. تحدث إلى طبيبك حول مخاطر استخدام هذا الدواء.

قد يسبب الهيبارين آثاراً جانبية أخرى. اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي مشاكل غير عادية أثناء استخدام هذا الدواء.

قبة يجب أن أعرفها عن تخزين هذا الدواء والتخلص منه؟

إذا كنت ستحقن الهيبارين في المنزل ، فسوف يخبرك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بكيفية تخزين الدواء. اتبع هذه التعليمات بعناية. تأكد من الاحتفاظ بهذا الدواء في الحاوية التي جاء فيها ، ومغلقة بإحكام ، وبعيداً عن متناول الأطفال. قم بتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيداً عن الحرارة والرطوبة الزائدة (وليس في الحمام). لا تجمد الهيبارين.

من المهم إبقاء جميع الأدوية بعيداً عن رؤية ومتناول الأطفال لأن العديد من الحاويات (مثل الأدوية الأسبوعية وقطرات العين والكريمات والبقع وأجهزة الاستنشاق) ليست مقاومة للأطفال ويمكن للأطفال الصغار فتحها بسهولة. لحماية الأطفال الصغار من التسمم ، قم دائماً بإغلاق أغذية الأمان ووضع الدواء على الفور في مكان آمن - مكان مرتفع وبعيداً عن أنظارهم ومدى وصولهم. <http://www.upandaway.org> <http://www.upandaway.org>

يجب التخلص من الأدوية غير الضرورية بطرق خاصة لضمان عدم تمكن الحيوانات الأليفة والأطفال والأشخاص الآخرين من تناولها. ومع ذلك ، يجب ألا تغسل هذا الدواء في المراض. بدلاً من ذلك ، فإن أفضل طريقة للتخلص من أدويةك هي من خلال برنامج استعادة الأدوية. تحدث إلى الصيدلي الخاص بك أو اتصل بقسم القمامة / إعادة التدوير المحلي للتعرف على برامج الاستعادة في مجتمعك. راجع موقع ويب التخلص الآمن من الأدوية التابع لإدارة الغذاء والدواء (<http://goo.gl/c4Rm4p>) / <http://goo.gl/c4Rm4p> لمزيد من المعلومات إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى برنامج الاستعادة.

ن حالة طارئة / جرعة زائدة

في حالة تناول جرعة زائدة ، اتصل بخط مساعدة مكافحة السموم على الرقم 1-800-222-1222. المعلومات متاحة أيضاً عبر الإنترنت على [https://www.poisonhelp.org/help] [https://www.poisonhelp.org/help]. إذا انهارت الضحية ، أو أصيب بنوبة ، أو كان يعاني من صعوبة في التنفس ، أو لا يمكن إيقاظه ، فاتصل على الفور بخدمات الطوارئ على الرقم 911.

قد تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

- نزيف في الأنف
- دم في البول
- براز أسود قطراني
- كدمات سهلة
- نزيف غير عادي
- دم أحمر في البراز
- القيء الدموي أو يشبه القهوة

قبة معلومات أخرى يجب أن أعرفها؟

احتفظ بجميع المواعيد مع طبيبك والمختبر. سيطلب طبيبك بعض الاختبارات المعملية للتحقق من استجابة جسمك للهيبارين. قد يطلب منك طبيبك فحص البراز بحثاً عن الدم باستخدام اختبار منزلي.

قبل إجراء أي اختبار معمل ، أخبر طبيبك وموظفي المختبر أنك تستخدم الهيبارين.

لاتدع أي شخص يستخدم الدواء الخاص بك. اسأل الصيدلي عن أي أسئلة لديك حول إعادة ملء الوصفة الطبية الخاصة بك.

من المهم أن تحتفظ بقائمة مكتوبة بجميع الأدوية الموصوفة وغير الموصوفة (بدون وصفة طبية) التي تتناولها ، بالإضافة إلى أي منتجات مثل الفيتامينات أو المعادن أو المكملات الغذائية الأخرى. يجب عليك إحضار هذه القائمة معك في كل مرة تزور فيها طبيباً أو إذا تم إدخالك إلى المستشفى. من المهم أيضاً حملها معك في حالة الطوارئ.

أسماء راند

- ليبو هيبيين®
- ليكويمين®
- بانهيبارين®

١- هذا المنتج ذو العلامة التجارية لم يعد في السوق. قد تكون البدائل العامة متاحة.

آخر مراجعة - 2017/09/15

تعلم كيفية الاستشهاد بهذه الصفحة



إخلاء المسؤولية من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي

AHFS® معلومات الدواء المريض TM. © حقوق النشر ، 2022. الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي® كل الحقوق محفوظة. الازدواجية. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. للاستخدام التجاري يجب أن يكون مصرحاً به من قبل ASHP.

المكتبة الوطنية للطب 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية

المعاهد الوطنية للصحة

آخر تحديث للصفحة: 25 مارس 2022