



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Heparin Injection

**Source : U.S. National Library of Medicine**

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682826.html>

## Heparin Injection

binibigkas bilang (hep' a rin)

### Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Heparin ay ginagamit upang maiwasan ang pagbuo ng mga namuong dugo sa mga taong may ilang partikular na kondisyong medikal o sumasailalim sa ilang partikular na medikal na pamamaraan na nagpapataas ng pagkakataon na mabuo ang mga clots. Ginagamit din ang Heparin upang pigilan ang paglaki ng mga clots na nabuo na sa mga daluyan ng dugo, ngunit hindi ito maaaring gamitin upang bawasan ang laki ng mga clots na nabuo na. Ginagamit din ang Heparin sa maliliit na halaga upang maiwasan ang pagbuo ng mga pamumuo ng dugo sa mga catheter (maliliit na plastik na tubo kung saan maaaring ipainom ang gamot o kuhaan ng dugo) na naiwan sa mga ugat sa loob ng isang panahon. Ang Heparin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anticoagulants ('mga blood thinner'). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng kakayahan sa pamumuo ng dugo.

### Paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Heparin bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) o malalim sa ilalim ng balat at bilang isang dilute (hindi gaanong puro) na solusyon na iturok sa mga intravenous catheter. Ang heparin ay hindi dapat iturok sa isang kalamnan. Ang heparin ay minsan ay iniiniksyon ng isa hanggang anim na beses sa isang araw at kung minsan ay ibinibigay bilang isang mabagal, tuluy-tuloy na iniksyon sa ugat. Kapag ang heparin ay ginagamit upang maiwasan ang pagbuo ng mga pamumuo ng dugo sa mga intravenous catheter, kadalasang ginagamit ito kapag ang catheter ay unang inilagay, at sa tuwing ang dugo ay inilabas mula sa catheter o ang gamot ay ibinibigay sa pamamagitan ng catheter.

Ang heparin ay maaaring ibigay sa iyo ng isang nars o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, o maaari kang sabihan na mag-iniksyon ng gamot nang mag-isa sa bahay. Kung ikaw mismo ang mag-iiniksyon ng heparin, ipapakita sa iyo ng isang healthcare provider kung paano mag-iniksyon ng gamot. Tanungin ang iyong doktor, nars, o parmasyutiko kung hindi mo naiintindihan ang mga direksyong ito o may anumang mga katanungan tungkol sa kung saan sa iyong katawan dapat kang mag-iniksyon ng heparin, kung paano ibigay ang iniksyon, o kung paano itapon ang mga ginamit na karayom at hiringgilya pagkatapos mong iturok ang gamot.

Kung ikaw mismo ang mag-iiniksyon ng heparin, sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Gumamit ng heparin nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Ang solusyon ng Heparin ay may iba't ibang lakas, at ang paggamit ng maling lakas ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Bago magbigay ng iniksyon ng heparin, suriin ang label ng pakete upang matiyak na ito ang lakas ng solusyon ng heparin na inireseta ng iyong doktor para sa iyo. Kung hindi tama ang lakas ng heparin, huwag gamitin ang heparin at tawagan kaagad ang iyong doktor o parmasyutiko.

Maaaring taasan o bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis sa panahon ng iyong paggamot sa heparin. Kung ikaw mismo ang mag-iiniksiyon ng heparin, siguraduhing alam mo kung gaano karaming gamot ang dapat mong gamitin.

### may mga gamit para sa gamot na ito

Ang Heparin ay ginagamit din minsan nang nag-iisa o kasama ng aspirin upang maiwasan ang pagkawala ng pagbubuntis at iba pang mga problema sa mga buntis na kababaihan na may ilang partikular na kondisyong medikal at nakaranas ng mga problemang ito sa kanilang mga naunang pagbubuntis. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito upang gamutin ang iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

### hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

#### Bago gumamit ng heparin,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa heparin, anumang iba pang mga gamot, mga produkto ng karne ng baka, mga produkto ng baboy, o alinman sa mga sangkap sa heparin injection. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: iba pang anticoagulants tulad ng warfarin (Coumadin); antihistamines (sa maraming mga produkto ng ubo at sipon); antithrombin III (Thrombate III); aspirin o mga produktong naglalaman ng aspirin at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); dextran; digoxin (Digitek, Lanoxin); dipyridamole (Persantine, sa Aggrenox); hydroxychloroquine (Plaquenil); indomethacin (Indocin); phenylbutazone (Azolid) (hindi magagamit sa US); kinina; at tetracycline antibiotics tulad ng demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Monodox, Vibramycin), minocycline (Dynacin, Minocin) at tetracycline (Bristacycline, Sumycin). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mababang antas ng mga platelet (uri ng mga selula ng dugo na kailangan para sa normal na pamumuo) sa iyong dugo at kung mayroon kang mabigat na pagdurugo na hindi mapigilan kahit saan sa iyong katawan. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag gumamit ng heparin.
- sabihin sa iyong doktor kung kasalukuyan kang nakaranas ng iyong regla; kung mayroon kang lagnat o impeksyon; at kung kamakailan kang nagkaroon ng spinal tap (pag-alis ng kaunting fluid na nagpapaligo sa spinal cord para masuri kung may impeksyon o iba pang mga problema), spinal anesthesia (pagbibigay ng gamot sa pananakit sa lugar sa paligid ng gulugod), operasyon, lalo na kinasasangkutan ng utak, spinal cord o mata, o atake sa puso. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa pagdurugo tulad ng hemophilia (kondisyon kung saan ang dugo ay hindi normal na namumuo), antithrombin III deficiency (kondisyon na nagiging sanhi ng pamumuo ng dugo), mga namuong dugo sa mga binti, baga, o saanman sa katawan, hindi pangkaraniwang pasa o purple spot sa ilalim ng balat, kanser, mga ulser sa tiyan o bituka, isang tubo na umaagos sa tiyan o bituka, mataas na presyon ng dugo,
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang gumagamit ng heparin, tawagan ang iyong doktor.
- kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng heparin.
- sabihin sa iyong doktor kung naninigarilyo ka o gumagamit ng mga produktong tabako at kung huminto ka sa paninigarilyo anumang oras sa panahon ng iyong paggamot na may heparin. Maaaring bawasan ng paninigarilyo ang bisa ng gamot na ito.

## sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

### Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung ikaw mismo ang mag-iiniksyon ng heparin sa bahay, kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin kung nakalimutan mong mag-iiniksyon ng isang dosis.

## mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

**Ang Heparin ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:**

- pamumula, pananakit, pasa, o mga sugat sa lugar kung saan tinurok ang heparin
- pagkawala ng buhok

**Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan kaagad ang iyong doktor:**

- hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo
- suka na duguan o parang coffee grounds
- dumi na naglalaman ng matingkad na pulang dugo o itim at dumi
- dugo sa ihi
- labis na pagkapagod
- pagduduwal
- pagsusuka
- pananakit ng dibdib, presyon, o pagpisil ng kakulangan sa ginhawa
- kakulangan sa ginhawa sa mga braso, balikat, panga, leeg, o likod
- umuubo ng dugo
- Sobra-sobrang pagpapawis
- biglaang matinding sakit ng ulo
- pagkahilo o pagkahilo
- biglaang pagkawala ng balanse o koordinasyon
- biglang problema sa paglalakad
- biglaang pamamanhid o panghihina ng mukha, braso o binti, lalo na sa isang bahagi ng katawan
- biglaang pagkalito, o kahirapan sa pagsasalita o pag-unawa sa pananalita
- hirap makakita sa isa o magkabilang mata
- kulay ube o itim na balat

- sakit at asul o madilim na pagkawalan ng kulay sa mga braso o binti
- nangangati at nasusunog, lalo na sa ilalim ng paa
- pangisinginig
- lagnat
- mga pantal
- pantal
- humihingal
- kinakapos na paghinga
- kahirapan sa paghinga o paglunok
- pamamalat
- masakit na paninigas na tumatagal ng ilang oras

Ang Heparin ay maaaring maging sanhi ng osteoporosis (kondisyon kung saan ang mga buto ay nagiging mahina at maaaring madaling mabali), lalo na sa mga taong gumagamit ng gamot sa mahabang panahon. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito.

Ang Heparin ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang ginagamit ang gamot na ito.

### **Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?**

Kung mag-iinject ka ng heparin sa bahay, sasabihin sa iyo ng iyong healthcare provider kung paano iimbak ang gamot. Maingat na sundin ang mga direksyong ito. Siguraduhing itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Huwag i-freeze ang heparin.

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahasay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

### **n kaso ng emergency/overdose**

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

**Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:**

- dumudugo ang ilong
- dugo sa ihi
- itim, nakatabing dumi
- madaling pasa
- hindi pangkaraniwang pagdurugo
- pulang dugo sa dumi
- suka na duguan o parang coffee grounds

**Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?**

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa heparin. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na suriin ang iyong dumi para sa dugo gamit ang pagsusuri sa bahay.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na gumagamit ka ng heparin.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

**mga pangalan ng rand**

- Lipo-Hepin®¶
- Liquaemin®¶
- Panheparin®¶

¶-Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 09/15/2017

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

---

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022