TITLE - IFOSFAMIDE / IFEX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN JAPANESE

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695023.html

イホスファミド注射

（eye fos'fa mide）と発音されます

重要な警告：

イホスファミドは、骨髄中の血球数を大幅に減少させる可能性があります。これは特定の症状を引き起こす可能性があり、深刻なまたは生命を脅かす感染症や出血を発症するリスクを高める可能性があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。発熱、悪寒、喉の痛み、進行中の咳やうっ血、またはその他の感染症の兆候。異常な出血またはあざ; 血まみれまたは黒、タール状の便; 吐血; またはコーヒーかすに似た吐血または茶色の物質。

イホスファミドは、神経系に深刻なまたは生命を脅かす損傷を引き起こす可能性があります。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。眠気; ぼやけた視界; 存在しないものを見たり、声を聞いたりする（幻聴）; または痛み、灼熱感、しびれ、手や足のうずき; 発作; または昏睡（一定期間の意識喪失）。

イホスファミドは、重度または生命を脅かす腎臓の問題を引き起こす可能性があります。腎臓の問題は、治療中、または治療を受けなくなってから数か月または数年後に発生する可能性があります。腎臓病を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。排尿の減少。顔、腕、手、足、足首、または下肢の腫れ; または異常な倦怠感または脱力感。

イホスファミドは重度の尿の副作用を引き起こす可能性があります。排尿に問題がある場合は医師に相談してください。医師は、イホスファミドを投与しないように指示するか、定期的に排尿できるようになるまで治療を開始するのを待つように指示する場合があります。また、尿路感染症があるかどうか、または膀胱への放射線（X線）療法を受けたことがあるか、または受けたことがあるかどうかを医師に伝えてください。ブスルファン（Busulfex）を服用している、または服用したことがあるかどうかを医師と薬剤師に伝えてください。次の症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください：血尿または頻繁な、緊急の、または痛みを伴う排尿。あなたの医者はあなたにイホスファミドによるあなたの治療の間の重度の尿の副作用を防ぐのを助けるためにあなたに別の薬を与えるでしょう。また、尿の副作用を減らすために、治療中は水分をたくさん飲み、頻繁に排尿する必要があります。

あなたの医者と実験室とのすべての約束を守ってください。医師は、治療前と治療中に定期的に臨床検査を命じて、イフソファミドに対する体の反応をチェックし、副作用が重症になる前に治療します。

なぜこの薬が処方されているのですか？

イホスファミドは、他の薬剤と組み合わせて使用 され、他の薬剤または放射線療法による治療後に改善されていない、または悪化した睾丸の癌を治療します。イホスファミドは、アルキル化剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それはあなたの体の癌細胞の成長を遅らせるか、または止めることによって働きます。

わあ、この薬を使うべきですか？

イホスファミドは、医療施設の医師または看護師によって少なくとも30分間静脈内（静脈内）に注射される液体と混合される粉末として提供されます。1日1回5日間連続で注射することができます。この治療は3週間ごとに繰り返すことができます。治療期間は、イホスファミドによる治療に体がどれだけ反応するかによって異なります。

あなたが特定の副作用を経験した場合、あなたの医者はあなたの治療を遅らせる必要があるかもしれません。イホスファミドによる治療中にどのように感じているかを医師に伝えることが重要です。

この薬の用途

イフォスファミドは、膀胱がん、肺がん、卵巣がん（卵が形成される女性の生殖器官で発生するがん）、子宮頸がん、および特定の種類の軟組織または骨肉腫（発生するがん）の治療にも使用されることがあります。筋肉や骨に）。あなたの状態のためにこの薬を使用することのリスクについてあなたの医者に相談してください。

この薬は他の用途に処方される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

イホスファミドを投与する前に、

- イホスファミド、シクロホスファミド（Cytoxan）、その他の薬、またはイホスファミド注射の成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。
- あなたが受けている、または服用する予定の他の処方薬と非処方薬、ビタミン、栄養補助食品を医師と薬剤師に伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬と、次のいずれかに必ず言及してください。フルコナゾール（ジフルカン）、イトラコナゾール（スポラノッ クス）、ケトコナゾール（ニゾラル）などの特定の抗真菌剤。カルバマゼピン（テグレトロール）、フェノバルビタール（ルミナル）、フェニトイン（ディランチン）などの特定の発作薬。アレルギーまたは干し草熱のための薬; 吐き気の薬; 痛みに対するオピオイド（麻薬）薬; リファンピン（リファンピン、リマクタン）; 鎮静剤; 睡眠薬; またはソラフェニブ（ネクサバール）。あなたの医者はあなたの薬の投与量を変えるか、副作用についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。他の薬もイホスファミドと相互作用する可能性があります、
- あなたが受け取っているハーブ製品、特にセントジョンズワートを医師に伝えてください。
- 以前に他の化学療法薬による治療を受けたことがあるか、または以前に放射線療法を受けたことがあるかどうかを医師に伝えてください。また、心臓病、腎臓病、または肝臓病を患っている、または患ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。

- イホスファミドが傷の治癒を遅らせる可能性があることを知っておく必要があります。
- イホスファミドは、女性の通常の月経周期（期間）を妨げ、男性の精子の生成を停止させる可能性があることを知っておく必要があります。イホスファミドは永続的な不妊症（妊娠困難）を引き起こす可能性があります。ただし、妊娠できない、または他の人を妊娠できないと思い込まないでください。妊娠中または授乳中の女性は、この薬の服用を開始する前に医師に相談する必要があります。イホスファミドを服用している間は、妊娠したり授乳したりしないでください。イホスファミドを服用している間、および治療後6か月間は、信頼できる避妊方法を使用して妊娠を防ぎます。あなたが男性の場合、あなたとあなたの女性のパートナーは、イホスファミド注射の投与をやめた後、6ヶ月間避妊を継続する必要があります。ifsofamideの投与中に妊娠した場合は、すぐに医師に連絡してください。

特別な食事の指示に従うべきですか？

この薬を服用している間は、グレープフルーツを大量に食べたり、グレープフルーツジュースを飲んだりしないでください。

この薬は帽子の副作用を引き起こす可能性がありますか？

イホスファミドは副作用を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうかを医師に伝えてください。

- 吐き気
- 嘔吐
- 食欲減少
- 下痢
- 口と喉の痛み
- 脱毛
- 一般的な痛みと倦怠感

いくつかの副作用は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載されている症状のいずれかが発生した場合は、すぐに医師に連絡してください。

- 薬を注射した場所の腫れ、発赤、痛み
- 発疹
- かゆみ
- 呼吸困難または嚥下困難
- 呼吸困難
- 喘鳴
- 不整脈
- 胸痛
- 嗄声
- 皮膚や目の黄変

イホスファミドは、他の癌を発症するリスクを高める可能性があります。イホスファミド注射を受けるリスクについて医師に相談してください。

イホスファミドは他の副作用を引き起こす可能性があります。この薬の服用中に異常な問題が発生した場合は、医師に連絡してください。

深刻な副作用が発生した場合、あなたまたはあなたの医師は、食品医薬品局（FDA）のMedWatch有害事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話（1-800-332-1088）。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも入手できます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こした、呼吸に問題がある、または目覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。

- ぼやけた視界
- 存在しないものを見たり、声を聞いたりする（幻聴）
- 発熱、喉の痛み、悪寒、またはその他の感染症の兆候
- 異常な出血またはあざ
- 黒とタールのスツール
- 便中の赤い血
- 吐血
- コーヒーかすのように見える嘔吐物
- 排尿の減少
- 顔、喉、舌、唇、目、手、足、足首、または下肢の腫れ
- 口と喉の痛み
- 発作
- 錯乱
- 昏睡（一定期間の意識喪失）

他の情報を知っておく必要がありますか？

服用しているすべての処方薬と非処方薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助食品などの製品のリストを書面で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に入院する場合は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。

ランド名

- Ifex®

それらの名前

- イホスファミド

最終改訂日-2013年3月15日

このページを引用する方法を学ぶ

American Society of Health-System Pharmacists、Inc.免責事項
AHFS®患者の投薬情報™。©Copyright、2022. American Society of Health-System Pharmacists®、4500 East-West Highway、Suite 900、ベセスダ、メリーランド。全著作権所有。複製
商用利用はASHPの承認が必要です。

国立医学図書館8600RockvillePike、Bethesda、MD20894米国保健社会福祉省
国立衛生研究所
ページの最終更新日：2022年3月25日