

[Hem](#) → [Läkemedel, örter och kosttillskott](#) → Imatinib

Source : U.S. National Library of Medicine

URL till denna sida: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606018.html>

Imatinib

uttalas som (I mat' i ib)

hur är denna medicin utskriven?

Imatinib används för att behandla vissa typer av leukemi (cancer som börjar i de vita blodkropparna) och andra cancerformer och störningar i blodkropparna. Imatinib används också för att behandla vissa typer av gastrointestinala stromala tumörer (GIST; en typ av tumör som växer i väggarna i matsmältningskanalerna och kan spridas till andra delar av kroppen). Imatinib används också för att behandla dermatofibrosarcoma protuberans (en tumör som bildas under det översta hudlagret) när tumören inte kan avlägsnas kirurgiskt, har spridit sig till andra delar av kroppen eller har kommit tillbaka efter operationen. Imatinib ingår i en klass av läkemedel som kallas kinashämmare. Det fungerar genom att blockera verkan av det onormala proteinet som signalerar cancerceller att föröka sig. Detta hjälper till att stoppa spridningen av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Imatinib kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med en måltid och ett stort glas vatten en eller två gånger om dagen. Ta imatinib vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta imatinib exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj tabletterna hela; tugga eller krossa dem inte. Om du vidrör eller kommer i direkt kontakt med en krossad tablett, tvätta området noggrant.

Om du inte kan svälja imatinib tabletter kan du lägga alla tabletter som du behöver för en dos i ett glas vatten eller äppeljuice. Använd 50 milliliter (lite mindre än 2 ounces) vätska för varje 100 mg tablett och 200 milliliter (lite mindre än 7 ounces) vätska för varje 400 mg tablett. Rör om med en sked tills tabletterna smulas sönder helt och drick blandningen omedelbart.

Om din läkare har sagt till dig att ta 800 mg imatinib, ska du ta 2 av de 400 mg tabletterna. Ta inte 8 av 100 mg tabletterna. Tablettbeläggningen innehåller järn och du kommer att få för mycket järn om du tar 8 av 100 mg tabletterna.

Din läkare kan öka eller minska din dos av imatinib under din behandling. Detta beror på hur väl medicinen fungerar för dig och på de biverkningar du upplever. Prata med din läkare om hur

du känner under din behandling. Fortsätt att ta imatinib även om du mår bra. Sluta inte ta imatinib utan att tala med din läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordinerar för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar imatinib,

- tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot imatinib, andra läkemedel eller något av innehållsämnen i imatinib tabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
- berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: acetaminophen (Tylenol), alprazolam (Xanax), amlodipin (Norvasc, i Caduet, Lotrel, Tribenzor, andra), atazanavir (Reyataz), atorvastatin (Lipitor, i Caduet), karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, andra), klaritromycin (Biaxin, i Prevpac), ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), dexametason, ergotamin (Ergomar, i Migergot, Cafergot), erytromycin (EES, Eryc, Eryped, andra), estazolam, felodipin, fentanyl (Duragesic, Subsys, Fentora, andra), fosfenytoin (Cerebyx), indinavir (Crixivan), järn eller järnhaltiga kosttillskott, isradipin, itraconazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol, lovastatin (Altoprev), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, i Dutoprol), nefazodon, nelfinavir (Viracept), nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat CC, Procardia, andra), nimodipin (Nymalize), nisoldipin (Sular), oxkarbazepin (Oxtellar XR, Trileptal), fenobarbital, fenobarbital, (Dilantin, Phenytek), pimoizid (Orap), primidon (Mysoline), kinidin (i Nuedexta), rifabutin (Mycobutin), rifampin (rifadin, rimactane, i Rifamate, Rifater), ritonavir (Norvir, i Kaletra, Technivie, Viekira), saquinavir (Fortovase, Invirase), simvastatin (Zocor, i Vytorin), sirolimus (Rapamune), takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf), telitromycin, triazolam (Halcion), voriconazol (Vfend) och warfarin (Coumadin, Jantovenin, Jantoven,). Många andra mediciner kan också interagera med imatinib, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.
- berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.
- tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärt-, lung-, sköldkörtel-, njur- eller leversjukdom.
- tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du måste ta ett graviditetstest innan behandlingen påbörjas. Du bör inte bli gravid medan du tar imatinib och under 14 dagar efter din sista dos. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda under din behandling. Om du blir gravid medan du tar imatinib, kontakta din läkare. Imatinib kan skada fostret.
- tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma medan du tar imatinib och under en månad efter din sista dos.
- om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar imatinib.
- du bör veta att imatinib kan göra dig yr, dåsig eller orsaka dimsyn. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Ät inte grapefrukt eller drick grapefruktjuice medan du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Imatinib kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är allvarliga eller inte försvinner:

- diarre
- illamående
- kräkningar
- förändring i hur saker smakar
- munsår eller svullnad inuti munnen
- aptitlöshet
- viktninskning
- halsbränna eller matsmältningsbesvär
- torr mun
- huvudvärk
- ledsvullnad eller smärta
- skelettsmärta
- muskelkramper, spasmer eller smärta
- stickningar, brännande. eller stickande känsla på huden
- svårt att somna eller att sova
- svettas
- tårfyllda ögon
- rosa öga
- spolning
- torr hud
- utslag
- klåda
- nagelförändringar
- håravfall

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din läkare omedelbart:

- svullnad runt ögonen
- svullnad av händer, fötter, vristar eller underben
- plötslig viktökning
- andnöd
- snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag
- hosta upp rosa eller blodigt slem
- ökad urinering, särskilt på natten
- bröstsmärta
- skalar, får blåsor eller tappar huden
- gulfärgning av huden eller ögonen
- blod i avföringen
- ovanliga blåmärken eller blödningar
- influensaliknande symtom, halsont, feber, frossa och andra tecken på infektion
- överdriven trötthet eller svaghet
- buksmärter eller uppblåsthet

Imatinib kan bromsa tillväxten hos barn. Ditt barns läkare kommer att följa hans eller hennes tillväxt noggrant. Tala med ditt barns läkare om riskerna med att ge ditt barn imatinib.

Imatinib kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna medicin.

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i din

gemenskap. Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) för mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på <https://www.poisohelp.org/help> [<https://www.poisohelp.org/help>]. Om offret har kollapsat, fått ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

- illamående
- kräkningar
- diarre
- utslag
- svullnad
- extrem trötthet
- muskelkramper eller spasmer
- buksmärtor
- huvudvärk
- aptitlöshet

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att kontrollera din kropps svar på imatinib.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

- Gleevec®

Senast reviderad - 2020-03-15

Lär dig hur du citerar den här sidan



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul](#)

AHFS® Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022