

כתובת האתר של דף זה: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html>

אינדינביר מבוטא כ- (בדין חלה)

היי האם נרשמה תרופה זו?

לאנשים אחרים HIV-כגון זיהומים חמורים או סרטן. נטילת תרופות אלו יחד עם תרגול סקס בטוח יותר וביצוע שינויים אחרים באורח החיים עשויה להפחית את הסיכון להעברת נגיף ה-HIV הוא עשוי להפחית את הסיכוי שלך לפתח תסמונת כשל חיסוני נרכש (אייДС) ומחלות הקשורות ל HIV בדם. למרות שאינדינביר אינו מרפא HIV-הוא בקבוצת תרופות הנקראות מעכבי פרוטאז. זה פועל על ידי הפחתת כמות ה Indinavir. HIV) משמש יחד עם תרופות אחרות לטיפול בזיהום בנגיף הכשל החיסוני האנושי Indinavir

כיצד יש להשתמש בתרופה זו?

בדיוק לפי ההוראות. אין ליטול יותר או פחות ממנו או לקחת אותו לעתים קרובות יותר ממה שרשם הרופא indinavir מגיע כקפסולה לנטילה דרך הפה. זה נלקח בדרך כלל כל 8 שעות (שלוש פעמים ביום). קח אינדינביר בערך באותן שעות בכל יום. עקוב אחר ההוראות על תווית המרשם שלך בקפידה, ובקש מהרופא או הרוקח שלך להסביר כל חלק שאינך מבין. קח Indinavir

קח אינדינביר על בטן ריקה, שעה אחת לפני הארוחות או שעתיים לאחר הארוחות, עם מים, חלב רזה או נטול שומן, מיץ קפה או תה. עם זאת, אם אינדינביר מקלקל את הבטן, ניתן ליטול אותו עם ארוחה קלה, כגון טוסט יבש או קורנפלקס עם חלב רזה או לא שומן. שוחח עם הרופא או הרוקח על אילו מזונות ניתן ליטול עם אינדינביר.

אין לכתוש או ללעוס את הקפסולה, אך ניתן לפתוח אותה ולערבב אותה עם מחית פירות (כגון בננה).

המשך ליטול אינדינביר גם אם אתה מרגיש טוב. אל תפסיק ליטול אינדינביר מבלי לדבר עם הרופא שלך.

ייתכן שהרופא שלך יצטרך להפסיק את הטיפול שלך אם אתה חווה תופעות לוואי מסוימות. הקפד לספר לרופא שלך איך אתה מרגיש במהלך הטיפול עם אינדינביר.

בקש מהרוקח או הרופא שלך עותק של מידע היצרן עבור המטופל.

השימושים בתרופה זו

שוחח עם הרופא שלך על הסיכונים האפשריים של שימוש בתרופה זו למצבך HIV. לאחר מגע מקרי עם דם, רקמות או נוזלי גוף אחרים המזהמים עם HIV משמש גם לפעמים בשילוב עם תרופות אחרות לטיפול בעובדי שירותי בריאות ואנשים אחרים שנחשפו לזיהום Indinavir

יש לעקוב אחר אמצעי זהירות מיוחדים?

לפני נטילת אינדינביר,

- ספר לרופא ולרוקח אם אתה אלרגי לאינדינביר, לכל תרופה אחרת או לכל אחד מהמרכיבים בכמוסות אינדינביר. בקש מהרוקח שלך רשימה של המרכיבים.
- ספר לרופא שלך אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות: אלפוזזין (אורוקסטורל); אלפרזולם (קסנקס); (Propulsid) (cisapride); (Nexterone, Pacerone) (amiodarone) (לא זמין בארה"ב); תרופות מסוג ארגוטמין כגון דיהידרו-ארגוטמין (DHE 45, מיגרנאל), ארגונובין (ארגוטרט), ארגוטמין (ארגומאר, ב-Cafergot, ב-Migergot), ומתילרגונובין (Methergine); (Versed) (midazolam) (Latuda); (Altoprev, Mevacor) (lovastatin) דרך הפה; פימוזיד (Orap); sildenafil (המותג Revatio בלבד המשמש למחלות ריאות); סימבסטטין (זוקור, ב-Vytorin); או טריאזולם (Halcion). הרופא שלך כנראה יגיד לך לא לקחת אינדינביר.
- ספר לרופא ולרוקח אילו עוד תרופות מרשם או ללא מרשם, ויטמינים ותוספי תזונה אתה נוטל או מתכוון לקחת. הקפד להזכיר כל אחד מהבאים: (Tracleer) (bosentan); חוסמי תעלות סידן כגון אמלודיפין (Norvasc, ב-Amturide, ב-felodipine), (Tekamlo-ניקרדיפין וניפדיפין (Adalat, Afeditab, Procardia); carbamazepine; (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) (אחרים); תרופות להורדת כולסטרול (סטטינים) כגון (Lipitor) atorvastatin, ב-Caduet-ו-clarithromycin) (Crestor); (rosuvastatin) (Biaxin, ב-PrevPac); קולכיצין (Colcrys, Mitigare), ב-Col-Probenecid-; דקסמתזון; פלוקונאזול (Diflucan); פלוטיקזון (Flonase, Flovent, ב-Advair, ב-Dymista); (ketoconazole) (Extina, Nizoral, Xolegel); (itraconazole) (Onmel, Sporanox); תרופות אחרות ל-HIV כולל atazanavir (ב-Reyataz, Evotaz), (efavirenz) (Rescriptor), (delavirdine) (ב-Sustiva, Atripla), (ritonavir) (Viramune), (nevirapine) (Viracept), (nelfinavir) (ב-Norvir, Kaletra, ב-Viekira Pak), ו-saquinavir) (Invirase); תרופות לדופק לא סדיר כמו לידוקאין (Glydo, Xylocaine) וקינידין (בנואדקסטה); תרופות המדכאות את המערכת החיסונית כגון ציקלוספורין (Gengraf, Neoral, Sandimmune), סירולימוס (Rapamune) וטקורולימוס (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); (midazolam) (Versed) בהזרקה; מעכבי פוספודיאסטרז מסוימים (מעכבי PDE-5) המשמשים לתפקוד לקוי של זיקפה כגון סילדנפיל (ויאגרה), טדלפיל (אדסירקה, סיאליס) וורדנפיל (לויטרה, ב-Staxin); פנוברביטל; פניטואין (דילנטין, פניטק); (rifampin) (Mycobutin); (rifabutin) (Seroquel); (quetiapine) (Rifadin, Rimactane), (Rifadin, Rimactane) (בריפאמט, בריפאטר); סלמטרול (סרוונט, ב-Advair); טרזודון (ב-Efexor) (venlafaxine). ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המינונים של התרופות שלך או לפקח עליך בקפידה לאיתור תופעות לוואי. תרופות רבות אחרות עשויות גם הן לקיים אינטראקציה עם אינדינביר, לכן הקפידו לספר לרופא על כל התרופות שאתם נוטלים, גם אלו שאינן מופיעות ברשימה זו.
- ספר לרופא שלך אילו מוצרים צמחיים אתה נוטל, במיוחד וורט סנט ג'ון.
- אם אתה נוטל דינזון (וידקס), קח אותו לפחות שעה אחת לפני או אחרי אינדינביר.
- ספר לרופא שלך אם יש לך או סבלת אי פעם בהמופיליה (הפרעת דימום שבה הדם אינו נקרש כראוי), סוכרת או מחלת כליות או כבד.
- ספר לרופא שלך אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה. אם נכנסת להריון בזמן נטילת אינדינביר, התקשר לרופא שלך. אתה לא צריך להניק אם אתה נגוע ב-HIV או אם אתה נוטל אינדינביר.
- אתה צריך לדעת ששומן הגוף שלך עשוי לעלות או לעבור לאזורים שונים בגופך כגון השדיים, הגב העליון, הצוואר, החזה ואיזור הבטן. אובדן שומן מהרגליים, הידיים והפנים יכול לקרות גם.
- עליך לדעת שאתה עלול לחוות היפרגליקמיה (עלייה ברמת הסוכר בדם שלך) בזמן שאתה נוטל תרופה זו, גם אם אין לך עדיין סוכרת. ספר לרופא מיד אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים בזמן שאתה נוטל אינדינביר: צמא קיצוני, הטלת שתן תכופה, רעב קיצוני, ראייה מטושטשת או חולשה. חשוב מאוד להתקשר לרופא שלך ברגע שיש לך אחד מהתסמינים הללו, מכיוון שסוכר גבוה בדם שאינו מטופל עלול לגרום ל

מצב חמור הנקרא קטואצידוזיס. קטואצידוזיס עלול להפוך לסכנת חיים אם היא לא מטופלת בשלב מוקדם. תסמינים של קטואצידוזיס כוללים יובש בפה, בחילות והקאות, קוצר נשימה, נשימה עם ריח פירותי וירידה בהכרה.

- עליך לדעת שבזמן שאתה נוטל תרופות לטיפול בזיהום ב-HIV, המערכת החיסונית שלך עלולה להתחזק ולהתחיל להילחם בזיהומים אחרים שכבר היו בגופך. זה עלול לגרום לך לפתח תסמינים של זיהומים אלה. אם יש לך תסמינים חדשים או מחמירים בכל עת במהלך הטיפול באינדינאביר, הקפד לספר לרופא שלך.

האם עליי לעקוב אחר הוראות תזונה מיוחדות?

שתו לפחות 48 אונקיות (1.5 ליטר), שהם בערך שש כוסות של 8 אונקיות (240 מיליליטר), של מים או נוזלים אחרים כל 24 שעות.

שוחח עם הרופא שלך על אכילת אשכוליות ושתיית מיץ אשכוליות בזמן נטילת התרופה.

כובע האם עלי לעשות אם אשכח מנה?

אם החמצת מנה בפחות משעתיים, קח את המנה שהוחמצת ברגע שאתה זוכר אותה. עם זאת, אם אתה מתגעגע למנה ביותר משעתיים, דלג על המנה שהוחמצה והמשיך בלוח הזמנים הקבוע שלך במינון. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

תופעות לוואי של תרופה זו יכולה לגרום?

עלול לגרום לתופעות לוואי. ספר לרופא שלך אם סימפטום זה חמור או אינו חולף Indinavir

- שינוי בחוש הטעם

עלול לגרום לתופעות לוואי. תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמינים הבאים, התקשר לרופא מיד או קבל טיפול רפואי חירום Indinavir

- פריחה
- כוורות
- עקצוץ
- עור מתקלף או שלפוחיות
- כאב גב
- כאבים בצד הגוף
- כאבי בטן באמצע עד תחתון
- דם בשתן
- כאבי שרירים או חולשה
- בחילה
- עייפות יתר
- דימום או חבורות חריגות

- אובדן תיאבון
- כאב בחלק הימני העליון של הבטן
- תסמינים דמויי שפעת
- שתן צהוב כהה או חום
- הצהבה של העור או העיניים
- קוצר נשימה
- פעימות לב מהירות
- בלבול
- סחרחורת
- כאב ראש
- חרדון

עלול לגרום לתופעות לוואי אחרות. התקשר לרופא שלך אם יש לך בעיות חריגות בזמן נטילת התרופה Indinavir.

אם אתה חווה תופעת לוואי חמורה, אתה או הרופא שלך עשויים לשלוח דוח לתוכנית דיווח על אירועי לוואי של MedWatch באינטרנט של מינהל המזון והתרופות (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>] או בטלפון (1-800-332-1088).

צריך לדעת על אחסון וסילוק של תרופה זו?

שמור את התרופה במיכל שבו היא הגיעה, סגור היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים. חומר ייבוש (חומר ייבוש) כלול עם הקפסולות שלך; שמור את זה בבקבוק התרופות שלך כל הזמן. אחסן אותו בטמפרטורת החדר והרחק מעודפי חום ולחות (לא בחדר האמבטיה).

חשוב להרחיק את כל התרופות מטווח ראייה ומהישג ידם של ילדים, שכן מיכלים רבים (כגון מטפלי גלולות שבועיים ואלו עבור טיפות עיניים, קרמים, מדבקות ומשאים) אינם עמידים לילדים וילדים צעירים יכולים לפתוח אותם בקלות. כדי להגן על ילדים צעירים מפני הרעלה, תמיד לנעול מכסי בטיחות ולהניח מיד את התרופה במקום בטוח - כזה שנמצא למעלה והרחק ומחוץ לטווח ראייה והישג ידם. <http://www.upandaway.org>] <http://www.upandaway.org>

יש להשליך תרופות שאינן נחוצות בדרכים מיוחדות כדי להבטיח שחיות מחמד, ילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לצרוך אותן. עם זאת, אסור לשטוף את התרופה לאסלה. במקום זאת, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהתרופות שלך היא באמצעות תוכנית להחזרת תרופות. שוחח עם הרוקח שלך או פנה למחלקת האשפה/מיחזור המקומית שלך כדי ללמוד על תוכנית החזרה בקהילה שלך. עיין באתר ה-FDA לסילוק בטוח של תרופות (<http://goo.gl/c4Rm4p>] <http://goo.gl/c4Rm4p>]). למידע נוסף אם אין לך גישה לתוכנית החזרה.

במקרה חירום/מנת יתר

במקרה של מנת יתר, התקשר לקו הסיוע לבקרת רעלים בטלפון 1-800-222-1222. מידע זמין גם באינטרנט בכתובת <https://www.poisonhelp.org/help>] <https://www.poisonhelp.org/help>]. אם הקורבן התמוטט,

סבל מהתקף, מתקשה לנשום או שלא ניתן להעיר אותו, התקשר מיד לשירותי החירום בטלפון 911.

תסמינים של מנת יתר עשויים לכלול את הדברים הבאים:

- כאבים בצד הגוף
- דם בשתן
- בחילה
- הקאה
- שלשול

צריך לדעת מידע אחר?

שמור את כל הפגישות עם הרופא שלך והמעבדה. הרופא שלך יזמין בדיקות מעבדה מסוימות כדי לבדוק את תגובתך לאינדינביר.

אל תיתן לאף אחד אחר לקחת את התרופות שלך. שאל את הרוקח שלך כל שאלה שיש לך לגבי מילוי מחדש של המרשם שלך.

חשוב לך לשמור רשימה כתובה של כל התרופות מרשם ותרופות ללא מרשם (ללא מרשם) שאתה נוטל, וכן כל מוצר כגון ויטמינים, מינרלים או תוספי תזונה אחרים. עליך להביא רשימה זו איתך בכל פעם שאתה מבקר אצל רופא או אם אתה מאושפז בבית חולים. כמו כן, חשוב לשאת איתך מידע במקרה חירום.

שמות רנד

- קריקסיבן®

השמות שלהם

- IDV

מתוקן לאחרונה - 18/05/2018

[למד כיצד לצטט דף זה](#)



[האגודה האמריקאית של רוקחי מערכת הבריאות, Inc.](#) כתב ויתור

AHFS® מידע על תרופות למטופל. © זכויות יוצרים, 2022. האגודה האמריקאית לרוקחים במערכת הבריאות® כל הזכויות שמורות. שכפול. 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. לשימוש מסחרי חייב להיות מורשה על ידי ASHP.

העמוד עודכן לאחרונה: 25 במרץ 2022