



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Casa](#) → [Drogas, Ervas e Suplementos](#) → Indinavir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL desta página: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html>

Indinavir

pronunciado como (em din' a veer)

por que este medicamento é prescrito?

O indinavir é usado junto com outros medicamentos para tratar a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). O indinavir está em uma classe de medicamentos chamados inibidores de protease. Funciona diminuindo a quantidade de HIV no sangue. Embora o indinavir não cure o HIV, ele pode diminuir a chance de desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e doenças relacionadas ao HIV, como infecções graves ou câncer. Tomar esses medicamentos junto com a prática de sexo seguro e outras mudanças no estilo de vida pode diminuir o risco de transmissão do vírus HIV para outras pessoas.

como este medicamento deve ser usado?

Indinavir vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado a cada 8 horas (três vezes ao dia). Tome indinavir aproximadamente à mesma hora todos os dias. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome indinavir exatamente como indicado. Não tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Tome indinavir com o estômago vazio, 1 hora antes das refeições ou 2 horas após as refeições, com água, leite desnatado ou desnatado, suco, café ou chá. No entanto, se o indinavir incomodar o estômago, pode ser tomado com uma refeição leve, como torradas secas ou flocos de milho com leite desnatado ou desnatado. Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre os alimentos que podem ser tomados com indinavir.

Não esmague ou mastigue a cápsula, mas ela pode ser aberta e misturada com purê de frutas (como banana).

Continue a tomar indinavir mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar indinavir sem falar com o seu médico.

O seu médico pode necessitar de interromper o seu tratamento se sentir alguns efeitos secundários. Certifique-se de que diz ao seu médico como se sente durante o tratamento com indinavir.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

O indinavir também é usado às vezes em combinação com outros medicamentos para tratar profissionais de saúde e outros indivíduos expostos à infecção pelo HIV após contato acidental com sangue, tecidos ou outros fluidos corporais contaminados pelo HIV. Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar indinavir,

- informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao indinavir, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos ingredientes das cápsulas de indinavir. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.
- informe o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos: alfuzosina (Uroxatral); alprazolam (Xanax); amiodarona (Nexterone, Pacerone); cisaprida (Propulsid) (não disponível nos EUA); medicamentos do tipo ergotamina, como diidroergotamina (DHE 45, Migranal), ergonovina (Ergotrate), ergotamina (Ergomar, em Cafergot, em Migergot) e metilergonovina (Methergine); lovastatina (Altoprev, Mevacor); lurasidona (Latuda); midazolam (Versed) por via oral; pimozida (Orap); sildenafil (única marca Revatio usada para doença pulmonar); sinvastatina (Zocor, em Vytorin); ou triazolam (Halcion). O seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar indinavir.
- informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: bosentan (Tracleer); bloqueadores dos canais de cálcio, tais como amlodipina (Norvasc, em Amturnide, em Tekamlo), felodipina, nicardipina e nifedipina (Adalat, Afeditab, Procardia); carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, outros); medicamentos para baixar o colesterol (estatinas), como atorvastatina (Lipitor, em Caduet) e rosuvastatina (Crestor); claritromicina (Biaxin, em PrevPac); colchicina (Colcrys, Mitigare, em Col-Probenecid); dexametasona; fluconazol (Diflucan); fluticasona (Flonase, Flovent, em Advair, em Dymista); itraconazol (Onmel, Sporanox); cetoconazol (Extina, Nizoral, Xolegel); outros medicamentos para o HIV, incluindo atazanavir (Reyataz, no Evotaz), delavirdina (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, no Atripla), nelfinavir (Viracept), nevirapina (Viramune), ritonavir (Norvir, no Kaletra, no Viekira Pak) e saquinavir (Invirase); medicamentos para batimentos cardíacos irregulares, como lidocaína (Glydo, Xylocaine) e quinidina (em Nuedexta); medicamentos que suprimem o sistema imunológico, como ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) e tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); midazolam (Versed) por injeção; certos inibidores de fosfodiesterase (inibidores de PDE-5) usados para disfunção erétil, como sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) e vardenafil (Levitra, em Staxyn); fenobarbital; fenitoína (Dilantin, Phenytek); quetiapina (Seroquel); rifabutina (Micobutina); rifampicina (Rifadin, Rimactane, em Rifamate, em Rifater); salmeterol (Serevent, em Advair); trazodona; e venlafaxina (Effexor). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros medicamentos também podem interagir com o indinavir, portanto, certifique-se de informar seu médico sobre todos os medicamentos que está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.
- informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.
- se estiver tomando didanosina (Videx), tome-o pelo menos uma hora antes ou depois do indinavir.
- Informe o seu médico se você tem ou já teve hemofilia (distúrbio hemorrágico no qual o sangue não coagula adequadamente), diabetes ou doença renal ou hepática.
- informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar indinavir, contacte o seu médico. Você não deve amamentar se estiver infectada pelo HIV ou se estiver tomando indinavir.
- você deve saber que sua gordura corporal pode aumentar ou se mover para diferentes áreas do corpo, como seios, parte superior das costas, pescoço, peito e estômago. A perda de gordura das pernas, braços e rosto também pode acontecer.
- você deve saber que pode apresentar hiperglicemia (aumento do açúcar no sangue) enquanto estiver tomando este medicamento, mesmo que ainda não tenha diabetes. Informe o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas enquanto estiver a tomar indinavir: sede extrema, micção frequente, fome extrema, visão turva ou fraqueza. É muito importante chamar o seu médico assim que tiver algum destes sintomas, porque o açúcar elevado no sangue que não é tratado pode causar uma

condição grave chamada cetoacidose. A cetoacidose pode tornar-se fatal se não for tratada em um estágio inicial. Os sintomas de cetoacidose incluem boca seca, náuseas e vômitos, falta de ar, respiração com cheiro de frutas e diminuição da consciência.

- você deve saber que enquanto estiver tomando medicamentos para tratar a infecção pelo HIV, seu sistema imunológico pode ficar mais forte e começar a combater outras infecções que já estavam em seu corpo. Isso pode fazer com que você desenvolva sintomas dessas infecções. Se tiver sintomas novos ou agravados a qualquer momento durante o tratamento com indinavir, informe o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Beba pelo menos 48 onças (1,5 litros), o que equivale a aproximadamente seis copos de 8 onças (240 mililitros), de água ou outros líquidos a cada 24 horas.

Converse com seu médico sobre comer toranja e beber suco de toranja enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você perder uma dose por menos de 2 horas, tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se você perder uma dose por mais de 2 horas, pule a dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma perda.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

O indinavir pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se este sintoma for grave ou não desaparecer:

- mudança no sentido do paladar

O indinavir pode causar efeitos colaterais. Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum dos seguintes sintomas, ligue para o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

- irritação na pele
- urticária
- coceira
- pele descamação ou bolhas
- dor nas costas
- dor no lado do seu corpo
- dor de estômago do meio para baixo
- sangue na urina
- dor ou fraqueza muscular
- náusea
- cansaço excessivo
- sangramento ou hematomas incomuns

- perda de apetite
- dor na parte superior direita do estômago
- sintomas como os da gripe
- urina amarela escura ou marrom
- amarelecimento da pele ou olhos
- falta de ar
- batimento cardíaco rápido
- confusão
- tontura
- dor de cabeça
- Palidez

O indinavir pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA) (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Um dessecante (agente de secagem) está incluído em suas cápsulas; mantenha-o sempre no seu frasco de medicamento. Armazene-o em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão disponíveis on-line em <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Se a vítima desmaiou,

teve uma convulsão, tem dificuldade para respirar ou não pode ser acordado, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

- dor no lado do seu corpo
- sangue na urina
- náusea
- vômito
- diarreia

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir alguns exames laboratoriais para verificar a sua resposta ao indinavir.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

- Crixivan®

outros nomes

- IDV

Última revisão - 18/05/2018

[Saiba como citar esta página](#)



[Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade](#)

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

