



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Acasă](#) → [Medicamente, plante și suplimente](#) → Indinavir

Source : U.S. National Library of Medicine

Adresa URL a acestei pagini: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html>

Indinavir

pronunțat ca (in din' a vier)

de ce este prescris acest medicament?

Indinavirul este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata infecția cu virusul imunodeficienței umane (HIV). Indinavirul face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de protează. Acționează prin scăderea cantității de HIV din sânge. Deși indinavirul nu vindecă HIV, vă poate reduce șansele de a dezvolta sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA) și boli legate de HIV, cum ar fi infecții grave sau cancer. Luarea acestor medicamente împreună cu practicarea sexului mai sigur și efectuarea altor schimbări în stilul de viață poate scădea riscul de transmitere a virusului HIV către alte persoane.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Indinavirul vine sub formă de capsulă de luat pe cale orală. Se ia de obicei la fiecare 8 ore (de trei ori pe zi). Luați indinavir aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați indinavir exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Luați indinavir pe stomacul gol, cu 1 oră înainte de masă sau 2 ore după masă, cu apă, lapte degresat sau degresat, suc, cafea sau ceai. Cu toate acestea, dacă indinavir vă deranjează stomacul, acesta poate fi luat cu o masă ușoară, cum ar fi pâine prăjită uscată sau fulgi de porumb cu lapte degresat sau degresat. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre ce alimente pot fi luate împreună cu indinavir.

Nu zdrobiți și nu mestecați capsula, dar aceasta poate fi deschisă și amestecată cu piure de fructe (cum ar fi banana).

Continuați să luați indinavir chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați indinavir fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă întrerupă tratamentul dacă aveți anumite reacții adverse. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu indinavir.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Indinavir este, de asemenea, utilizat uneori în combinație cu alte medicamente pentru a trata personalul medical și alte persoane expuse la infecția cu HIV după contactul accidental cu sânge, țesuturi sau alte fluide corporale contaminate cu HIV. Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua indinavir,

- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la indinavir, la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele din capsulele de indinavir. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente: alfuzosin (Uroxatral); alprazolam (Xanax); amiodarona (Nexterone, Pacerone); cisapridă (Propulsid) (nu este disponibilă în SUA); medicamente de tip ergotamină, cum ar fi dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), ergonovină (Ergotrate), ergotamină (Ergomar, în Cafergot, în Migergot) și metilergonovină (Methergine); lovastatin (Altoprev, Mevacor); lurasidonă (Latuda); midazolam (Versed) pe cale orală; pimozidă (Orap); sildenafil (numai marca Revatio utilizată pentru boli pulmonare); simvastatină (Zocor, în Vytorin); sau triazolam (Halcion). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați indinavir.
- spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: bosentan (Tracleer); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc, în Amturnide, în Tekamlo), felodipină, nicardipină și nifedipină (Adalat, Afeditab, Procardia); carbamazepină (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, altele); medicamente care scad colesterolul (statine) precum atorvastatina (Lipitor, in Caduet) și rosuvastatin (Crestor); claritromicină (Biaxin, în PrevPac); colchicină (Colcrys, Mitigare, în Col-Probenecid); dexametazonă; fluconazol (Diflucan); fluticazonă (Flonase, Flovent, în Advair, în Dymista); itraconazol (Onmel, Sporanox); ketoconazol (Extina, Nizoral, Xolegel); alte medicamente pentru HIV, inclusiv atazanavir (Reyataz, în Evotaz), delavirdină (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, în Atripla), nelfinavir (Viracept), nevirapină (Viramune), ritonavir (Norvir, în Kaletra, în Viekira Pak) și saquinavir (Invirase); medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi lidocaina (Glydo, Xylocaine) și chinidina (în Nuedexta); medicamente care suprimă sistemul imunitar, cum ar fi ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) și tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); midazolam (Versed) prin injectare; anumiți inhibitori ai fosfodiesterazei (inhibitori PDE-5) utilizați pentru disfuncția erectilă, cum ar fi sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) și vardenafil (Levitra, în Staxyn); fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); quetiapină (Seroquel); rifabutină (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în Rifater); salmeterol (Serevent, în Advair); trazodonă; și venlafaxină (Effexor). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu indinavir, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.
- spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.
- dacă luați didanozină (Videx), luați-l cu cel puțin o oră înainte sau după indinavir.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată hemofilie (tulburare de sângerare în care sângele nu se coagulează corespunzător), diabet zaharat sau boli ale rinichilor sau ficatului.
- spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați indinavir, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu trebuie să alăptați dacă sunteți infectat cu HIV sau dacă luați indinavir.
- trebuie să știți că grăsimea corporală poate crește sau se poate muta în diferite zone ale corpului, cum ar fi sânii, partea superioară a spatelui, gâtul, pieptul și zona stomacului. De asemenea, se poate produce pierderea de grăsime de la picioare, brațe și față.
- trebuie să știți că este posibil să aveți hiperglicemie (creșteri ale zahărului din sânge) în timp ce luați acest medicament, chiar dacă nu aveți deja diabet. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome în timp ce luați indinavir: sete extremă, urinare frecventă, foame extremă, vedere încețoșată sau slăbiciune. Este foarte important să vă adresați medicului dumneavoastră de îndată ce aveți oricare dintre aceste simptome, deoarece glicemia crescută care nu este tratată poate provoca o

stare gravă numită cetoacidoză. Cetoacidoza poate pune viața în pericol dacă nu este tratată într-un stadiu incipient. Simptomele cetoacidozei includ gură uscată, greață și vărsături, dificultăți de respirație, respirație care miroase fructat și scăderea stării de conștiență.

- trebuie să știți că, în timp ce luați medicamente pentru tratarea infecției cu HIV, sistemul dumneavoastră imunitar poate deveni mai puternic și poate începe să lupte împotriva altor infecții care erau deja în corpul dumneavoastră. Acest lucru vă poate determina să dezvoltați simptome ale acestor infecții. Dacă aveți simptome noi sau care se agravează în orice moment în timpul tratamentului cu indinavir, asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Bea cel puțin 1,5 litri, adică aproximativ șase pahare de 240 de mililitri, de apă sau alte lichide la fiecare 24 de ore.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă omiteți o doză cu mai puțin de 2 ore, luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă omiteți o doză cu mai mult de 2 ore, săriți peste doza uitată și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Indinavirul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă acest simptom este sever sau nu dispăre:

- modificarea simțului gustului

Indinavirul poate provoca reacții adverse. Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

- eczemă
- urticarie
- mâncărime
- piele descuamată sau formată de vezicule
- dureri de spate
- durere în partea laterală a corpului
- dureri de stomac de mijloc până la inferior
- sânge în urină
- dureri musculare sau slăbiciune
- greață
- oboseala excesivă
- sângerări sau vânătăi neobișnuite

- pierderea poftelor de mâncare
- durere în partea dreaptă sus a stomacului
- simptome asemănătoare gripei
- urină galben închis sau maro
- îngălbenirea pielii sau a ochilor
- dificultăți de respirație
- bătăi rapide ale inimii
- confuzie
- amețea
- durere de cap
- paloare

Indinavirul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) sau la telefon (1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Un desicant (agent de uscare) este inclus cu capsulele dvs.; păstrați-l în flaconul de medicament în orice moment. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor. <http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) pentru mai multe informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și online la adresa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Dacă victima s-a prăbușit,

a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

- durere în partea laterală a corpului
- sânge în urină
- greață
- vărsături
- diaree

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul dumneavoastră la indinavir.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

- Crixivan®

numele lor

- IDV

Ultima revizuire - 18.05.2018

[Aflați cum să citați această pagină](#)



[Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii](#)

AHFS® Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciștilor de Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

