



Express Medicine Shipments, Globally!  
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.  
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED  
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Ev](#) → [İlaçlar, Otlar ve Takviyeler](#) → Hindistan

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html>

## Hindistan

olarak telaffuz edilir (in' a veer'de)

### Bu ilaç neden reçete ediliyor?

İndinavir, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. İndinavir, proteaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kandaki HIV miktarını azaltarak çalışır. İndinavir HIV'i tedavi etmese de, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve ciddi enfeksiyonlar veya kanser gibi HIV ile ilgili hastalıklar geliştirme şansınızı azaltabilir. Bu ilaçları daha güvenli seks yapmak ve başka yaşam tarzı değişiklikleri yapmakla birlikte almak, HIV virüsünün diğer insanlara bulaşma riskini azaltabilir.

### peki bu ilaç kullanılmalı mı?

İndinavir ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Genellikle her 8 saatte bir (günde üç kez) alınır. İndinavir'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. İndinavir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

İndinavir'i aç karnına, yemeklerden 1 saat önce veya yemeklerden 2 saat sonra, su, yağsız veya yağsız süt, meyve suyu, kahve veya çay ile alın. Bununla birlikte, indinavir midenizi rahatsız ediyorsa, kuru tost veya yağsız veya yağsız sütlü mısır gevreği gibi hafif bir yemekle birlikte alınabilir. İndinavir ile hangi yiyeceklerin alınabileceği konusunda doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Kapsülü ezmeyin veya çiğnemeyin, ancak açılıp meyve püresi (muz gibi) ile karıştırılabilir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile indinavir almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan indinavir almayı kesmeyin.

Bazı yan etkiler yaşarsanız doktorunuzun tedavinizi kesmesi gerekebilir. İndinavir ile tedaviniz sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi anlattığınızdan emin olun.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

### bu ilacın kullanım alanları

İndinavir ayrıca bazen sağlık çalışanlarını ve HIV bulaşmış kan, dokular veya diğer vücut sıvılarıyla kazara temas ettikten sonra HIV enfeksiyonuna maruz kalan diğer kişileri tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

## özel önlemler almalı mıyım?

### İndinavir almadan önce,

- İndinavir'e, diğer ilaçlara veya İndinavir kapsülündeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
- Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: alfuzosin (Üroksatral); alprazolam (Xanax); amiodaron (Nexterone, Pacerone); sisaprid (Propulsid) (ABD'de mevcut değildir); dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), ergonovin (Ergotrate), ergotamin (Ergomar, Cafegot'ta, Migegot'ta) ve metilergonovin (Methergine) gibi ergot tipi ilaçlar; lovastatin (Altoprev, Mevacor); lurasidon (Latuda); midazolam (Versed) ağızdan; pimozid (Orap); sildenafil (sadece akciğer hastalığı için kullanılan Revatio markası); simvastatin (Zocor, Vytorin'de); veya triazolam (Halcion). Doktorunuz muhtemelen size İndinavir almamanızı söyleyecektir.
- Aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: bosentan (Tracleer); amlodipin (Norvasc, Amturnide'de, Tekamlo'da), felodipin, nikardipin ve nifedipin (Adalat, Afeditab, Procardia) gibi kalsiyum kanal blokerleri; karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, diğerleri); atorvastatin (Caduet'te Lipitor) ve rosuvastatin (Crestor) gibi kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); klaritromisin (PrevPac'te Biaxin); kolşisin (Colcrys, Mitigare, Col-Probenecid içinde); deksametazon; flukonazol (Diflucan); flutikazon (Flonase, Flovent, Advair'de, Dymista'da); itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol (Extina, Nizoral, Xolegel); Atazanavir dahil olmak üzere HIV için diğer ilaçlar (Reyataz, Evotaz'da), delavirdin (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, Atripla'da), nelfinavir (Viracept), nevirapin (Viramune), ritonavir (Norvir, Kaletra'da, Viekira Pak'ta) ve sakonavir (Invirase); lidokain (Glydo, Xylocaine) ve kinidin (Nuedexta'da) gibi düzensiz kalp atışı için ilaçlar; siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) ve takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf) gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar; enjeksiyon yoluyla midazolam (Versed); sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) ve vardenafil (Levitra, Staxyn'de) gibi erektil disfonksiyon için kullanılan bazı fosfodiesteraz inhibitörleri (PDE-5 inhibitörleri); fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); ketiapin (Seroquel); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); salmeterol (Serevent, Advair'de); trazodon; ve venlafaksin (Effexor). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da İndinavir ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.
- Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.
- didanosin (Videx) alıyorsanız, İndinavirden en az bir saat önce veya sonra alınız.
- doktorunuza hemofili (kanın düzgün pıhtılaşmadığı kanama bozukluğu), diyabet veya böbrek veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını söyleyin.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İndinavir alırken hamile kalırsanız doktorunuza arayın. HIV ile enfekte iseniz veya İndinavir alıyorsanız emzirmemelisiniz.
- Vücut yağınızın artabileceğini veya göğüsleriniz, sırtınızın üst kısmı, boyun, göğüs ve karın bölgesi gibi vücudunuzun farklı bölgelerine hareket edebileceğini bilmelisiniz. Bacaklar, kollar ve yüzdeki yağ kaybı da olabilir.
- Halihazırda şeker hastalığınız olmasa bile, bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde yükselmeler) yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. İndinavir kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: aşırı susama, sık idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık görme veya güçsüzlük. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar çıkmaz doktorunuza aramanız çok önemlidir, çünkü tedavi edilmeyen yüksek kan şekeri bir hastalığa neden olabilir.

ketoasidoz denilen ciddi bir durum. Ketoasidoz erken bir aşamada tedavi edilmezse hayatı tehdit edici hale gelebilir. Ketoasidozun belirtileri arasında ağız kuruluğu, bulantı ve kusma, nefes darlığı, meyve kokulu nefes ve bilinç azalması sayılabilir.

- HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaç alırken, bağışıklık sisteminizin güçlenebileceğini ve halihazırda vücudunuzda bulunan diğer enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabileceğini bilmelisiniz. Bu, bu enfeksiyonların semptomlarını geliştirmenize neden olabilir. İndinavir ile tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda yeni veya kötüleşen semptomlar yaşarsanız, doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

## özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Her 24 saatte bir, yaklaşık altı adet 8-ons (240-mililitre) bardak olan en az 48 ons (1,5 litre) su veya diğer sıvıları için.

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

## Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir dozu 2 saatten daha kısa bir sürede unutursanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Bununla birlikte, bir dozu 2 saatten fazla geçirirseniz, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

## Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

**İndinavir yan etkilere neden olabilir. Bu semptom şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:**

- tat alma duyusunda değişiklik

**İndinavir yan etkilere neden olabilir. Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:**

- döküntü
- kurdeşen
- kaşıntı
- soyma veya kabarma cilt
- sırt ağrısı
- vücudunuzun yanında ağrı
- orta ila alt mide ağrısı
- idrarda kan
- kas ağrısı veya zayıflığı
- mide bulantısı
- aşırı yorgunluk
- olağandışı kanama veya morarma

- iştah kaybı
- midenizin sağ üst kısmında ağrı
- grip benzeri semptomlar
- koyu sarı veya kahverengi idrar
- cilt veya gözlerin sararması
- nefes darlığı
- hızlı nabız
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- baş dönmesi
- baş ağrısı
- solgunluk

İndinavir başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorunuz varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.

(<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) veya telefonla (1-800-332-1088).

## **Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?**

Bu ilacı geldiği kaptaki sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Kapsüllerinizle birlikte bir kurutucu (kurutma maddesi) dahildir; bunu her zaman ilaç şişenizde bulundurun. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

## **n acil/aşırı doz vakası**

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefonda zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:<https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kurban çöktüyse,

nöbet geçirdiyse, nefes almada güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa hemen 911'i arayın.

## Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

- vücudunuzun yanında ağrı
- idrarda kan
- mide bulantısı
- kusma
- ishal

## Şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz indinavir'e cevabınızı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

## rand isimleri

- Crixivan®

## diğer isimler

- IDV

Son Revize - 05/18/2018

[Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin](#)



[Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi](#)

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

