



Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED
FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

[Bahay](#) → [Mga Gamot, Herb at Supplement](#) → Indinavir

Source : U.S. National Library of Medicine

URL ng page na ito: <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696028.html>

Indinavir

binibigkas bilang (in din' a veer)

Hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Indinavir kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang impeksyon ng human immunodeficiency virus (HIV). Ang Indinavir ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na protease inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng dami ng HIV sa dugo. Bagama't hindi ginagamot ng indinavir ang HIV, maaari nitong bawasan ang iyong pagkakataong magkaroon ng acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) at mga sakit na nauugnay sa HIV tulad ng malubhang impeksyon o kanser. Ang pag-inom ng mga gamot na ito kasama ng pagsasanay sa mas ligtas na pakikipagtalik at paggawa ng iba pang mga pagbabago sa pamumuhay ay maaaring mabawasan ang panganib ng paghahatid ng HIV virus sa ibang tao.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Indinavir ay dumarating bilang isang kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha tuwing 8 oras (tatlong beses sa isang araw). Uminom ng indinavir sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng indinavir nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Uminom ng indinavir nang walang laman ang tiyan, 1 oras bago kumain o 2 oras pagkatapos kumain, na may tubig, skim o walang taba na gatas, juice, kape, o tsaa. Gayunpaman, kung sinaktan ng indinavir ang iyong tiyan, maaari itong inumin kasama ng magaan na pagkain, tulad ng tuyong toast o cornflake na may skim o nonfat milk. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko tungkol sa kung anong mga pagkain ang maaaring inumin kasama ng indinavir.

Huwag durugin o ngayain ang kapsula, ngunit maaari itong buksan at ihalo sa katas ng prutas (tulad ng saging).

Ipagpatuloy ang pag-inom ng indinavir kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng indinavir nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na matakpan ang iyong paggamot kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot sa indinavir.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din ang Indinavir kung minsan kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at iba pang mga indibidwal na nalantad sa impeksyon sa HIV pagkatapos ng hindi sinasadyang pakikipag-ugnay sa kontaminadong HIV na dugo, mga tisyu, o iba pang mga likido sa katawan. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga posibleng panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng indinavir,

- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa indinavir, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa indinavir capsules. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
- sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot: alfuzosin (Uroxatral); alprazolam (Xanax); amiodarone (Nexterone, Pacerone); cisapride (Propulsid) (hindi magagamit sa US); ergotype na mga gamot tulad ng dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), ergonovine (Ergotrate), ergotamine (Ergomar, sa Cafegot, sa Migergot), at methylergonovine (Methergine); lovastatin (Altoprev, Mevacor); lurasidone (Latuda); midazolam (Versed) sa pamamagitan ng bibig; pimozide (Orap); sildenafil (tanging Revatio brand na ginagamit para sa sakit sa бага); simvastatin (Zocor, sa Vytorin); o triazolam (Halcion). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng indinavir.
- sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Tiyaking banggitin ang alinman sa mga sumusunod: bosentan (Tracleer); calcium-channel blockers tulad ng amlodipine (Norvasc, sa Amturnide, sa Tekamlo), felodipine, nifedipine, at nifedipine (Adalat, Afeditab, Procardia); carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, iba pa); mga gamot na nagpapababa ng kolesterol (statins) tulad ng atorvastatin (Lipitor, sa Caduet) at rosuvastatin (Crestor); clarithromycin (Biaxin, sa PrevPac); colchicine (Colcrys, Mitigare, sa Col-Probenecid); dexamethasone; fluconazole (Diflucan); fluticasone (Flonase, Flovent, sa Advair, sa Dymista); itraconazole (Onmel, Sporanox); ketoconazole (Extina, Nizoral, Xolegel); iba pang mga gamot para sa HIV kabilang ang atazanavir (Reyataz, sa Evotaz), delavirdine (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, sa Atripla), nelfinavir (Viracept), nevirapine (Viramune), ritonavir (Norvir, sa Kaletra, sa Viekira Pak), at saquinavir (Invirase); mga gamot para sa hindi regular na tibok ng puso tulad ng lidocaine (Glydo, Xylocaine) at quinidine (sa Nuedexta); mga gamot na pumipigil sa immune system tulad ng cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), at tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); midazolam (Versed) sa pamamagitan ng iniksyon; ilang phosphodiesterase inhibitors (PDE-5 inhibitors) na ginagamit para sa erectile dysfunction tulad ng sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis), at vardenafil (Levitra, sa Staxyn); phenobarbital; phenytoin (Dilantin, Phenytek); quetiapine (Seroquel); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater); salmeterol (Serevent, sa Advair); trazodone; at venlafaxine (Effexor). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa indinavir, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.
- sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.
- kung umiinom ka ng didanosine (Videx), inumin ito nang hindi bababa sa isang oras bago o pagkatapos ng indinavir.
- sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng hemophilia (karamdaman sa pagdurugo kung saan ang dugo ay hindi namumuong maayos), diabetes, o sakit sa bato o atay.
- sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng indinavir, tawagan ang iyong doktor. Hindi ka dapat magpapasuso kung ikaw ay nahawaan ng HIV o kung ikaw ay umiinom ng indinavir.
- dapat mong malaman na ang iyong taba sa katawan ay maaaring tumaas o lumipat sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan tulad ng iyong mga suso, itaas na likod, leeg, dibdib, at bahagi ng tiyan. Ang pagkawala ng taba mula sa mga binti, braso, at mukha ay maaari ding mangyari.
- dapat mong malaman na maaari kang makaranas ng hyperglycemia (pagtaas ng iyong asukal sa dugo) habang iniinom mo ang gamot na ito, kahit na wala ka pang diabetes. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas habang umiinom ka ng indinavir: matinding pagkauhaw, madalas na pag-ihi, matinding gutom, malabong paningin, o panghihina. Napakahalagang tawagan ang iyong doktor sa sandaling magkaroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito, dahil ang mataas na asukal sa dugo na hindi ginagamot ay maaaring magdulot ng

malubhang kondisyon na tinatawag na ketoacidosis. Ang ketoacidosis ay maaaring maging banta sa buhay kung hindi ito ginagamot sa maagang yugto. Ang mga sintomas ng ketoacidosis ay kinabibilangan ng tuyong bibig, pagduduwal at pagsusuka, igsi sa paghinga, paghinga na mabango ng prutas, at pagbaba ng kamalayan.

- dapat mong malaman na habang umiinom ka ng mga gamot upang gamutin ang impeksyon sa HIV, ang iyong immune system ay maaaring lumakas at magsimulang labanan ang iba pang mga impeksiyon na nasa iyong katawan na. Ito ay maaaring magdulot sa iyo na magkaroon ng mga sintomas ng mga impeksyong iyon. Kung mayroon kang bago o lumalalang sintomas anumang oras sa panahon ng iyong paggamot sa indinavir, siguraduhing sabihin sa iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Uminom ng hindi bababa sa 48 onsa (1.5 litro), na humigit-kumulang anim na 8-onsa (240-milliliter) na baso, ng tubig o iba pang likido kada 24 na oras.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang dosis nang wala pang 2 oras, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung napalampas mo ang isang dosis nang higit sa 2 oras, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Indinavir. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang sintomas na ito:

- pagbabago sa panlasa

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Indinavir. Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot:

- pantal
- mga pantal
- nangangati
- pagbabalat o paltos ng balat
- sakit sa likod
- sakit sa tagiliran ng iyong katawan
- sakit sa gitna hanggang ibabang tiyan
- dugo sa ihi
- pananakit o panghihina ng kalamnan
- pagduduwal
- labis na pagkapagod
- hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

- walang gana kumain
- sakit sa kanang itaas na bahagi ng iyong tiyan
- mga sintomas tulad ng trangkaso
- maitim na dilaw o kayumangging ihi
- paninilaw ng balat o mata
- kinakapos na paghinga
- mabilis na tibok ng puso
- pagkalito
- pagkahilo
- sakit ng ulo
- pamumutla

Maaaring magdulot ng iba pang mga side effect ang Indinavir. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online (<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch> [<http://www.fda.gov/Safety/MedWatch>]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332-1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Ang isang desiccant (drying agent) ay kasama sa iyong mga kapsula; panatilihin ito sa iyong bote ng gamot sa lahat ng oras. Itabi ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihin malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita at naaabot.<http://www.upandaway.org> [<http://www.upandaway.org>]

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (<http://goo.gl/c4Rm4p> [<http://goo.gl/c4Rm4p>]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa <https://www.poisonhelp.org/help> [<https://www.poisonhelp.org/help>]. Kung ang biktima ay bumagsak,

nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

- sakit sa tagiliran ng iyong katawan
- dugo sa ihi
- pagduduwal
- pagsusuka
- pagtatae

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang suriin ang iyong tugon sa indinavir.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

- Crixivan®

mga pangalan

- IDV

Huling Binago - 05/18/2018

[Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito](#)



[American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer](#)

AHFS® Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022