TITLE - INTERFERON ALFA 2B / INTRON A MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Disclaimer : Document presented by www.911GlobalMeds.com
Express Medicine Shipments, Globally!
FOR PUBLIC INTEREST & INFORMATION ONLY.
NO BRAND OR GENERIC MEDICINE IS BEING PROMOTED FOR SALES FROM THE CONTENT OF THIS DOCUMENT.

Source : U.S. National Library of Medicine

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a690006.html

İnterferon Alfa-2b Enjeksiyon

olarak telaffuz edilir (in" ter feer' on al' fa too bee)

ÖNEMLİ UYARI:

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu, ciddi veya yaşamı tehdit edici olabilecek aşağıdaki durumlara neden olabilir veya bunları kötüleştirebilir: enfeksiyonlar; depresyon, ruh hali ve davranış sorunları veya kendinizi veya başkalarını incitme veya öldürme düşünceleri dahil olmak üzere akıl hastalığı; anjina (göğüs ağrısı) veya kalp krizi gibi iskemik bozukluklar (vücudun bir bölgesine kan akışının zayıf olduğu durumlar); ve otoimmün bozukluklar (bağışıklık sisteminin kan, eklemler, böbrekler, karaciğer, akciğerler, kaslar, deri veya tiroid bezini etkileyebilecek şekilde vücudun bir veya daha fazla bölümüne saldırdığı durumlar). Enfeksiyonunuz varsa doktorunuza söyleyiniz; veya bir otoimmün hastalığınız, sedef hastalığınız (vücudun bazı bölgelerinde kırmızı, pullu lekelerin oluştuğu bir cilt hastalığı), sistemik lupus eritematozus (SLE veya lupus); bağışıklık sisteminin vücudun sağlıklı kısımlarına saldırdığı bir otoimmün hastalık), sarkoidoz (akciğerler, gözler, deri ve kalp gibi çeşitli organlarda küçük bağışıklık hücresi kümelerinin oluştuğu ve bu organların işlevini bozduğu bir durum)) veya romatoid artrit (RA; vücudun kendi eklemlerine saldırarak ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden olduğu bir durum); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. sarkoidoz (akciğerler, gözler, deri ve kalp gibi çeşitli organlarda küçük bağışıklık hücresi kümelerinin oluştuğu ve bu organların işlevine müdahale ettiği bir durum) veya romatoid artrit (RA; vücudun kendi vücuduna saldırdığı bir durum) ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden olan kendi eklemleri); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. sarkoidoz (akciğerler, gözler, deri ve kalp gibi çeşitli organlarda küçük bağışıklık hücresi kümelerinin oluştuğu ve bu organların işlevine müdahale ettiği bir durum) veya romatoid artrit (RA; vücudun kendi vücuduna saldırdığı bir durum) ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden olan kendi eklemleri); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. vücudun kendi eklemlerine saldırarak ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden olduğu bir durum); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu); düzensiz kalp atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil olmak üzere akıl hastalığı; veya kalp, böbrek, pankreas veya tiroid hastalığı. vücudun kendi eklemlerine saldırarak ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden olduğu bir durum); kanser; kolit (bağırsak iltihabı); diyabet; kalp krizi; yüksek kan basıncı; yüksek trigliserit seviyeleri (kolesterol ile ilgili yağlar); HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş imm

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: kanlı ishal veya bağırsak hareketleri; ateş, titreme, balgamlı öksürük (mukus), boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri; daha sık idrara çıkma veya ağrılı, göğüs ağrısı; düzensiz kalp atışı; ruh halinizdeki veya davranışınızdaki değişiklikler; depresyon; geçmişte kullandıysanız, uyuşturucu veya alkol kullanmaya yeniden başlama; sinirlilik (kolayca sinirlenme); kendini öldürme veya kendine zarar verme düşünceleri; saldırgan veya şiddet içeren davranış; nefes almada zorluk; göğüs ağrısı; yürüme veya konuşmadaki değişiklikler; vücudunuzun bir tarafında azalan güç veya zayıflık; bulanık görme veya görme kaybı; şiddetli mide ağrısı; olağandışı kanama veya morarma; koyu renkli idrar; açık renkli bağırsak hareketleri; veya bir otoimmün hastalığın kötüleşmesi.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun interferon alfa-2b'ye verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Doktorunuz veya eczacınız, interferon alfa-2b ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz. (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu, bir dizi durumu tedavi etmek için kullanılır.

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu kullanılır

- Karaciğer hasarı belirtileri gösteren kişilerde kronik (uzun süreli) hepatit C enfeksiyonunu (bir virüsün neden olduğu karaciğer şişmesi) tedavi etmek için tek başına veya ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere) ile kombinasyon halinde,
- Karaciğer hasarı belirtileri gösteren kişilerde kronik hepatit B enfeksiyonunu (bir virüsün neden olduğu karaciğer şişmesi) tedavi etmek için,
- tüylü hücreli lösemiyi (beyaz kan hücresi kanseri) tedavi etmek için
- genital siğil tedavisi için,
- Edinilmiş immün yetmezlik sendromuna (AIDS) bağlı Kaposi sarkomunu (vücudun farklı bölgelerinde anormal doku büyümesine neden olan bir kanser türü) tedavi etmek,
- Kanseri çıkarmak için ameliyat olmuş belirli kişilerde malign melanomun (belirli cilt hücrelerinde başlayan bir kanser) tedavisi için,
- foliküler Hodgkin dışı lenfomayı (NHL; yavaş büyüyen bir kan kanseri) tedavi etmek için başka bir ilaçla birlikte.

İnterferon alfa-2b, immünomodülatörler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. İnterferon alfa-2b, vücuttaki virüs miktarını azaltarak hepatit C virüsünü (HCV) ve hepatit B virüsünü (HBV) tedavi etmeye çalışır. İnterferon alfa-2b, hepatit B veya hepatit C'yi tedavi etmeyebilir veya bu enfeksiyonlardan kaynaklanan karaciğer sirozu (yara izi), karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri gibi komplikasyonlar geliştirmenizi önleyemez. Ayrıca hepatit B veya C'nin diğer insanlara yayılmasını engellemeyebilir. İnterferon alfa-2b'nin kanser veya genital siğilleri tedavi etmek için nasıl çalıştığı tam olarak bilinmemektedir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

İnterferon alfa-2b, sıvı ile karıştırmak için bir şişe içinde bir toz olarak ve deri altına (derinin hemen altına), kas içine (kas içine), damar içine (damar içine) veya intralezyonel olarak (bir lezyona) enjekte etmek için bir çözelti olarak gelir.). Enjeksiyon günlerinizde, genellikle öğleden sonra veya akşam olmak üzere, ilacı günün yaklaşık aynı saatinde enjekte etmeniz en iyisidir.

Eğer varsa:

- HCV, ilacı haftada üç kez deri altına veya kas içine enjekte edin.

- HBV, ilacı deri altından veya kas içinden haftada üç kez genellikle 16 hafta boyunca enjekte edin.
- tüylü hücreli lösemi, ilacı 6 aya kadar haftada 3 kez kas içinden veya deri altından enjekte edin.
- malign melanom, ilacı 4 hafta boyunca art arda 5 gün intravenöz olarak, ardından 48 hafta boyunca haftada üç kez subkutan olarak enjekte edin.
- foliküler melanom, ilacı 18 aya kadar haftada üç kez deri altından enjekte edin.
- Genital siğiller, ilacı 3 hafta boyunca alternatif günlerde haftada üç kez intralezyonel olarak enjekte edin, ardından tedaviye 16 haftaya kadar devam edilebilir.
- Kaposi sarkomu, 16 hafta boyunca haftada üç kez deri altından veya kas içinden ilacı enjekte edin.

Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. İnterferon alfa-2b enjeksiyonunu aynen belirtildiği şekilde kullanın. Bu ilacı daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık veya daha uzun süre kullanmayın.

İlacın ciddi yan etkilerini yaşarsanız doktorunuz dozunuzu azaltabilir. Tedaviniz sırasında neler hissettiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyiniz ve kullanmanız gereken ilaç miktarı ile ilgili sorularınızı doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

İlk doz interferon alfa-2b'nizi doktorunuzun ofisinde alacaksınız. Bundan sonra, interferon alfa-2b'yi kendinize enjekte edebilirsiniz veya enjeksiyonları size bir arkadaşınız veya akrabanız yapsın. İnterferon alfa-2b'yi ilk kez kullanmadan önce, siz veya enjeksiyonları yapacak kişi, üreticinin ürünle birlikte gelen hasta bilgilerini okumalıdır. Doktorunuzdan veya eczacınızdan size veya ilacı enjekte edecek kişiye nasıl enjekte edileceğini göstermesini isteyin. İlacınızı sizin için başka biri enjekte edecekse, kazara iğne batmasını nasıl önleyeceğini bildiğinden emin olun.

Bu ilacı subkutan olarak enjekte ediyorsanız, interferon alfa-2b'yi karın bölgenizin, üst kollarınızın veya uyluklarınızın, belinizin yakınları veya göbeğinizin (göbek deliği) çevresi dışında herhangi bir yerine enjekte edin. İlacınızı tahriş olmuş, morarmış, kızarmış, enfekte veya yara izi olan cilde enjekte etmeyin.

Bu ilacı kas içinden enjekte ediyorsanız, interferon alfa-2b'yi kollarınıza, uyluklarınıza veya kalçalarınızın dış bölgelerine enjekte edin. Aynı noktayı iki kez üst üste kullanmayın. İlacınızı tahriş olmuş, morarmış, kızarmış, enfekte veya yara izi olan cilde enjekte etmeyin.

Bu ilacı intralezyonel olarak enjekte ediyorsanız, doğrudan siğilin tabanının ortasına enjekte edin.

İnterferon alfa-2b şırıngalarını, iğnelerini veya şişelerini asla tekrar kullanmayın. Kullanılmış iğneleri ve şırıngaları delinmeye dayanıklı bir kaba atın ve kullanılmış ilaç şişelerini çöp kutusuna atın. Delinmeye dayanıklı kabın nasıl atılacağı konusunda doktorunuz veya eczacınızla konuşun.

İnterferon alfa-2b'yi kullanmadan önce flakondaki solüsyona bakın. İlaç berrak ve yüzen parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Sızıntı olmadığından emin olmak için flakonu kontrol edin ve son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmişse, bulanıksa, partikül içeriyorsa veya sızdıran bir şişedeyse solüsyonu kullanmayın.

Bir seferde yalnızca bir flakon interferon alfa-2b karıştırmalısınız. Enjekte etmeyi planlamadan hemen önce ilacı karıştırmak en iyisidir. Ancak ilacı önceden karıştırabilir, buzdolabında saklayabilir ve 24 saat içinde kullanabilirsiniz. İlaçları enjekte etmeden önce mutlaka buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Doktorunuz veya eczacınız, interferon alfa-2b ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

bu ilacın kullanım alanları

İnterferon alfa-2b bazen hepatit D virüsünü (HDV; bir virüsün neden olduğu karaciğer şişmesi), bazal hücreli karsinomu (bir tür cilt kanseri), kutanöz T hücreli lenfomaları (CTCL, bir tür cilt kanseri) tedavi etmek için de kullanılır.) ve böbrek kanseri. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

İnterferon alfa-2b enjeksiyonunu almadan önce,

- interferon alfa-2b enjeksiyonuna, PEG-interferon alfa-2b (PEG-Intron) ve PEG-interferon alfa-2a (Pegasys) dahil diğer interferon alfa ilaçlarına, diğer ilaçlara, albümine veya interferon alfa-2b enjeksiyonundaki diğer bileşenlerden herhangi biri. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.
- aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: telbivudin (Tyzeka), teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Theochron) veya zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
- Şiddetli karaciğer hastalığınız veya otoimmün hepatitiniz (bağışıklık sistemi hücrelerinin karaciğere saldırdığı durum) varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size interferon alfa-2b enjeksiyonu kullanmamanızı söyleyecektir.
- Daha önce organ nakli geçirdiyseniz (vücuttaki bir organı değiştirme ameliyatı) ve bağışıklık sisteminizi baskılamak için ilaç alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Ayrıca, ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlardan herhangi birine veya aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz veya olduysanız doktorunuza da söyleyin: anemi (düşük kırmızı kan hücreleri) veya düşük beyaz kan hücreleri, kanama sorunları veya pulmoner emboli dahil kan pıhtıları (PE; akciğerde kan pıhtısı), pnömoni gibi bir akciğer hastalığı, pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH; kanı akciğerlere taşıyan damarlarda yüksek tansiyon, nefes darlığına, baş dönmesine ve yorgunluğa neden olur), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH; akciğerleri ve solunum yollarını etkileyen bir grup hastalık) veya göz problemleri.
- Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İnterferon alfa-2b enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.
- Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize interferon alfa-2b aldığınızı söyleyin.
- Enjeksiyonunuzu aldıktan sonra baş ağrısı, terleme, kas ağrıları ve yorgunluk gibi grip benzeri semptomlarınız olabileceğini bilmelisiniz. Doktorunuz size asetaminofen almanızı söyleyebilir.

(Tylenol), bu semptomlara yardımcı olmak için reçetesiz satılan bir ağrı ve ateş ilacıdır. Bu semptomların tedavisi zorsa veya şiddetli hale gelirse doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

İlk interferon alfa-2b tedavileriniz sırasında yeterince sıvı içmeye dikkat edin.

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz interferon alfa-2b enjeksiyonunu kaçırırsanız, bir sonraki dozunuzu hatırladığınız veya verebilecek durumda olduğunuz anda enjekte edin. İki gün üst üste interferon alfa-2b enjeksiyonu kullanmayın. Kaçırılan bir dozu telafi etmek için çift doz enjekte etmeyin. Bir dozu kaçırırsanız ve ne yapacağınız konusunda sorularınız varsa doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

- interferon alfa-2b'yi enjekte ettiğiniz yerde morarma, kanama, ağrı, kızarıklık, şişme veya tahriş
- kas ağrısı
- tat alma yeteneğinde değişiklik
- saç kaybı
- baş dönmesi
- kuru ağız
- konsantrasyon problemleri
- soğuk veya sıcak hissetmek
- ağırlık değişiklikleri
- cilt değişiklikleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini veya ÖNEMLİ UYARI veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümlerinde listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

- döküntü
- kurdeşen
- cilt soyma
- kaşıntı
- nefes alma veya yutma zorluğu
- gözlerin, yüzün, ağzın, dilin veya boğazın şişmesi
- görme değişiklikleri

- mide ağrısı, hassasiyet veya şişlik
- cilt veya gözlerin sararması
- Aşırı yorgunluk
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- ishal
- iştah kaybı
- mide bulantısı
- kusma
- sırt ağrısı
- bilinç kaybı
- ellerde veya ayaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

İnterferon alfa-2b enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz. (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla (1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Buzdolabında saklayın, ancak dondurmayın. Karıştırdıktan sonra hemen kullanın. Karıştırıldıktan sonra 24 saate kadar buzdolabında saklanabilir. Eski veya artık gerekmeyen ilaçları atın. İlaçlarınızın uygun şekilde atılması hakkında eczacınızla konuşun.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.

takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.

rand isimleri

- Intron A®

Son Revize - 09/15/2015

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi

AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma

ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022